

Diagram of Representations of Universal Algebras

Aleks Kleyn

arXiv:1908.04418v1 [math.GM] 9 Aug 2019

Aleks_Kleyn@MailAPS.org
<http://AleksKleyn.dyndns-home.com:4080/>
<http://sites.google.com/site/AleksKleyn/>
http://arxiv.org/a/kleyn_a_1
<http://AleksKleyn.blogspot.com/>

ABSTRACT. Theory of representations of universal algebra is a natural development of the theory of universal algebra. In the book, I considered representation of universal algebra, diagram of representations and examples of representation. Morphism of the representation is the map that conserve the structure of the representation. Exploring of morphisms of the representation leads to the concepts of generating set and basis of representation.

Contents

Chapter 1. Preface	5
1.1. Representation Theory	5
1.2. On the Edge of Theory	6
Chapter 2. Preliminary Definitions	7
2.1. Equivalence	7
2.2. Universal Algebra	9
2.3. Cartesian Product of Universal Algebras	12
2.4. Semigroup	15
Chapter 3. Representation of Universal Algebra	17
3.1. Representation of Universal Algebra	17
3.2. Morphism of Representations of Universal Algebra	20
3.3. Decomposition Theorem for Morphisms of Representations	24
3.4. Reduced Morphism of Representations	30
3.5. Automorphism of Representation of Universal Algebra	35
Chapter 4. Ω -Group	38
4.1. Set of Homomorphisms of Ω -Algebra	38
4.2. Ω -Group	40
4.3. Cartesian Product of Representations	43
4.4. Reduced Cartesian Product of Representations	48
4.5. Multiplicative Ω -Group	52
4.6. Ω -ring	57
4.7. Tensor Product of Representations	61
4.8. Associativity of Tensor Product	67
Chapter 5. Representation of Multiplicative Ω -Group	69
5.1. Representation of Multiplicative Ω -Group	69
5.2. Left and Right Shifts	74
5.3. Orbit of Representation of Multiplicative Ω -Group	77
5.4. Representation in Ω -Group	79
5.5. Single Transitive Right-Side Representation of Group	80
Chapter 6. Basis of Representation of Universal Algebra	84
6.1. Generating Set of Representation	84
6.2. Basis of representation	94
6.3. Free Representation	99
6.4. Basis Manifold of Representation	100
6.5. Geometric Object of Representation of Universal Algebra	101

Chapter 7. Diagram of Representations of Universal Algebras	105
7.1. Diagram of Representations of Universal Algebras	105
7.2. Morphism of Diagram of Representations	110
7.3. Automorphism of Diagram of Representations	113
Chapter 8. Basis of Diagram of Representations of Universal Algebra . .	115
8.1. Generating Set of Diagram of Representations	115
8.2. Basis of Diagram of Representations	126
8.3. Basis Manifold of Diagram of Representations	131
8.4. Geometric Object of Diagram of Representations	133
Chapter 9. Examples of Diagram of Representations: Module	136
9.1. About this Chapter	136
9.2. Abelian Group	136
9.3. Vector Space	139
9.3.1. Module over Commutative Ring	139
9.3.2. Linear Map	146
9.3.3. Polylinear Map	149
9.4. Algebra over Commutative Ring	152
9.5. Left Module over Algebra	154
9.6. Right Module over Algebra	162
9.7. Left Module over Nonassociative Algebra	169
Chapter 10. Examples of Diagram of Representations: Affinne Geometry	171
10.1. About this Chapter	171
10.2. Representation of Group on the Set	171
10.3. Affine Space	173
10.4. Affine Space on Differentiable Manifold	177
10.5. Noncommutative module	184
References	185
Index	187
Special Symbols and Notations	190

CHAPTER 1

Preface

1.1. Representation Theory

In my papers, I often explore problems relating to the representation of universal algebra. Initially it was small sketches which I repeatedly corrected and rewrote. However gradually there were new observations. As a result, auxiliary tool became a consistent theory.

I realized this when I was writing book [10], and I decided to dedicate a separate book to the questions related with representation of universal algebra. Exploring of the theory of representations of universal algebra shows that this theory has a lot of common with theory of universal algebra.

The definition of vector space as representation of field in the Abelian group was the main impetus of deeper exploring of representations of universal algebra. I put attention that this definition changes role of linear map. It was found that linear map is the map that preserves the structure of the representation. It is easy to generalize this structure for an arbitrary representation of universal algebra. Thus I came to the notion of morphism of representation.

The set of regular automorphisms of vector space forms a group. This group is single transitive on the set of bases of vector space. This statement is the foundation of the theory of invariants of vector space.

The natural question arises. Can we generalize this structure to arbitrary representation? The basis is not the only set that forms the vector space. If we add an arbitrary vector to the set of vectors of basis, then a new set also generates the same vector space, however this set is not basis. This statement is initial point where I started exploring of generating set of representation. Generating set of representation is one more interesting parallel between theory of representations and theory of universal algebra.

The set of automorphisms of representations is loop. Nonassociativity of the product is the source of numerous questions which require additional research. All these questions lead to the need to understand the theory of invariants of a given representation.

If we consider the theory of representations of universal algebra as an extension of the theory of universal algebra, then why not consider the representation of one representation in another representation. Thus the concept of the tower representations appeared. The most amazing fact is the statement that all maps in the tower of representations are coordinated.

1.2. On the Edge of Theory

Over the years, I believed that representation theory is the main tool to study covariance principle. However, in the process of writing this book, I suddenly found myself on the edge of representation theory. It was extremely important event.

More precisely, it was two different discoveries, interconnected by topic of non commutative addition. At the beginning, I discovered that I can study affine geometry on affine manifold. (This is not new discovery. I think people have known about this since Descartes and Gauss). The most important for me here was the statement that sum is not defined for every pairs of vectors. I met similar problem when I was studying basis manifold of Minkowski space ([11]). If connection on affine manifold has nonzero torsion, then sum of vectors becomes non commutative.

Later, I decided to study representation of ring in non-abelian group. Although algebra is closed relative operation, I see opportunity for further development of representation theory. We can use the definition of basis from this book; however some important details will be hidden. I am interested in the version that elements of basis may have a given order; but right now I do not have a clear idea of what may follow from this assumption.

CHAPTER 2

Preliminary Definitions

This chapter contains definitions and theorems which are necessary for an understanding of the text of this book. So the reader may read the statements from this chapter in process of reading the main text of the book.

2.1. Equivalence

DEFINITION 2.1.1. Correspondence $\Phi \in A \times A$ is called **equivalence**, if^{2.1}

2.1.1.1: correspondence Φ is **reflexive**

$$(a, a) \in \Phi$$

2.1.1.2: correspondence Φ is **symmetric**

$$(a, b) \in \Phi \Rightarrow (b, a) \in \Phi$$

2.1.1.3: correspondence Φ is **transitive**

$$(a, b), (b, c) \in \Phi \Rightarrow (a, c) \in \Phi$$

□

THEOREM 2.1.2. For the map

$$f : A \rightarrow B$$

the set

$$(2.1.1) \quad \ker f = \{(a, b) : a, b \in A, f(a) = f(b)\}$$

is equivalence and is called **kernel of map**.^{2.2}

PROOF.

LEMMA 2.1.3. Correspondence $\ker f$ is reflexive.

PROOF. From the equality

$$f(a) = f(a)$$

and from the definition (2.1.1), it follows that

$$(2.1.2) \quad (a, a) \in \ker f$$

The lemma follows from the statement (2.1.2) and from the definition 2.1.1.1. ◊

LEMMA 2.1.4. Correspondence $\ker f$ is symmetric.

^{2.1} See also the definition on page [14]-14.

^{2.2} See also the definition on page [14]-16.

PROOF. The equality

$$(2.1.3) \quad f(a) = f(b)$$

follows from the statement

$$(a, b) \in \ker f$$

and from the definition (2.1.1). The equality

$$(2.1.4) \quad f(b) = f(a)$$

follows from the equality (2.1.3). The statement

$$(b, a) \in \ker f$$

follows from the equality (2.1.4) and from the definition (2.1.1). Therefore, we proved the statement

$$(2.1.5) \quad (a, b) \in \ker f \Rightarrow (b, a) \in \ker f$$

The lemma follows from the statement (2.1.5) and from the definition 2.1.1.2. \odot

LEMMA 2.1.5. *Correspondence $\ker f$ is transitive.*

PROOF. The equality

$$(2.1.6) \quad f(a) = f(b)$$

follows from the statement

$$(a, b) \in \ker f$$

and from the definition (2.1.1). The equality

$$(2.1.7) \quad f(b) = f(c)$$

follows from the statement

$$(b, c) \in \ker f$$

and from the definition (2.1.1). The equality

$$(2.1.8) \quad f(a) = f(c)$$

follows from equalities (2.1.6), (2.1.7). The statement

$$(a, c) \in \ker f$$

follows from the equality (2.1.8) and from the definition (2.1.1). Therefore, we proved the statement

$$(2.1.9) \quad (a, b), (b, c) \in \ker f \Rightarrow (a, c) \in \ker f$$

The lemma follows from the statement (2.1.9) and from the definition 2.1.1.2. \odot

The theorem follows from lemmas 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 and from the definition 2.1.1. \square


THEOREM 2.1.6. *Let N be equivalence on the set A . Consider category \mathcal{A} whose objects are maps^{2.3}*

$$f_1 : A \rightarrow S_1 \quad \ker f_1 \supseteq N$$

$$f_2 : A \rightarrow S_2 \quad \ker f_2 \supseteq N$$

^{2.3} The statement of lemma is similar to the statement on p. [2]-119.

We define morphism $f_1 \rightarrow f_2$ to be map $h : S_1 \rightarrow S_2$ making following diagram commutative




The map

$$\text{nat } N : A \rightarrow A/N$$

is universally repelling in the category \mathcal{A} .^{2.4}

PROOF. Consider diagram



$$(2.1.10) \quad \ker f \supseteq N$$

From the statement (2.1.10) and the equality

$$j(a_1) = j(a_2)$$

it follows that

$$f(a_1) = f(a_2)$$

Therefore, we can uniquely define the map h using the equality

$$h(j(b)) = f(b)$$

□

2.2. Universal Algebra

DEFINITION 2.2.1. For any sets^{2.5} A, B , Cartesian power B^A is the set of maps

$$f : A \rightarrow B$$

□

DEFINITION 2.2.2. For any $n \geq 0$, a map^{2.6}

$$\omega : A^n \rightarrow A$$

is called n -ary operation on set A or just operation on set A . For any $a_1, \dots, a_n \in A$, we use either notation $\omega(a_1, \dots, a_n)$, $a_1 \dots a_n \omega$ to denote image of map ω . □

^{2.4}See definition of universal object of category in definition on p. [2]-57.

^{2.5} I follow the definition from the example (iv) on the page [14]-5.

^{2.6} Definitions 2.2.2, 2.2.7 follow the definition in the example (vi) on the page page [14]-13.

REMARK 2.2.3. According to definitions 2.2.1, 2.2.2, n -ary operation $\omega \in A^{A^n}$. \square

DEFINITION 2.2.4. An **operator domain** is the set of operators^{2.7} Ω with a map

$$a : \Omega \rightarrow N$$

If $\omega \in \Omega$, then $a(\omega)$ is called the **arity** of operator ω . If $a(\omega) = n$, then operator ω is called n -ary. We use notation

$$\Omega(n) = \{\omega \in \Omega : a(\omega) = n\}$$

for the set of n -ary operators. \square

DEFINITION 2.2.5. Let A be a set. Let Ω be an operator domain.^{2.8} The family of maps

$$\Omega(n) \rightarrow A^{A^n} \quad n \in N$$

is called Ω -algebra structure on A . The set A with Ω -algebra structure is called Ω -algebra A_Ω or **universal algebra**. The set A is called **carrier of Ω -algebra**. \square

The operator domain Ω describes a set of Ω -algebras. An element of the set Ω is called operator, because an operation assumes certain set. According to the remark 2.2.3 and the definition 2.2.5, for each operator $\omega \in \Omega(n)$, we match n -ary operation ω on A .

THEOREM 2.2.6. Let the set B be Ω -algebra. Then the set B^A of maps

$$f : A \rightarrow B$$

also is Ω -algebra.

PROOF. Let $\omega \in \Omega(n)$. For maps $f_1, \dots, f_n \in B^A$, we define the operation ω by the equality

$$(f_1 \dots f_n \omega)(x) = f_1(x) \dots f_n(x) \omega$$

\square

DEFINITION 2.2.7. Let $B \subseteq A$. Since, for any $b_1, \dots, b_n \in B$, $b_1 \dots b_n \omega \in B$, then we say that B is **closed with respect to ω** or that B **admits operation ω** . \square

DEFINITION 2.2.8. Ω -algebra B_Ω is **subalgebra** of Ω -algebra A_Ω if following statements are true^{2.9}

2.2.8.1: $B \subseteq A$.

2.2.8.2: if operator $\omega \in \Omega$ defines operations ω_A on A and ω_B on B , then

$$\omega_A|_B = \omega_B$$

\square

^{2.7} I follow the definition (1), page [14]-48.

^{2.8} I follow the definition (2), page [14]-48.

^{2.9} I follow the definition on page [14]-48.

DEFINITION 2.2.9. Let A, B be Ω -algebras and $\omega \in \Omega(n)$. The map^{2.10}

$$f : A \rightarrow B$$

is compatible with operation ω , if, for all $a_1, \dots, a_n \in A$,

$$(2.2.1) \quad f(a_1) \dots f(a_n) \omega = f(a_1 \dots a_n \omega)$$

The map f is called **homomorphism** from Ω -algebra A to Ω -algebra B , if f is compatible with each $\omega \in \Omega$. We use notation $\text{Hom}(\Omega; A \rightarrow B)$ for the set of homomorphisms from Ω -algebra A to Ω -algebra B . \square

THEOREM 2.2.10. Since operator domain is empty, then a homomorphism from Ω -algebra A to Ω -algebra B is a map

$$f : A \rightarrow B$$

Therefore, $\text{Hom}(\emptyset; A \rightarrow B) = B^A$.

PROOF. The theorem follows from definitions 2.2.1, 2.2.9. \square

DEFINITION 2.2.11. Homomorphism f is called^{2.11} **isomorphism** between A and B , if correspondence f^{-1} is homomorphism. If there is an isomorphism between A and B , then we say that A and B are isomorphic and write $A \cong B$. An injective homomorphism is called **monomorphism**. A surjective homomorphism is called **epimorphism**. \square

DEFINITION 2.2.12. A homomorphism in which source and target are the same algebra is called **endomorphism**. We use notation $\text{End}(\Omega; A)$ for the set of endomorphisms of Ω -algebra A . An endomorphism which is also an isomorphism is called **automorphism**. \square

THEOREM 2.2.13. $\text{End}(\Omega; A) = \text{Hom}(\Omega; A \rightarrow A)$

PROOF. The theorem follows from the definitions 2.2.9, 2.2.12. \square

THEOREM 2.2.14. Since operator domain is empty, then an endomorphism of the set A is a map

$$t : A \rightarrow A$$

Therefore, $\text{End}(\emptyset; A) = A^A$.

PROOF. The theorem follows from the theorems 2.2.10, 2.2.13. \square

DEFINITION 2.2.15. If there is a monomorphism from Ω -algebra A to Ω -algebra B , then we say that A can be embedded in B . \square

DEFINITION 2.2.16. If there is an epimorphism from A to B , then B is called **homomorphic image** of algebra A . \square

^{2.10} I follow the definition on page [14]-49.

^{2.11} I follow the definition on page [14]-49.

2.3. Cartesian Product of Universal Algebras

DEFINITION 2.3.1. Let \mathcal{A} be a category. Let $\{B_i, i \in I\}$ be the set of objects of \mathcal{A} . Object

$$P = \prod_{i \in I} B_i$$

and set of morphisms

$$\{f_i : P \rightarrow B_i, i \in I\}$$

is called a **product of set of objects** $\{B_i, i \in I\}$ in category \mathcal{A} ^{2.12} if for any object R and set of morphisms

$$\{g_i : R \rightarrow B_i, i \in I\}$$

there exists a unique morphism

$$h : R \rightarrow P$$

such that diagram

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{f_i} & B_i \\ \uparrow h & \nearrow g_i & \\ R & & \end{array} \quad f_i \circ h = g_i$$

is commutative for all $i \in I$.

If $|I| = n$, then we also will use notation

$$P = \prod_{i=1}^n B_i = B_1 \times \dots \times B_n$$

for product of set of objects $\{B_i, i \in I\}$ in \mathcal{A} . □

EXAMPLE 2.3.2. Let \mathcal{S} be the category of sets.^{2.13} According to the definition 2.3.1, Cartesian product

$$A = \prod_{i \in I} A_i$$

of family of sets $(A_i, i \in I)$ and family of projections on the i -th factor

$$p_i : A \rightarrow A_i$$

are product in the category \mathcal{S} . □

THEOREM 2.3.3. The product exists in the category \mathcal{A} of Ω -algebras. Let Ω -algebra A and family of morphisms

$$p_i : A \rightarrow A_i \quad i \in I$$

be product in the category \mathcal{A} . Then

2.3.3.1: The set A is Cartesian product of family of sets $(A_i, i \in I)$

2.3.3.2: The homomorphism of Ω -algebra

$$p_i : A \rightarrow A_i$$

is projection on i -th factor.

2.3.3.3: We can represent any A -number a as tuple $(p_i(a), i \in I)$ of A_i -numbers.

^{2.12} I made definition according to [2], page 58.

^{2.13} See also the example in [2], page 59.

2.3.3.4: Let $\omega \in \Omega$ be n -ary operation. Then operation ω is defined component-wise

$$(2.3.1) \quad a_1 \dots a_n \omega = (a_{1i} \dots a_{ni} \omega, i \in I)$$

where $a_1 = (a_{1i}, i \in I), \dots, a_n = (a_{ni}, i \in I)$.

PROOF. Let

$$A = \prod_{i \in I} A_i$$

be Cartesian product of family of sets $(A_i, i \in I)$ and, for each $i \in I$, the map

$$p_i : A \rightarrow A_i$$

be projection on the i -th factor. Consider the diagram of morphisms in category of sets \mathcal{S}

$$(2.3.2) \quad \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{p_i} & A_i \\ \omega \uparrow & \nearrow g_i & \\ A^n & & \end{array} \quad p_i \circ \omega = g_i$$

where the map g_i is defined by the equality

$$g_i(a_1, \dots, a_n) = p_i(a_1) \dots p_i(a_n) \omega$$

According to the definition 2.3.1, the map ω is defined uniquely from the set of diagrams (2.3.2)

$$(2.3.3) \quad a_1 \dots a_n \omega = (p_i(a_1) \dots p_i(a_n) \omega, i \in I)$$

The equality (2.3.1) follows from the equality (2.3.3). \square

DEFINITION 2.3.4. If Ω -algebra A and family of morphisms

$$p_i : A \rightarrow A_i \quad i \in I$$

is product in the category \mathcal{A} , then Ω -algebra A is called **direct or Cartesian product of Ω -algebras** $(A_i, i \in I)$. \square

THEOREM 2.3.5. Let set A be Cartesian product of sets $(A_i, i \in I)$ and set B be Cartesian product of sets $(B_i, i \in I)$. For each $i \in I$, let

$$f_i : A_i \rightarrow B_i$$

be the map from the set A_i into the set B_i . For each $i \in I$, consider commutative diagram

$$(2.3.4) \quad \begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{p'_i} & B_i \\ f \uparrow & & \uparrow f_i \\ A & \xrightarrow{p_i} & A_i \end{array}$$

where maps p_i, p'_i are projection on the i -th factor. The set of commutative diagrams (2.3.4) uniquely defines map

$$f : A \rightarrow B$$

$$f(a_i, i \in I) = (f_i(a_i), i \in I)$$

PROOF. For each $i \in I$, consider commutative diagram

$$(2.3.5) \quad \begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{p'_i} & B_i \\ \uparrow f & \nearrow g_i & \uparrow f_i \\ A & \xrightarrow{p_i} & A_i \end{array}$$

(1) (2)

Let $a \in A$. According to the statement 2.3.3.3, we can represent A -number a as tuple of A_i -numbers

$$(2.3.6) \quad a = (a_i, i \in I) \quad a_i = p_i(a) \in A_i$$

Let

$$(2.3.7) \quad b = f(a) \in B$$

According to the statement 2.3.3.3, we can represent B -number b as tuple of B_i -numbers

$$(2.3.8) \quad b = (b_i, i \in I) \quad b_i = p'_i(b) \in B_i$$

From commutativity of diagram (1) and from equalities (2.3.7), (2.3.8), it follows that

$$(2.3.9) \quad b_i = g_i(b)$$

From commutativity of diagram (2) and from the equality (2.3.6), it follows that

$$b_i = f_i(a_i)$$

□

THEOREM 2.3.6. *Let Ω -algebra A be Cartesian product of Ω -algebras $(A_i, i \in I)$ and Ω -algebra B be Cartesian product of Ω -algebras $(B_i, i \in I)$. For each $i \in I$, let the map*

$$f_i : A_i \rightarrow B_i$$

be homomorphism of Ω -algebra. Then the map

$$f : A \rightarrow B$$

defined by the equality

$$(2.3.10) \quad f(a_i, i \in I) = (f_i(a_i), i \in I)$$

is homomorphism of Ω -algebra.

PROOF. Let $\omega \in \Omega$ be n -ary operation. Let $a_1 = (a_{1i}, i \in I)$, ..., $a_n = (a_{ni}, i \in I)$, $b_1 = (b_{1i}, i \in I)$, ..., $b_n = (b_{ni}, i \in I)$. From equalities (2.3.1), (2.3.10), it follows that

$$\begin{aligned} f(a_1 \dots a_n \omega) &= f(a_{1i} \dots a_{ni} \omega, i \in I) \\ &= (f_i(a_{1i} \dots a_{ni} \omega), i \in I) \\ &= ((f_i(a_{1i})) \dots (f_i(a_{ni}))), i \in I \\ &= (b_{1i} \dots b_{ni} \omega, i \in I) \\ f(a_1) \dots f(a_n) \omega &= b_1 \dots b_n \omega = (b_{1i} \dots b_{ni} \omega, i \in I) \end{aligned}$$

□

DEFINITION 2.3.7. *Equivalence on Ω -algebra A , which is subalgebra of Ω -algebra A^2 , is called **congruence**^{2.14} on A .* □

THEOREM 2.3.8 (first isomorphism theorem). *Let*

$$f : A \rightarrow B$$

be homomorphism of Ω -algebras with kernel s . Then there is decomposition

$$\begin{array}{ccc} A/\ker f & \xrightarrow{q} & f(A) \\ p \uparrow & & \downarrow r \\ A & \xrightarrow{f} & B \end{array} \quad f = p \circ q \circ r$$

2.3.8.1: *The **kernel of homomorphism** $\ker f = f \circ f^{-1}$ is a congruence on Ω -algebra A .*

2.3.8.2: *The set $A/\ker f$ is Ω -algebra.*

2.3.8.3: *The map*

$$p : a \in A \rightarrow a^{\ker f} \in A/\ker f$$

*is epimorphism and is called **natural homomorphism**.*

2.3.8.4: *The map*

$$q : p(a) \in A/\ker f \rightarrow f(a) \in f(A)$$

is the isomorphism

2.3.8.5: *The map*

$$r : f(a) \in f(A) \rightarrow f(a) \in B$$

is the monomorphism

PROOF. The statement 2.3.8.1 follows from the proposition II.3.4 ([14], page 58). Statements 2.3.8.2, 2.3.8.3 follow from the theorem II.3.5 ([14], page 58) and from the following definition. Statements 2.3.8.4, 2.3.8.5 follow from the theorem II.3.7 ([14], page 60). □

2.4. Semigroup

Usually the operation $\omega \in \Omega(2)$ is called product

$$ab\omega = ab$$

or sum

$$ab\omega = a + b$$

DEFINITION 2.4.1. *Let A be Ω -algebra and $\omega \in \Omega(2)$. A -number e is called **neutral element of operation** ω , when for any A -number a following equations are true*

$$(2.4.1) \quad e a \omega = a$$

$$(2.4.2) \quad a e \omega = a$$

□

^{2.14} I follow the definition on page [14]-57.

DEFINITION 2.4.2. *Let A be Ω -algebra. The operation $\omega \in \Omega(2)$ is called **associative** if the following equality is true*

$$a(bc\omega)\omega = (ab\omega)c\omega$$

□

DEFINITION 2.4.3. *Let A be Ω -algebra. The operation $\omega \in \Omega(2)$ is called **commutative** if the following equality is true*

$$ab\omega = ba\omega$$

□

DEFINITION 2.4.4. *Let $\Omega = \{\omega\}$. If the operation $\omega \in \Omega(2)$ is associative, then Ω -algebra is called **semigroup**. If the operation in the semigroup is commutative, then the semigroup is called **Abelian semigroup**.* □

Representation of Universal Algebra

3.1. Representation of Universal Algebra

DEFINITION 3.1.1. *Let the set A_2 be Ω_2 -algebra. Let the set of transformations $\text{End}(\Omega_2, A_2)$ be Ω_1 -algebra. The homomorphism*

$$f : A_1 \rightarrow \text{End}(\Omega_2; A_2)$$

*of Ω_1 -algebra A_1 into Ω_1 -algebra $\text{End}(\Omega_2, A_2)$ is called **representation of Ω_1 -algebra A_1 or A_1 -representation in Ω_2 -algebra A_2** . \square*

Diagram

$$\begin{array}{ccc} A_2 & \xrightarrow{f(a)} & A_2 \\ & \uparrow f & \\ & A_1 & \end{array}$$

means that we consider the representation of Ω_1 -algebra A_1 . The map $f(a)$ is image of $a \in A_1$. We also use record

$$f : A_1 \xrightarrow{*} A_2$$

to denote the representation of Ω_1 -algebra A_1 in Ω_2 -algebra A_2 .

There are several ways to describe the representation. We can define the map f keeping in mind that the domain is Ω_1 -algebra A_1 and range is Ω_1 -algebra $\text{End}(\Omega_2, A_2)$. Either we can specify Ω_1 -algebra A_1 and Ω_2 -algebra A_2 keeping in mind that we know the structure of the map f .^{3.1}

DEFINITION 3.1.2. *Let the map*

$$f : A_1 \rightarrow \text{End}(\Omega_2; A_2)$$

be an isomorphism of the Ω_1 -algebra A_1 into $\text{End}(\Omega_2, A_2)$. Then the representation

$$f : A_1 \xrightarrow{*} A_2$$

*of the Ω_1 -algebra A_1 is called **effective**.*^{3.2} \square

THEOREM 3.1.3. *The representation*

$$f : A_1 \xrightarrow{*} A_2$$

^{3.1} For instance, we consider vector space V over field D (section 9.3).

^{3.2} See similar definition of effective representation of group in [18], page 16, [19], page 111, [15], page 51 (Cohn calls such representation faithful). See also the theorem 5.4.2.

is effective iff the statement $a_1 \neq b_1$, $a_1, b_1 \in A_1$, implies that there exists $a_2 \in A_2$ such that ^{3.3}

$$f(a_1)(a_2) \neq f(b_1)(a_2)$$

PROOF. Let the representation f be effective and $a_1 \neq b_1$. If for any $a_2 \in A_2$, the equality

$$f(a_1)(a_2) = f(b_1)(a_2)$$

is true, then

$$f(a_1) = f(b_1)$$

This contradicts to the statement that the representation f is effective.

Let the statement $a_1 \neq b_1$, $a_1, b_1 \in A_1$, imply that there exists $a_2 \in A_2$ such that

$$f(a_1)(a_2) \neq f(b_1)(a_2)$$

Therefore, the statement $a_1 \neq b_1$, $a_1, b_1 \in A_1$, implies that

$$f(a) \neq f(b)$$

According to the definition [3.1.2](#), the representation f is effective. □

DEFINITION 3.1.4. *The representation*

$$f : A_1 \dashrightarrow A_2$$

of the Ω_1 -algebra A_1 is called **free**, ^{3.4} if the statement

$$f(a_1)(a_2) = f(b_1)(a_2)$$

for any $a_2 \in A_2$ implies that $a_1 = b_1$. □

THEOREM 3.1.5. *The representation*

$$f : A_1 \dashrightarrow A_2$$

of the Ω_1 -algebra A_1 is called **free**, if the statement $f(a_1) = f(b_1)$ implies that $a_1 = b_1$.

PROOF. The statement $f(a_1) = f(b_1)$ is true iff when

$$f(a_1)(a_2) = f(b_1)(a_2)$$

for any $a_2 \in A_2$. □

THEOREM 3.1.6. *Free representation is effective.*

^{3.3} In case of group, the theorem [3.1.3](#) has the following form. *The representation*

$$f : A_1 \dashrightarrow A_2$$

is effective iff, for any A_1 -number $a_1 \neq e$, there exists $a_2 \in A_2$ such that

$$f(a_1)(a_2) \neq a_2$$

^{3.4} See similar definition of free representation of group in [\[18\]](#), page 16. See also the theorem [5.5.2](#).

PROOF. Let the map

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

be free representation. Let $a, b \in A_1$. According to the definition 3.1.4, the statement

$$f(a_1)(a_2) = f(b_1)(a_2)$$

for any $a_2 \in A_2$ implies that $a_1 = b_1$. Therefore, if $a_1 \neq b_1$, then there exists $a_2 \in A_2$ such that

$$f(a_1)(a_2) \neq f(b_1)(a_2)$$

According to the theorem 3.1.3, the representation f is effective. \square

REMARK 3.1.7. *Representation of rotation group in affine space is effective. However this representation is not free, since origin is fixed point of every transformation.* \square

DEFINITION 3.1.8. *The representation*

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

of Ω_1 -algebra is called **transitive**^{3.5} if for any $a, b \in A_2$, exists such g that

$$a = f(g)(b)$$

The representation of Ω_1 -algebra is called **single transitive** if it is transitive and free. \square

THEOREM 3.1.9. *Representation is single transitive iff for any $a, b \in A_2$ exists one and only one $g \in A_1$ such that $a = f(g)(b)$*

PROOF. The theorem follows from definitions 3.1.4 and 3.1.8. \square

THEOREM 3.1.10. *Let*

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

be a single transitive representation of Ω_1 -algebra A_1 in Ω_2 -algebra A_2 . There is the structure of Ω_1 -algebra on the set A_2 .

PROOF. Let $b \in A_2, \omega \in \Omega_1(n)$. For any A_2 -numbers b_1, \dots, b_n , there exist A_1 -numbers a_1, \dots, a_n such that

$$b_1 = f(a_1)(b) \quad \dots \quad b_n = f(a_n)(b)$$

We introduce the operation ω on the set A_2 by the equality

$$(3.1.1) \quad b_1 \dots b_n \omega = f(a_1 \dots a_n \omega)(b)$$

We also require that choice of A_2 -number b does not depend on operation ω . \square

THEOREM 3.1.11. *Let*

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

be an effective representation of Ω_1 -algebra A_1 in Ω_2 -algebra A_2 . Let $\omega \in \Omega_1(n) \cap \Omega_2(n)$. Then

$$(3.1.2) \quad f(a_1 \dots a_n \omega)(b) = f(a_1)(b) \dots f(a_n)(b) \omega$$

^{3.5} See similar definition of transitive representation of group in [19], page 110, [15], page 51.

3.2. Morphism of Representations of Universal Algebra

THEOREM 3.2.1. *Let A_1 and B_1 be Ω_1 -algebras. Representation of Ω_1 -algebra B_1*

$$g : B_1 \dashrightarrow A_2$$

and homomorphism of Ω_1 -algebra

$$h : A_1 \rightarrow B_1$$

define representation f of Ω_1 -algebra A_1

$$(3.2.1) \quad \begin{array}{ccc} A_1 & \xrightarrow{f} & \text{End}(\Omega_2; A_2) \\ & \searrow h & \nearrow g \\ & B_1 & \end{array}$$

PROOF. Since map g is homomorphism of Ω_1 -algebra B_1 into Ω_1 -algebra $\text{End}(\Omega_2, A_2)$, the map f is homomorphism of Ω_1 -algebra A_1 into Ω_1 -algebra $\text{End}(\Omega_2, A_2)$. \square

We also use diagram

$$\begin{array}{ccc} A_1 & \xrightarrow{f} & A_2 \\ & \searrow h & \nearrow g \\ & B_1 & \end{array}$$

instead of diagram (3.2.1).

Considering representations of Ω_1 -algebra in Ω_2 -algebras A_2 and B_2 , we are interested in a map $A_2 \rightarrow B_2$ that preserves the structure of representation.

DEFINITION 3.2.2. *Let*

$$f : A_1 \dashrightarrow A_2$$

be representation of Ω_1 -algebra A_1 in Ω_2 -algebra A_2 and

$$g : B_1 \dashrightarrow B_2$$

be representation of Ω_1 -algebra B_1 in Ω_2 -algebra B_2 . For $i = 1, 2$, let the map

$$r_i : A_i \rightarrow B_i$$

be homomorphism of Ω_i -algebra. The tuple of maps $r = (r_1, r_2)$ such, that

$$(3.2.2) \quad r_2 \circ f(a) = g(r_1(a)) \circ r_2$$

is called **morphism of representations from f into g** . We also say that **morphism of representations of Ω_1 -algebra in Ω_2 -algebra** is defined. \square

REMARK 3.2.3. *We may consider a pair of maps r_1, r_2 as map*

$$F : A_1 \cup A_2 \rightarrow B_1 \cup B_2$$

such that

$$F(A_1) = B_1 \quad F(A_2) = B_2$$

Therefore, hereinafter the tuple of maps $r = (r_1, r_2)$ also is called map and we will use map

$$r : f \rightarrow g$$

Let $a = (a_1, a_2)$ be tuple of A -numbers. We will use notation

$$r(a) = (r_1(a_1), r_2(a_2))$$

for image of tuple of A -numbers with respect to morphism of representations r . \square

DEFINITION 3.2.4. If representation f and g coincide, then morphism of representations $r = (r_1, r_2)$ is called **morphism of representation f** . \square

THEOREM 3.2.5. Let

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

be representation of Ω_1 -algebra A_1 in Ω_2 -algebra A_2 and

$$g : B_1 \longrightarrow B_2$$

be representation of Ω_1 -algebra B_1 in Ω_2 -algebra B_2 . The map

$$(r_1 : A_1 \rightarrow B_1, r_2 : A_2 \rightarrow B_2)$$

is morphism of representations iff

$$(3.2.3) \quad r_2(f(a)(m)) = g(r_1(a))(r_2(m))$$

PROOF. For any $m \in A_2$, equality (3.2.3) follows from (3.2.2). \square

REMARK 3.2.6. Consider morphism of representations

$$(r_1 : A_1 \rightarrow B_1, r_2 : A_2 \rightarrow B_2)$$

We denote elements of the set B_1 by letter using pattern $b \in B_1$. However if we want to show that b is image of element $a \in A_1$, we use notation $r_1(a)$. Thus equation

$$r_1(a) = r_1(a)$$

means that $r_1(a)$ (in left part of equation) is image $a \in A_1$ (in right part of equation). Using such considerations, we denote element of set B_2 as $r_2(m)$. We will follow this convention when we consider correspondences between homomorphisms of Ω_1 -algebra and maps between sets where we defined corresponding representations. \square

REMARK 3.2.7. There are two ways to interpret (3.2.3)

- Let transformation $f(a)$ map $m \in A_2$ into $f(a)(m)$. Then transformation $g(r_1(a))$ maps $r_2(m) \in B_2$ into $r_2(f(a)(m))$.
- We represent morphism of representations from f into g using diagram

$$(3.2.4) \quad \begin{array}{ccc} A_2 & \xrightarrow{r_2} & B_2 \\ \begin{array}{c} \downarrow f(a) \\ \uparrow f \end{array} & & \begin{array}{c} \downarrow g(r_1(a)) \\ \uparrow g \end{array} \\ A_2 & \xrightarrow{r_2} & B_2 \\ \begin{array}{c} \uparrow f \\ \downarrow f \end{array} & & \begin{array}{c} \uparrow g \\ \downarrow g \end{array} \\ A_1 & \xrightarrow{r_1} & B_1 \end{array}$$

From (3.2.2), it follows that diagram (1) is commutative.

We also use diagram

$$(3.2.5) \quad \begin{array}{ccc} A_2 & \xrightarrow{r_2} & B_2 \\ \uparrow f & & \uparrow g \\ A_1 & \xrightarrow{r_1} & B_1 \end{array}$$

instead of diagram (3.2.4). □

THEOREM 3.2.8. Consider representation

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

of Ω_1 -algebra A_1 and representation

$$g : B_1 \longrightarrow B_2$$

of Ω_1 -algebra B_1 . Morphism

$$(r_1 : A_1 \rightarrow B_1, r_2 : A_2 \rightarrow B_2)$$

of representations from f into g satisfies equation

$$(3.2.6) \quad r_2 \circ (f(a_1) \dots f(a_n)\omega) = (g(r_1(a_1)) \dots g(r_1(a_n))\omega) \circ r_2$$

for any operation $\omega \in \Omega_1(n)$.

PROOF. Since f is homomorphism, we have

$$(3.2.7) \quad r_2 \circ (f(a_1) \dots f(a_n)\omega) = r_2 \circ f(a_1 \dots a_n\omega)$$

From (3.2.2) and (3.2.7) it follows that

$$(3.2.8) \quad r_2 \circ (f(a_1) \dots f(a_n)\omega) = g(r_1(a_1 \dots a_n\omega)) \circ r_2$$

Since r_1 is homomorphism, from (3.2.8) it follows that

$$(3.2.9) \quad r_2 \circ (f(a_1) \dots f(a_n)\omega) = g(r_1(a_1) \dots r_1(a_n)\omega) \circ r_2$$

Since g is homomorphism, (3.2.6) follows from (3.2.9). □

THEOREM 3.2.9. Let the map

$$(r_1 : A_1 \rightarrow B_1, r_2 : A_2 \rightarrow B_2)$$

be morphism from representation

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

of Ω_1 -algebra A_1 into representation

$$g : B_1 \longrightarrow B_2$$

of Ω_1 -algebra B_1 . If representation f is effective, then the map

$$r_2^* : \text{End}(\Omega_2; A_2) \rightarrow \text{End}(\Omega_2; B_2)$$

defined by equation

$$(3.2.10) \quad r_2^*(f(a)) = g(r_1(a))$$

is homomorphism of Ω_1 -algebra.

PROOF. Because representation f is effective, then for given transformation $f(a)$ element a is determined uniquely. Therefore, transformation $g(r_1(a))$ is properly defined in equation (3.2.10).

Since f is homomorphism, we have

$$(3.2.11) \quad r_2^*(f(a_1)\dots f(a_n)\omega) = r_2^*(f(a_1\dots a_n\omega))$$

From (3.2.10) and (3.2.11) it follows that

$$(3.2.12) \quad r_2^*(f(a_1)\dots f(a_n)\omega) = g(r_1(a_1\dots a_n\omega))$$

Since h is homomorphism, from (3.2.12) it follows that

$$(3.2.13) \quad r_2^*(f(a_1)\dots f(a_n)\omega) = g(r_1(a_1)\dots r_1(a_n)\omega)$$

Since g is homomorphism,

$$r_2^*(f(a_1)\dots f(a_n)\omega) = g(r_1(a_1))\dots g(r_1(a_n))\omega = r_2^*(f(a_1))\dots r_2^*(f(a_n))\omega$$

follows from (3.2.13). Therefore, the map r_2^* is homomorphism of Ω_1 -algebra. \square

THEOREM 3.2.10. *Let*

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

be single transitive representation of Ω_1 -algebra A_1 and

$$g : B_1 \longrightarrow B_2$$

be single transitive representation of Ω_1 -algebra B_1 . Given homomorphism of Ω_1 algebra

$$r_1 : A_1 \rightarrow B_1$$

there exists morphism of representations from f into g

$$(r_1 : A_1 \rightarrow B_1, r_2 : A_2 \rightarrow B_2)$$

PROOF. Let us choose homomorphism r_1 . Let us choose element $m \in A_2$ and element $n \in B_2$. To define map r_2 , consider following diagram

$$\begin{array}{ccc}
 A_2 & \xrightarrow{r_2} & B_2 \\
 \downarrow f(a) & & \downarrow g(r_1(a)) \\
 A_2 & \xrightarrow{r_2} & B_2 \\
 \uparrow f & & \uparrow g \\
 A_1 & \xrightarrow{r_1} & B_1
 \end{array}
 \quad (1)$$

From commutativity of diagram (1), it follows that

$$r_2(f(a)(m)) = g(r_1(a))(r_2(m))$$

For arbitrary $m' \in A_2$, we defined unambiguously $a \in A_1$ such that $m' = f(a)(m)$. Therefore, we defined map r_2 which satisfies to equation (3.2.2). \square

THEOREM 3.2.11. *Let the representation*

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

of Ω_1 -algebra A_1 be single transitive representation and the representation

$$g : B_1 \longrightarrow B_2$$

of Ω_1 -algebra B_1 be single transitive representation. Given homomorphism of Ω_1 -algebra

$$r_1 : A_1 \rightarrow B_1$$

consider a homomorphism of Ω_2 -algebra

$$r_2 : A_2 \rightarrow B_2$$

such that $r = (r_1, r_2)$ is morphism of representations from f into g . The map H is unique up to choice of image $n = r_2(m) \in B_2$ of given element $m \in A_2$.

PROOF. From proof of theorem 3.2.10, it follows that choice of homomorphism r_1 and elements $m \in A_2$, $n \in B_2$ uniquely defines the map r_2 . \square

THEOREM 3.2.12. *Given single transitive representation*

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

of Ω_1 -algebra A_1 , for any endomorphism $r_1 \in \text{End}(\Omega_1; A_1)$ there exists morphism of representation f

$$(r_1 : A_1 \rightarrow A_1, r_2 : A_2 \rightarrow A_2)$$

PROOF. Consider following diagram

$$\begin{array}{ccc}
 A_2 & \xrightarrow{r_2} & A_2 \\
 \downarrow f(a) & & \downarrow f(r_1(a)) \\
 A_2 & \xrightarrow{r_2} & A_2 \\
 \uparrow f & & \uparrow f \\
 A_1 & \xrightarrow{r_1} & A_1
 \end{array}
 \quad (1)$$

Statement of theorem is corollary of the theorem 3.2.10. \square

3.3. Decomposition Theorem for Morphisms of Representations

THEOREM 3.3.1. *Let*

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

be representation of Ω_1 -algebra A_1 ,

$$g : B_1 \longrightarrow B_2$$

be representation of Ω_1 -algebra B_1 ,

$$h : C_1 \longrightarrow C_2$$

be representation of Ω_1 -algebra C_1 . Given morphisms of representations of Ω_1 -algebra

$$(p_1 : A_1 \rightarrow B_1, p_2 : A_2 \rightarrow B_2)$$


$$(q_1 : B_1 \rightarrow C_1, q_2 : B_2 \rightarrow C_2)$$

There exists morphism of representations of Ω_1 -algebra

$$(r_1 : A_1 \rightarrow C_1, r_2 : A_2 \rightarrow C_2)$$

where $r_1 = q_1 \circ p_1, r_2 = q_2 \circ p_2$. We call morphism $r = (r_1, r_2)$ of representations from f into h **product of morphisms** $p = (p_1, p_2)$ and $q = (q_1, q_2)$ of representations of universal algebra.

PROOF. We represent statement of theorem using diagram



Map r_1 is homomorphism of Ω_1 -algebra A_1 into Ω_1 -algebra C . We need to show that the map $r = (r_1, r_2)$ satisfies to (3.2.2):

$$\begin{aligned} r_2(f(a)(m)) &= (q_2 \circ p_2)(f(a)(m)) \\ &= q_2(g(p_1(a))(p_2(m))) \\ &= h((q_1 \circ p_1)(a))((q_2 \circ p_2)(m)) \\ &= h(r_1(a))(r_2(m)) \end{aligned}$$

□

DEFINITION 3.3.2. Let S be equivalence on the set A_2 . Transformation f is called **coordinated with equivalence** S , when $f(m_1) \equiv f(m_2) \pmod{S}$ follows from condition $m_1 \equiv m_2 \pmod{S}$. □

THEOREM 3.3.3. Consider equivalence S on set A_2 . Consider Ω_1 -algebra on the set $\text{End}(\Omega_2; A_2)$. If any transformation $f \in \text{End}(\Omega_2; A_2)$ is coordinated with equivalence S , then we can define the structure of Ω_1 -algebra on the set $\text{End}(\Omega_2; A_2/S)$.

PROOF. Let $h = \text{nat } S$. If $m_1 \equiv m_2 \pmod{S}$, then $h(m_1) = h(m_2)$. Since $f \in \text{End}(\Omega_2; A_2)$ is coordinated with equivalence S , then $h(f(m_1)) = h(f(m_2))$. This allows us to define transformation F according to rule

$$(3.3.1) \quad F([m]) = h(f(m))$$

Let ω be n-ary operation of Ω_1 -algebra. Let $f_1, \dots, f_n \in \text{End}(\Omega_2; A_2)$ and

$$F_1([m]) = h(f_1(m)) \quad \dots \quad F_n([m]) = h(f_n(m))$$

According to condition of theorem, the transformation

$$f = f_1 \dots f_n \omega \in \text{End}(\Omega_2; A_2)$$

is coordinated with equivalence S . Therefore,

$$(3.3.2) \quad \begin{aligned} f(m_1) &\equiv f(m_2) \pmod{S} \\ (f_1 \dots f_n \omega)(m_1) &\equiv (f_1 \dots f_n \omega)(m_2) \pmod{S} \end{aligned}$$

follows from condition $m_1 \equiv m_2 \pmod{S}$ and the definition 3.3.2. Therefore, we can define operation ω on the set $\text{End}(\Omega_2; A_2/S)$ according to rule

$$(3.3.3) \quad (F_1 \dots F_n \omega)([m]) = h((f_1 \dots f_n \omega)(m))$$

From the definition (3.3.1) and equation (3.3.2), it follows that we properly defined operation ω on the set $\text{End}(\Omega_2; A_2/S)$. \square

DEFINITION 3.3.4. *Let*

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

be representation of Ω_1 -algebra A_1 ,

$$g : B_1 \longrightarrow B_2$$

be representation of Ω_1 -algebra B_1 . Let

$$(r_1 : A_1 \rightarrow B_1, r_2 : A_2 \rightarrow B_2)$$

*be morphism of representations from f into g such that r_1 is isomorphism of Ω_1 -algebra and r_2 is isomorphism of Ω_2 -algebra. Then the map $r = (r_1, r_2)$ is called **isomorphism of representations**. \square*

THEOREM 3.3.5. *Let*

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$


be representation of Ω_1 -algebra A_1 ,

$$g : B_1 \longrightarrow B_2$$

be representation of Ω_1 -algebra B_1 . Let

$$(t_1 : A_1 \rightarrow B_1, t_2 : A_2 \rightarrow B_2)$$

be morphism of representations from f into g . Then there exist decompositions of t_1 and t_2 , which we describe using diagram



3.3.5.1: The kernel of homomorphism $\ker t_i = t_i \circ t_i^{-1}$ is a congruence on Ω_i -algebra A_i , $i = 1, 2$.

3.3.5.2: There exists decomposition of homomorphism t_i , $i = 1, 2$,

$$(3.3.4) \quad t_i = r_i \circ q_i \circ p_i$$

3.3.5.3: Maps

$$\begin{aligned} p_1(a) &= a^{\ker t_1} \\ p_2(a) &= a^{\ker t_2} \end{aligned}$$

are natural homomorphisms.

3.3.5.4: Maps

$$(3.3.5) \quad q_1(p_1(a)) = t_1(a)$$

$$(3.3.6) \quad q_2(p_2(a)) = t_2(a)$$

are isomorphisms.

3.3.5.5: Maps

$$\begin{aligned} r_1 : t_1(a) \in f(A_1) &\rightarrow t_1(a) \in B_1 \\ r_2 : t_2(a) \in f(A_2) &\rightarrow t_2(a) \in B_2 \end{aligned}$$

are monomorphisms.

3.3.5.6: F is representation of Ω_1 -algebra A_1/s in A_2/s_2

3.3.5.7: G is representation of Ω_1 -algebra t_1A_1 in t_2A_2

3.3.5.8: The map $p = (p_1, p_2)$ is the morphism of representations f and F

3.3.5.9: The map $q = (q_1, q_2)$ is the isomorphism of representations F and G

3.3.5.10: The map $r = (r_1, r_2)$ is the morphism of representations G and g

3.3.5.11: There exists decompositions of morphism of representations

$$(3.3.7) \quad (t_1, t_2) = (r_1, r_2) \circ (q_1, q_2) \circ (p_1, p_2)$$

PROOF. Statements 3.3.5.1, 3.3.5.2, 3.3.5.3, 3.3.5.4, 3.3.5.5 follow from the theorem 2.3.8. Therefore, diagrams (1) and (2) are commutative.

We start from diagram (4).

Let $m_1 \equiv m_2 \pmod{\ker t_2}$. Then

$$(3.3.8) \quad t_2(m_1) = t_2(m_2)$$

Since $a_1 \equiv a_2 \pmod{\ker t_1}$, then

$$(3.3.9) \quad t_1(a_1) = t_1(a_2)$$

Therefore, $p_1(a_1) = p_1(a_2)$. Since the map (t_1, t_2) is morphism of representations, then

$$(3.3.10) \quad t_2(f(a_1)(m_1)) = g(t_1(a_1))(t_2(m_1))$$

$$(3.3.11) \quad t_2(f(a_2)(m_2)) = g(t_1(a_2))(t_2(m_2))$$

From (3.3.8), (3.3.9), (3.3.10), (3.3.11), it follows that

$$(3.3.12) \quad t_2(f(a_1)(m_1)) = t_2(f(a_2)(m_2))$$

From (3.3.12) it follows

$$(3.3.13) \quad f(a_1)(m_1) \equiv f(a_2)(m_2) \pmod{\ker t_2}$$

and, therefore,

$$(3.3.14) \quad p_2(f(a_1)(m_1)) = p_2(f(a_2)(m_2))$$

From (3.3.14) it follows that map

$$(3.3.15) \quad F(p_1(a))(p_2(m)) = p_2(f(a)(m))$$

is well defined and this map is transformation of set $A_2/\ker t_2$.

From equation (3.3.13) (in case $a_1 = a_2$) it follows that, for any a , transformation is coordinated with equivalence $\ker t_2$. From theorem 3.3.3 it follows that we defined structure of Ω_1 -algebra on the set $\text{End}(\Omega_2; A_2/\ker t_2)$. Consider n -ary operation ω and n transformations

$$F(p_1(a_i))(p_2(m)) = p_2(f(a_i)(m)) \quad i = 1, \dots, n$$

of the $A_2/\ker t_2$. We assume

$$(F(p_1(a_1)) \dots F(p_1(a_n))\omega)(p_2(m)) = p_2((f(a_1) \dots f(a_n)\omega)(m))$$

Therefore, map F is representations of Ω_1 -algebra $A_1/\ker t_1$.

According to the theorem 3.2.5, the statement 3.3.5.8 follows from (3.3.15).

Consider diagram (5).

LEMMA 3.3.6. *The map $q = (q_1, q_2)$ is the morphism of representations F and G .*

PROOF. Since q_2 is bijection, then we identify elements of the set $A_2/\ker t_2$ and the set $t_2(A_2)$, and this identification has form

$$(3.3.16) \quad q_2(p_2(m)) = t_2(m)$$

We can write transformation $F(p_1(a))$ of the set $A_2/\ker t_2$ as

$$(3.3.17) \quad F(p_1(a)) : p_2(m) \rightarrow F(p_1(a))(p_2(m))$$

Since q_2 is bijection, we define transformation

$$(3.3.18) \quad q_2(p_2(m)) \rightarrow q_2(F(p_1(a))(p_2(m)))$$

of the set $t_2(A_2)$. Transformation (3.3.18) depends on $p_1(a) \in A_1/\ker t_1$. Since q_1 is bijection, we identify elements of the set $A_1/\ker t_1$ and the set $t_1(A_1)$, and this identification has form

$$(3.3.19) \quad q_1(p_1(a)) = t_1(a)$$

Therefore, we defined map

$$G : t_1(A_1) \rightarrow \text{End}(\Omega_2; t_2(A_2))$$

according to equation

$$(3.3.20) \quad G(q_1(p_1(a)))(q_2(p_2(m))) = q_2(F(p_1(a))(p_2(m)))$$

Consider n -ary operation ω and n transformations

$$G(t_1(a_i))(t_2(m)) = q_2(F(p_1(a_i))(p_2(m))) \quad i = 1, \dots, n$$

of the set $t_2(A_2)$. We assume

$$(3.3.21) \quad (G(t_1(a_1)) \dots G(t_1(a_n))\omega)(t_2(m)) = q_2((F(p_1(a_1)) \dots F(p_1(a_n))\omega)(p_2(m)))$$

According to (3.3.20) operation ω is well defined on the set $\text{End}(\Omega_2; t_2(A_2))$. Therefore, the map G is representations of Ω_1 -algebra.

According to the theorem 3.2.5, the lemma follows from (3.3.20). \odot

LEMMA 3.3.7. *The map (q_1^{-1}, q_2^{-1}) is the morphism of representations G and F .*

PROOF. Since q_2 is bijection, then from equation (3.3.16), it follows that

$$(3.3.22) \quad p_2(m) = q_2^{-1}(t_2(m))$$

We can write transformation $G(t_1(a))$ of the set $t_2(A_2)$ as

$$(3.3.23) \quad G(t_1(a)) : t_2(m) \rightarrow G(t_1(a))(t_2(m))$$

Since q_2 is bijection, we define transformation

$$(3.3.24) \quad q_2^{-1}(t_2(m)) \rightarrow q_2^{-1}(G(t_1(a))(t_2(m)))$$

of the set $A_2/\ker t_2$. Transformation (3.3.24) depends on $t_1(a) \in t_1(A_1)$. Since q_1 is bijection, then from equation (3.3.19) it follows that

$$(3.3.25) \quad p_1(a) = q_1^{-1}(t_1(a))$$

Since, by construction, diagram (5) is commutative, then transformation (3.3.24) coincides with transformation (3.3.17). We can write the equation (3.3.21) as

$$(3.3.26) \quad \begin{aligned} & q_2^{-1}((G(t_1(a_1)) \dots G(t_1(a_n))\omega)(t_2(m))) \\ & = (F(p_1(a_1)) \dots F(p_1(a_n))\omega)(p_2(m)) \end{aligned}$$

According to the theorem 3.2.5, the lemma follows from (3.3.20), (3.3.22), (3.3.25). \odot

The statement 3.3.5.9 is corollary of definition 3.3.4 and lemmas 3.3.6 and 3.3.7.

Diagram (6) is the simplest case in our proof. Since map r_2 is immersion and diagram (2) is commutative, we identify $n \in B_2$ and $t_2(m)$ when $n \in \text{Im}t_2$. Similarly, we identify corresponding transformations.

$$(3.3.27) \quad \begin{aligned} & g'(r_1(t_1(a)))(r_2(t_2(m))) = r_2(G(t_1(a))(t_2(m))) \\ & (g'(t_1(a_1)) \dots g'(t_1(a_n))\omega)(t_2(m)) = r_2((G(t_1(a_1)) \dots G(t_1(a_n))\omega)(t_2(m))) \end{aligned}$$

Therefore, $r = (r_1, r_2)$ is morphism of representations G and g (the statement 3.3.5.10).

To prove the statement 3.3.5.11, we need to show that defined in the proof representation g' is congruent with representation g , and operations over transformations are congruent with corresponding operations over $\text{End}(\Omega_2, B_2)$.

$$\begin{aligned}
g'(r_1(t_1(a)))(r_2(t_2(m))) &= r_2(G(t_1(a))(t_2(m))) && \text{by (3.3.27)} \\
&= r_2(G(q_1(p_1(a)))(q_2(p_2(m)))) && \text{by (3.3.5), (3.3.6),} \\
&= r_2 \circ q_2(F(p_1(a))(p_2(m))) && \text{by (3.3.20)} \\
&= r_2 \circ q_2 \circ p_2(f(a)(m)) && \text{by (3.3.15)} \\
&= t_2(f(a)(m)) && \text{by (3.3.4), } i = 2 \\
&= g(t_1(a))(t_2(m)) && \text{by (3.2.2)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(G(t_1(a_1)) \dots G(t_1(a_n))\omega)(t_2(m)) &= q_2(F(p_1(a_1) \dots F(p_1(a_n))\omega)(p_2(m))) \\
&= q_2(F(p_1(a_1) \dots p_1(a_n)\omega)(p_2(m))) \\
&= q_2(F(p_1(a_1 \dots a_n\omega))(p_2(m))) \\
&= q_2(p_2(f(a_1 \dots a_n\omega)(m)))
\end{aligned}$$

□

3.4. Reduced Morphism of Representations

From theorem 3.3.5, it follows that we can reduce the problem of studying of morphism of representations of Ω_1 -algebra to the case described by diagram

$$(3.4.1) \quad \begin{array}{ccc} A_2 & \xrightarrow{p_2} & A_2/\ker t_2 \\ \uparrow f & & \uparrow F \\ A_1 & \xrightarrow{p_1} & A_1/\ker t_1 \end{array}$$

THEOREM 3.4.1. We can supplement diagram (3.4.1) with representation F_1 of Ω_1 -algebra A_1 into Ω_2 -algebra $A_2/\ker t_2$ such that diagram

$$(3.4.2) \quad \begin{array}{ccc} A_2 & \xrightarrow{p_2} & A_2/\ker t_2 \\ \uparrow f & \nearrow F_1 & \uparrow F \\ A_1 & \xrightarrow{p_1} & A_1/\ker t_1 \end{array}$$

is commutative. The set of transformations of representation F and the set of transformations of representation F_1 coincide.

PROOF. To prove theorem it is enough to assume

$$F_1(a) = F(p_1(a))$$

Since map p_1 is surjection, then $\text{Im}F_1 = \text{Im}F$. Since p_1 and F are homomorphisms of Ω_1 -algebra, then F_1 is also homomorphism of Ω_1 -algebra. \square

Theorem 3.4.1 completes the series of theorems dedicated to the structure of morphism of representations Ω_1 -algebra. From these theorems it follows that we can simplify task of studying of morphism of representations Ω_1 -algebra and not go beyond morphism of representations of form

$$(\text{id} : A_1 \rightarrow A_1, r_2 : A_2 \rightarrow B_2)$$

DEFINITION 3.4.2. Let

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

be representation of Ω_1 -algebra A_1 in Ω_2 -algebra A_2 and


$$g : A_1 \longrightarrow B_2$$

be representation of Ω_1 -algebra A_1 in Ω_2 -algebra B_2 . Let

$$(\text{id} : A_1 \rightarrow A_1, r_2 : A_2 \rightarrow B_2)$$

be morphism of representations. In this case we identify morphism (id, r_2) of representations of Ω_1 -algebra and corresponding homomorphism r_2 of Ω_2 -algebra and the homomorphism r_2 is called **reduced morphism of representations**. We will use diagram

(3.4.3)




to represent reduced morphism r_2 of representations of Ω_1 -algebra. From diagram it follows

(3.4.4)

$$r_2 \circ f(a) = g(a) \circ r_2$$

We also use diagram



instead of diagram (3.4.3). \square

THEOREM 3.4.3. Let

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

be representation of Ω_1 -algebra A_1 in Ω_2 -algebra A_2 and

$$g : A_1 \longrightarrow B_2$$

be representation of Ω_1 -algebra A_1 in Ω_2 -algebra B_2 . The map

$$r_2 : A_2 \rightarrow B_2$$

is reduced morphism of representations iff

$$(3.4.5) \quad r_2(f(a)(m)) = g(a)(r_2(m))$$

PROOF. The equality (3.4.5) follows from the equality (3.4.4). \square

THEOREM 3.4.4. Let the map

$$r_2 : A_2 \rightarrow B_2$$

be reduced morphism from representation

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

of Ω_1 -algebra A_1 into representation

$$g : A_1 \longrightarrow B_2$$

of Ω_1 -algebra A_1 . If representation f is effective, then the map

$$r_2^* : \text{End}(\Omega_2; A_2) \rightarrow \text{End}(\Omega_2; B_2)$$

defined by equation

$$(3.4.6) \quad r_2^*(f(a)) = g(a)$$

is homomorphism of Ω_1 -algebra.

PROOF. The theorem follows from the theorem 3.2.9, if we assume $h = id$. \square

THEOREM 3.4.5. Let representations


$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

$$g : A_1 \longrightarrow B_2$$

of Ω_1 -algebra A_1 be single transitive representations. There exists reduced morphism of representations from f into g

$$r_2 : A_2 \rightarrow B_2$$

PROOF. Let us choose element $m \in A_2$ and element $n \in B_2$. To define map r_2 , consider following diagram



From commutativity of diagram (1), it follows that

$$r_2(f(a)(m)) = g(a)(r_2(m))$$

For arbitrary $m' \in A_2$, we defined unambiguously $a \in A_1$ such that $m' = f(a)(m)$. Therefore, we defined map r_2 which satisfies to equation (3.4.4). \square

THEOREM 3.4.6. *Let representations*

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

$$g : A_1 \longrightarrow B_2$$

of Ω_1 -algebra A_1 be single transitive representations. *Reduced morphism of representations from f into g*

$$r_2 : A_2 \rightarrow B_2$$

is unique up to choice of image $n = r_2(m) \in B_2$ of given element $m \in A_2$.

PROOF. From proof of theorem 3.4.5, it follows that choice of elements $m \in A_2$, $n \in B_2$ uniquely defines the map r_2 . \square

THEOREM 3.4.7. *Let*

$$f : A \longrightarrow B$$

*be representation of Ω_1 -algebra A in Ω_2 -algebra B . Let N be such congruence^{3.6} on Ω_2 -algebra B that any transformation $h \in \text{End}(\Omega_2, B)$ is coordinated with congruence N . *There exists representation**

$$f_1 : A \longrightarrow B/N$$

of Ω_1 -algebra A in Ω_2 -algebra B/N and the map

$$\text{nat } N : B \rightarrow B/N$$

is reduced morphism of representation f into the representation f_1

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{j} & B/N \\ & \swarrow f^* & \nearrow f_1^* \\ & A & \end{array} \quad j = \text{nat } N$$

PROOF. We can represent any element of the set B/N as $j(a)$, $a \in B$.

According to the theorem [14]-II.3.5, there exists a unique Ω_2 -algebra structure on the set B/N . If $\omega \in \Omega_2(p)$, then we define operation ω on the set B/N according to the equality (3) on page [14]-59

$$(3.4.7) \quad j(b_1) \dots j(b_p) \omega = j(b_1 \dots b_p \omega)$$

As well as in the proof of the theorem 3.3.5, we can define the representation

$$f_1 : A \longrightarrow B/N$$

using equality

$$(3.4.8) \quad f_1(a) \circ j(b) = j(f(a) \circ b)$$

We can represent the equality (3.4.8) using diagram

$$(3.4.9) \quad \begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{j} & B/N \\ f(a) \uparrow & & \uparrow f_1(a) \\ B & \xrightarrow{j} & B/N \end{array}$$

^{3.6}See the definition of congruence on p. [14]-57.

Let $\omega \in \Omega_2(p)$. Since the maps $f(a)$ and j are homomorphisms of Ω_2 -algebra, then

$$\begin{aligned}
 f_1(a) \circ (j(b_1) \dots j(b_p)\omega) &= f_1(a) \circ j(b_1 \dots b_p\omega) \\
 &= j(f(a) \circ (b_1 \dots b_p\omega)) \\
 (3.4.10) \qquad &= j((f(a) \circ b_1) \dots (f(a) \circ b_p)\omega) \\
 &= j(f(a) \circ b_1) \dots j(f(a) \circ b_p)\omega \\
 &= (f_1(a) \circ j(b_1)) \dots (f_1(a) \circ j(b_p))\omega
 \end{aligned}$$

From the equality (3.4.10), it follows that the map $f_1(a)$ is homomorphism of Ω_2 -algebra. From the equality (3.4.8), according to the definition 3.4.2, it follows that the map j is reduced morphism of the representation f into the representation f_1 . \square

THEOREM 3.4.8. *Let*

$$f : A \dashrightarrow B$$

be representation of Ω_1 -algebra A in Ω_2 -algebra B . Let N be such congruence on Ω_2 -algebra B that any transformation $h \in \text{End}(\Omega_2, B)$ is coordinated with congruence N . Consider category \mathcal{A} whose objects are reduced morphisms of representations^{3.7}

$$R_1 : B \rightarrow S_1 \quad \ker R_1 \supseteq N$$

$$R_2 : B \rightarrow S_2 \quad \ker R_2 \supseteq N$$

where S_1, S_2 are Ω_2 -algebras and

$$g_1 : A \dashrightarrow S_1 \quad g_2 : A \dashrightarrow S_2$$

are representations of Ω_1 -algebra A . We define morphism $R_1 \rightarrow R_2$ to be reduced morphism of representations $h : S_1 \rightarrow S_2$ making following diagram commutative

$$\begin{array}{ccc}
 & & S_1 \\
 & \nearrow^{g_1} & \uparrow R_1 \\
 A & \xrightarrow{f} & B \\
 & \searrow_{g_2} & \downarrow R_2 \\
 & & S_2 \\
 & & \downarrow h
 \end{array}$$

The reduced morphism $\text{nat } N$ of representation f into representation f_1 (the theorem 3.4.7) is universally repelling in the category \mathcal{A} .^{3.8}

^{3.7}The statement of lemma is similar to the statement on page [2]-119.

^{3.8}See definition of universal object of category in definition on p. [2]-57.

PROOF. From the theorem 2.1.6, it follows that there exists and unique the map h for which the following diagram is commutative

$$\begin{array}{ccc}
 & & B/N \quad j = \text{nat } N \quad \ker R \supseteq N \\
 & \xrightarrow{f_1} & \nearrow j \\
 A & \xrightarrow{f} & B \\
 & \searrow & \searrow R \\
 & & S \\
 & \xrightarrow{g} & \downarrow h
 \end{array}$$

Therefore, we can uniquely define the map h using equality

$$(3.4.11) \quad h(j(b)) = R(b)$$

Let $\omega \in \Omega_2(p)$. Since maps R and j are homomorphisms of Ω_2 -algebra, then

$$(3.4.12) \quad \begin{aligned} h(j(b_1) \dots j(b_p)\omega) &= h(j(b_1 \dots b_p\omega)) = R(b_1 \dots b_p\omega) = R(b_1) \dots R(b_p)\omega \\ &= h(j(b_1)) \dots h(j(b_p))\omega \end{aligned}$$

From the equality (3.4.12), it follows that the map h is homomorphism of Ω_2 -algebra.

Since the map R is reduced morphism of the representation f into the representation g , then the following equality is satisfied

$$(3.4.13) \quad g(a)(R(b)) = R(f(a)(b))$$

From the equality (3.4.11) it follows that

$$(3.4.14) \quad g(a)(h(j(b))) = g(a)(R(b))$$

From the equalities (3.4.13), (3.4.14) it follows that

$$(3.4.15) \quad g(a)(h(j(b))) = R(f(a)(b))$$

From the equalities (3.4.11), (3.4.15) it follows that

$$(3.4.16) \quad g(a)(h(j(b))) = h(j(f(a)(b)))$$

From the equalities (3.4.8), (3.4.16) it follows that

$$(3.4.17) \quad g(a)(h(j(b))) = h(f_1(a)(j(b)))$$

From the equality (3.4.17) it follows that the map h is reduced morphism of representation f_1 into the representation g . \square

3.5. Automorphism of Representation of Universal Algebra

DEFINITION 3.5.1. Let

$$f : A_1 \xrightarrow{*} A_2$$

be representation of Ω_1 -algebra A_1 in Ω_2 -algebra A_2 . The reduced morphism of representations of Ω_1 -algebra

$$r_2 : A_2 \rightarrow A_2$$

such, that r_2 is endomorphism of Ω_2 -algebra is called **endomorphism of representation** f . \square

THEOREM 3.5.2. *Given single transitive representation*

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

of Ω_1 -algebra A_1 , for any $a_{21}, a_{22} \in A_2$ there exists unique endomorphism

$$r_2 : A_2 \rightarrow A_2$$

of representation f such that $r_2(a_{21}) = a_{22}$.

PROOF. Consider following diagram

$$\begin{array}{ccc} A_2 & \xrightarrow{r_2} & A_2 \\ & \swarrow f & \nearrow f \\ & A_1 & \end{array}$$

Existence of endomorphism is corollary of the theorem 3.2.10. For given $p, q \in A_2$, uniqueness of endomorphism follows from the theorem 3.2.11 when $r_1 = \text{id}$. \square

THEOREM 3.5.3. *Endomorphisms of representation f form semigroup.*

PROOF. From theorem 3.3.1, it follows that the product of endomorphisms (id, p_2) , (id, r_2) of the representation f is endomorphism $(\text{id}, p_2 \circ r_2)$ of the representation f . \square

DEFINITION 3.5.4. *Let*

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

be representation of Ω_1 -algebra A_1 in Ω_2 -algebra A_2 . The morphism of representations of Ω_1 -algebra

$$r_2 : A_2 \rightarrow A_2$$

such, that r_2 is automorphism of Ω_2 -algebra is called **automorphism of representation f** . \square

THEOREM 3.5.5. *Let*

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

be representation of Ω_1 -algebra A_1 in Ω_2 -algebra A_2 . The set of automorphisms of the representation f forms **group $GA(f)$** .

PROOF. Let r_2, p_2 be automorphisms of the representation f . According to definition 3.5.4, maps r_2, p_2 are automorphisms of Ω_2 -algebra A_2 . According to theorem II.3.2, ([14], p. 57), the map $r_2 \circ p_2$ is automorphism of Ω_2 -algebra A_2 . From the theorem 3.3.1 and the definition 3.5.4, it follows that product of automorphisms $r_2 \circ p_2$ of the representation f is automorphism of the representation f .

Let r_2, p_2, q_2 be automorphisms of the representation f . The associativity of product of maps r_2, p_2, q_2 follows from the chain of equations^{3.9}

$$\begin{aligned} ((r_2 \circ p_2) \circ q_2)(a) &= (r_2 \circ p_2)(q_2(a)) = r_2(p_2(q_2(a))) \\ &= r_2((p_2 \circ q_2)(a)) = (r_2 \circ (p_2 \circ q_2))(a) \end{aligned}$$

Let r_2 be an automorphism of the representation f . According to definition 3.5.4 the map r_2 is automorphism of Ω_2 -algebra A_2 . Therefore, the map r_2^{-1} is

^{3.9} To prove the associativity of product I follow to the example of the semigroup from [5], p. 20, 21.

automorphism of Ω_2 -algebra A_2 . The equation (3.2.3) is true for automorphism r_2 of representation. Let $m' = r_2(m)$. Since r_2 is automorphism of Ω_2 -algebra, then $m = r_2^{-1}(m')$ and we can write (3.2.3) in the form

$$(3.5.1) \quad r_2(f(a')(r_2^{-1}(m'))) = f(a')(m')$$

Since the map r_2 is automorphism of Ω_2 -algebra A_2 , then from the equation (3.5.1) it follows that

$$(3.5.2) \quad f(a')(r_2^{-1}(m')) = r_2^{-1}(f(a')(m'))$$

The equation (3.5.2) corresponds to the equation (3.2.3) for the map r_2^{-1} . Therefore, map r_2^{-1} of the representation f . \square

CHAPTER 4

Ω-Group

4.1. Set of Homomorphisms of Ω-Algebra

THEOREM 4.1.1. *Let sets A, B be Ω-algebras. Then the set $\text{Hom}(\Omega; A \rightarrow B)$ also is Ω-algebra when for any operations $\omega_1 \in \Omega(m), \omega_2 \in \Omega(n)$, the following equality is true*

$$(4.1.1) \quad (a_{11} \dots a_{1n} \omega_2) \dots (a_{m1} \dots a_{mn} \omega_2) \omega_1 = (a_{11} \dots a_{m1} \omega_1) \dots (a_{1n} \dots a_{mn} \omega_1) \omega_2$$

PROOF. According to the theorem 2.2.6, the set B^A is Ω-algebra. Let $\omega \in \Omega(n)$. For maps $f_1, \dots, f_n \in B^A$, we define the operation ω by the equality

$$(4.1.2) \quad (f_1 \dots f_n \omega)(x) = f_1(x) \dots f_n(x) \omega$$

Let $\omega_1 \in \Omega(m), \omega_2 \in \Omega(n)$. Let maps $f_1, \dots, f_m \in \text{Hom}(\Omega; A \rightarrow B)$ be homomorphisms from Ω-algebra A to Ω-algebra B . In particular, for any $a_1, \dots, a_n \in A$

$$(4.1.3) \quad \begin{aligned} f_1(a_1 \dots a_n \omega_2) &= f_1(a_1) \dots f_1(a_n) \omega_2 \\ &\dots = \dots \\ f_m(a_1 \dots a_n \omega_2) &= f_m(a_1) \dots f_m(a_n) \omega_2 \end{aligned}$$

Since we require that the map $f_1 \dots f_m \omega_1$ is homomorphism from Ω-algebra A to Ω-algebra B , then

$$(4.1.4) \quad (f_1 \dots f_m \omega_1)(a_1 \dots a_n \omega_2) = ((f_1 \dots f_m \omega_1)(a_1)) \dots ((f_1 \dots f_m \omega_1)(a_n)) \omega_2$$

According to the definition (4.1.2), the equality

$$(4.1.5) \quad \begin{aligned} &f_1(a_1 \dots a_n \omega_2) \dots f_m(a_1 \dots a_n \omega_2) \omega_1 \\ &= (f_1(a_1) \dots f_m(a_1) \omega_1) \dots (f_1(a_n) \dots f_m(a_n) \omega_1) \omega_2 \end{aligned}$$

follows from the equality (4.1.4). The equality

$$(4.1.6) \quad \begin{aligned} &(f_1(a_1) \dots f_1(a_n) \omega_2) \dots (f_m(a_1) \dots f_m(a_n) \omega_2) \omega_1 \\ &= (f_1(a_1) \dots f_m(a_1) \omega_1) \dots (f_1(a_n) \dots f_m(a_n) \omega_1) \omega_2 \end{aligned}$$

follows from the equalities (4.1.3), (4.1.5). Let

$$(4.1.7) \quad a_{ij} = f_i(a_j)$$

The equality (4.1.1) follows from the equalities (4.1.6), (4.1.7). □

Not every Ω-algebra satisfies to conditions of the theorem 4.1.1.

THEOREM 4.1.2. *Let G_1, G_2 be Abelian semigroups. The set $\text{Hom}(\{+\}; G_1 \rightarrow G_2)$ also is Abelian semigroup.*

PROOF. Since sum in Abelian semigroup is commutative and associative, then the theorem follows from the theorem 4.1.1. □

THEOREM 4.1.3. *The set $\text{End}(\{+\}; A)$ of endomorphism of Abelian group A is Abelian group.*

PROOF. The theorem follows from theorems 2.2.13, 4.1.2 and from the statement that the equation

$$x + a = 0$$

has root in Abelian group. \square

THEOREM 4.1.4. *Let D_1, D_2 be rings. In general, the set $\text{Hom}(\{+, *\}; D_1 \rightarrow D_2)$ is not ring.*

PROOF. There are two operations in the ring: sum which is commutative and associative and product which is distributive over sum. According to the theorem 4.1.1, sum and product must satisfy the equality

$$(4.1.8) \quad a_{11}a_{21} + a_{12}a_{22} = (a_{11} + a_{12})(a_{21} + a_{22})$$

However right hand side of the equality (4.1.8) has form

$$\begin{aligned} (a_{11} + a_{12})(a_{21} + a_{22}) &= (a_{11} + a_{12})a_{21} + (a_{11} + a_{12})a_{22} \\ &= a_{11}a_{21} + a_{12}a_{21} + a_{11}a_{22} + a_{12}a_{22} \end{aligned}$$

Therefore, the equality (4.1.8) is not true. \square

Analysis of theorems 4.1.2, 4.1.4 tells us that the set of Ω -algebras which satisfies to conditions of the theorem 4.1.1, is small.

QUESTION 4.1.5. *Is there a universal algebra which is different from the Abelian semigroup and satisfies to conditions of the theorem 4.1.1?* \square

From our experience, it follows that certain Ω -algebras contain an operation which alone generates semigroup. So we change the statement of the theorem 4.1.1.

THEOREM 4.1.6. *Let sets A, B be Ω -algebras. Let $\omega \in \Omega(n)$. Then the set $\text{Hom}(\Omega; A \rightarrow B)$ is closed with respect to operation ω when the following equality is true*

$$(4.1.9) \quad \begin{aligned} &(a_{11}\dots a_{1n}\omega)\dots(a_{n1}\dots a_{nn}\omega)\omega \\ &= (a_{11}\dots a_{n1}\omega)\dots(a_{1n}\dots a_{nn}\omega)\omega \end{aligned}$$

PROOF. In general, we consider the set $\text{Hom}(\{\omega\}; A \rightarrow B)$. The theorem follows from the theorem 4.1.1. \square

THEOREM 4.1.7. *Let the operation $\omega \in \Omega(2)$ be commutative and associative. Then the set $\text{Hom}(\Omega; A \rightarrow B)$ is closed with respect to operation ω .*

PROOF. Since the operation $\omega \in \Omega(2)$ is commutative and associative, then

$$(4.1.10) \quad \begin{aligned} (a_{11}a_{12}\omega)(a_{21}a_{22}\omega)\omega &= a_{11}(a_{12}(a_{21}a_{22}\omega)\omega)\omega \\ &= a_{11}((a_{12}a_{21}\omega)a_{22}\omega)\omega \\ &= a_{11}((a_{21}a_{12}\omega)a_{22}\omega)\omega \\ &= a_{11}(a_{21}(a_{12}a_{22}\omega)\omega)\omega \\ &= (a_{11}a_{21}\omega)(a_{12}\dots a_{22}\omega)\omega \end{aligned}$$

The theorem follows from the equality (4.1.10) and from the theorem 4.1.6. \square

THEOREM 4.1.8. *Let the operation $\omega \in \Omega(2)$ have a neutral element and the set $\text{Hom}(\Omega; A \rightarrow B)$ be closed with respect to operation ω . Then the operation ω is commutative and associative.*

PROOF. Equalities

$$(4.1.11) \quad ab\omega = (eaw)(bew)\omega = (ebw)(aew)\omega = baw$$

$$(4.1.12) \quad a(bc\omega) = (aew)(bc\omega)\omega = (ab\omega)(ec\omega)\omega = (ab\omega)c\omega$$

follow from equalities (2.4.1), (2.4.2), (4.1.9). Commutativity of the operation ω follows from the equality (4.1.11). Associativity of the operation ω follows from the equality (4.1.12). \square

QUESTION 4.1.9. *Is there an operator domain Ω , for which following statements are true?*

- The set $\text{Hom}(\Omega; A \rightarrow B)$ is closed with respect to operation $\omega \in \Omega(2)$.
- The operation ω is not commutative or associative.

\square

4.2. Ω -Group

Let the operation $\omega \in \Omega_2(2)$ which is commutative and associative be defined in Ω_2 -algebra A_2 . We identify the operation ω and sum. We use the symbol $+$ to denote sum. Let

$$\Omega = \Omega_2 \setminus \{+\}$$

DEFINITION 4.2.1. *A map*

$$f : A_2 \rightarrow B_2$$

of Ω_2 -algebra A_2 into Ω_2 -algebra B_2 is called **additive map** if

$$f(a + b) = f(a) + f(b)$$

Let us denote $\mathcal{A}(A_2 \rightarrow B_2)$ set of additive maps of Ω_2 -algebra A_2 into Ω_2 -algebra B_2 . \square

THEOREM 4.2.2. $\mathcal{A}(A_2 \rightarrow B_2) = \text{Hom}(\{+\}; A_2 \rightarrow B_2)$.

PROOF. The theorem follows from definitions 2.2.9, 4.2.1. \square

DEFINITION 4.2.3. *A map*

$$g : A^n \rightarrow A$$

is called **polyadditive map** if for any $i, i = 1, \dots, n$,

$$f(a_1, \dots, a_i + b_i, \dots, a_n) = f(a_1, \dots, a_i, \dots, a_n) + f(a_1, \dots, b_i, \dots, a_n)$$

\square

THEOREM 4.2.4. *Let the map*

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

be the effective representation of Ω -algebra A_1 in Abelian semigroup A_2 .

4.2.4.1: *On the set A_1 there is a structure of Abelian semigroup*

$$(4.2.1) \quad f(a_1 + b_1)(a_2) = f(a_1)(a_2) + f(b_1)(a_2)$$

4.2.4.2: *The representation f is additive map.*

4.2.4.3: *The map f is the representation of Ω_1 -algebra A_1 , where $\Omega_1 = \Omega \cup \{+\}$.*

PROOF. According to theorems 2.2.13, 4.1.7, the set $\text{End}(\{+\}, A_2)$ is Abelian semigroup. Since the representation f is effective, then, according to theorems 3.1.3, 4.1.1, for any A_1 -numbers a, b , there exists unique A_1 -number c such that

$$(4.2.2) \quad f(c)(m) = f(a)(m) + f(b)(m)$$

Based on the equality (4.2.2), we introduce the sum of A_1 -numbers

$$(4.2.3) \quad c = a + b$$

The equality (4.2.1) follows from equalities (4.2.2), (4.2.3).

LEMMA 4.2.5. *The sum of A_1 -numbers is commutative.*

PROOF. Since the sum of A_2 -numbers is commutative, then the equality

$$(4.2.4) \quad \begin{aligned} f(a_1 + b_1)(a_2) &= f(a_1)(a_2) + f(b_1)(a_2) = f(b_1)(a_2) + f(a_1)(a_2) \\ &= f(b_1 + a_1)(a_2) \end{aligned}$$

follows from the equality (4.2.1). The lemma follows from the equality (4.2.4). \odot

LEMMA 4.2.6. *The sum of A_1 -numbers is associative.*

PROOF. Since the sum of A_2 -numbers is associative, then the equality

$$(4.2.5) \quad \begin{aligned} f((a_1 + b_1) + c_1)(a_2) &= f(a_1 + b_1)(a_2) + f(c_1)(a_2) \\ &= (f(a_1)(a_2) + f(b_1)(a_2)) + f(c_1)(a_2) \\ &= f(a_1)(a_2) + (f(b_1)(a_2) + f(c_1)(a_2)) \\ &= f(a_1)(a_2) + f(b_1 + c_1)(a_2) \\ &= f(a_1 + (b_1 + c_1))(a_2) \end{aligned}$$

follows from the equality (4.2.1). The lemma follows from the equality (4.2.5). \odot

The statement 4.2.4.1 follows from the equality (4.2.3), from lemmas 4.2.5, 4.2.6 and the definition 2.4.4.

The statement 4.2.4.2 follows from the equality (4.2.3). The statement 4.2.4.3 follows from the statement 4.2.4.2, since the map f is homomorphism of Ω -algebra. \square

THEOREM 4.2.7. *Let $\omega \in \Omega(n)$, $\omega_1 \in \Omega(m)$. The map*

$$(4.2.6) \quad g : a_i \rightarrow a_1 \dots a_n \omega$$

is compatible with the operation ω_1 when the following equality is true

$$(4.2.7) \quad a_1 \dots (a_{i_1} \dots a_{i_m} \omega_1) \dots a_n \omega = (a_1 \dots a_{i_1} \dots a_n \omega) \dots (a_1 \dots a_{i_m} \dots a_n \omega) \omega_1$$

PROOF. The equality

$$(4.2.8) \quad \begin{aligned} g(a_{i_1} \dots a_{i_m} \omega_1) &= a_1 \dots (a_{i_1} \dots a_{i_m} \omega_1) \dots a_n \omega \\ &= (a_1 \dots a_{i_1} \dots a_n \omega) \dots (a_1 \dots a_{i_m} \dots a_n \omega) \omega_1 \\ &= g(a_{i_1}) \dots g(a_{i_m}) \omega_1 \end{aligned}$$

follows from equalities (4.2.7), (4.2.6). The theorem follows from the definition 2.2.9 and the equality (4.2.8). \square

The equality (4.2.7) is less restrictive than the equality (4.1.1). However, like in the case of the theorem 4.1.1, the majority of operations of universal algebra do

not satisfy to the theorem 4.2.7. Since the addition satisfies to the theorem 4.1.1, we expect that there are conditions when addition satisfies to the theorem 4.2.7.

THEOREM 4.2.8. *Let $\omega \in \Omega(n)$. Since the map*

$$(4.2.9) \quad g : a_i \rightarrow a_1 \dots a_n \omega$$

is compatible with the addition for any i , then the operation ω is polyadditive map.

PROOF. According to the theorem 4.2.7, since the map (4.2.9) is compatible with the sum, then following equality is true

$$(4.2.10) \quad a_1 \dots (a_{i_1} + a_{i_2}) \dots a_n \omega = (a_1 \dots a_{i_1} \dots a_n \omega) + (a_1 \dots a_{i_2} \dots a_n \omega)$$

The theorem follows from the equality (4.2.10) and the definition 4.2.3. \square

THEOREM 4.2.9. *Let $\omega \in \Omega(n)$ be polyadditive map. The operation ω is distributive over addition*

$$a_1 \dots (a_i + b_i) \dots a_n \omega = a_1 \dots a_i \dots a_n \omega + a_1 \dots b_i \dots a_n \omega \quad i = 1, \dots, n$$

PROOF. The theorem follows from the theorem 4.2.8. \square

DEFINITION 4.2.10. *Let sum which is not necessarily commutative be defined in Ω_1 -algebra A . We use the symbol $+$ to denote sum. Let*

$$\Omega = \Omega_1 \setminus \{+\}$$

*If Ω_1 -algebra A is group relative to sum and any operation $\omega \in \Omega$ is polyadditive map, then Ω_1 -algebra A is called Ω -group. If Ω -group A is associative group relative to sum, then Ω_1 -algebra A is called **associative Ω -group**. If Ω -group A is Abelian group relative to sum, then Ω_1 -algebra A is called **Abelian Ω -group**. \square*

EXAMPLE 4.2.11. *The group is the most evident example of Ω -group. A ring is Ω -group.*

Biring of matrices over division ring ([8]) is Ω -group. \square

REMARK 4.2.12. *Bourbaki consider similar definition, namely group with operators (see the definition 2 in [16] on page 31). \square*

THEOREM 4.2.13. *Let A be Ω -group. Let $\omega \in \Omega(n)$. The map*

$$g : a_i \rightarrow a_1 \dots a_n \omega$$

is endomorphism of additive group A .

PROOF. The theorem follows from the theorem 4.2.9 and the definition 4.2.10. \square

THEOREM 4.2.14. *Let the map*

$$g : A_1 \xrightarrow{*} A_2$$

be the representation of Ω -group A_1 . Then the map

$$\left(a_i \rightarrow a_1 \dots a_n \omega \quad f(a_i) \rightarrow f(a_1) \dots f(a_n) \omega \right)$$

is morphism of the representation f of additive group A_1 .

PROOF. The theorem follows from the theorem 4.2.13 and definitions 3.1.1, 3.2.2. \square

4.3. Cartesian Product of Representations

LEMMA 4.3.1. *Let*

$$A = \prod_{i \in I} A_i$$

be Cartesian product of family of Ω_2 -algebras $(A_i, i \in I)$. For each $i \in I$, let the set $\text{End}(\Omega_2, A_i)$ be Ω_1 -algebra. Then the set

$$(4.3.1) \quad {}^\circ A = \{f \in \text{End}(\Omega_2; A) : f(a_i, i \in I) = (f_i(a_i), i \in I)\}$$

is Cartesian product of Ω_1 -algebras $\text{End}(\Omega_2, A_i)$.

PROOF. According to the definition (4.3.1), we can represent a map $f \in {}^\circ A$ as tuple

$$f = (f_i, i \in I)$$

of maps $f_i \in \text{End}(\Omega_2; A_i)$. According to the definition (4.3.1),

$$(f_i, i \in I)(a_i, i \in I) = (f_i(a_i), i \in I)$$

Let $\omega \in \Omega_2$ be n-ary operation. We define operation ω on the set ${}^\circ A$ using equality

$$((f_{1i}, i \in I) \dots (f_{ni}, i \in I)\omega)(a_i, i \in I) = ((f_{1i}(a_i)) \dots (f_{ni}(a_i))\omega, i \in I)$$

□

DEFINITION 4.3.2. *Let \mathcal{A}_1 be category of Ω_1 -algebras. Let \mathcal{A}_2 be category of Ω_2 -algebras. We define **category $\mathcal{A}_1(\mathcal{A}_2)$ of representations**. Representations of Ω_1 -algebra in Ω_2 -algebra are objects of this category. Morphisms of corresponding representations are morphisms of this category.* □

THEOREM 4.3.3. *In category $\mathcal{A}_1(\mathcal{A}_2)$ there exists product of single transitive representations of Ω_1 -algebra in Ω_2 -algebra.*

PROOF. For $j = 1, 2$, let

$$P_j = \prod_{i \in I} B_{ji}$$

be product of family of Ω_j -algebras $\{B_{ji}, i \in I\}$ and for any $i \in I$ the map

$$t_{ji} : P_j \longrightarrow B_{ji}$$

be projection onto factor i . For each $i \in I$, let

$$h_i : B_{1i} \dashrightarrow B_{2i}$$

be single transitive B_{1i} -representation in Ω_2 -algebra B_{2i} .

Let $b_1 \in P_1$. According to the statement 2.3.3.3, we can represent P_1 -number b_1 as tuple of B_{1i} -numbers

$$(4.3.2) \quad b_1 = (b_{1i}, i \in I) \quad b_{1i} = t_{1i}(b_1) \in B_{1i}$$

Let $b_2 \in P_2$. According to the statement 2.3.3.3, we can represent P_2 -number b_2 as tuple of B_{2i} -numbers

$$(4.3.3) \quad b_2 = (b_{2i}, i \in I) \quad b_{2i} = t_{2i}(b_2) \in B_{2i}$$

LEMMA 4.3.4. For each $i \in I$, consider diagram of maps

$$(4.3.4) \quad \begin{array}{ccc} & P_2 & \xrightarrow{t_{2i}} B_{2i} \\ & \swarrow g(b_1) & \nearrow h_i(b_{1i}) \\ P_1 & \xrightarrow{t_{1i}} B_{1i} & \xrightarrow{h_i} P_2 \xrightarrow{t_{2i}} B_{2i} \\ & \searrow g & \swarrow h_i(b_{1i}) \end{array} \quad (1)$$

Let map

$$g : P_1 \rightarrow \text{End}(\Omega_2; P_2)$$

be defined by the equality

$$(4.3.5) \quad g(b_1)(b_2) = (h_i(b_{1i})(b_{2i}), i \in I)$$

Then the map g is single transitive P_1 -representation in Ω_2 -algebra P_2

$$g : P_1 \dashrightarrow P_2$$

The map (t_{1i}, t_{2i}) is morphism of representation g into representation h_i .

PROOF.

4.3.4.1: According to definitions 3.1.1, the map $h_i(b_{1i})$ is homomorphism of Ω_2 -algebra B_{2i} . According to the theorem 2.3.6, from commutativity of the diagram (1) for each $i \in I$, it follows that the map

$$g(b_1) : P_2 \rightarrow P_2$$

defined by the equality (4.3.5) is homomorphism of Ω_2 -algebra P_2 .

4.3.4.2: According to the definition 3.1.1, the set $\text{End}(\Omega_2; B_{2i})$ is Ω_1 -algebra. According to the lemma 4.3.1, the set ${}^\circ P_2 \subseteq \text{End}(\Omega_2; P_2)$ is Ω_1 -algebra.

4.3.4.3: According to the definition 3.1.1, the map

$$h_i : B_{1i} \rightarrow \text{End}(\Omega_2; B_{2i})$$

is homomorphism of Ω_1 -algebra. According to the theorem 2.3.6, the map

$$g : P_1 \rightarrow \text{End}(\Omega_2; P_2)$$

defined by the equality

$$g(b_1) = (h_i(b_{1i}), i \in I)$$

is homomorphism of Ω_1 -algebra.

According to statements 4.3.4.1, 4.3.4.3 and to the definition 3.1.1, the map g is P_1 -representation in Ω_2 -algebra P_2 .

Let $b_{21}, b_{22} \in P_2$. According to the statement 2.3.3.3, we can represent P_2 -numbers b_{21}, b_{22} as tuples of B_{2i} -numbers

$$(4.3.6) \quad \begin{aligned} b_{21} &= (b_{21i}, i \in I) & b_{21i} &= t_{2i}(b_{21}) \in B_{2i} \\ b_{22} &= (b_{22i}, i \in I) & b_{22i} &= t_{2i}(b_{22}) \in B_{2i} \end{aligned}$$

According to the theorem 3.1.9, since the representation h_i is single transitive, then there exists unique B_{1i} -number b_{1i} such that

$$b_{22i} = h_i(b_{1i})(b_{21i})$$

According to definitions (4.3.2), (4.3.5), (4.3.6), there exists unique P_1 -number b_1 such that

$$b_{22} = g(b_1)(b_{21})$$

According to the theorems 3.1.9, the representation g is single transitive.

From commutativity of diagram (1) and from the definition 3.2.2, it follows that map (t_{1i}, t_{2i}) is morphism of representation g into representation h_i . \odot

Let

$$(4.3.7) \quad d_2 = g(b_1)(b_2) \quad d_2 = (d_{2i}, i \in I)$$

From equalities (4.3.5), (4.3.7), it follows that

$$(4.3.8) \quad d_{2i} = h_i(b_{1i})(b_{2i})$$

For $j = 1, 2$, let R_j be other object of category \mathcal{A}_j . For any $i \in I$, let the map

$$r_{1i} : R_1 \longrightarrow B_{1i}$$

be morphism from Ω_1 -algebra R_1 into Ω_1 -algebra B_{1i} . According to the definition 2.3.1, there exists a unique morphism of Ω_1 -algebra

$$s_1 : R_1 \longrightarrow P_1$$

such that following diagram is commutative

$$(4.3.9) \quad \begin{array}{ccc} P_1 & \xrightarrow{t_{1i}} & B_{1i} \\ s_1 \uparrow & \searrow r_{1i} & \\ R_1 & & \end{array} \quad t_{1i}(s_1) = r_{1i}$$

Let $a_1 \in R_1$. Let

$$(4.3.10) \quad b_1 = s_1(a_1) \in P_1$$

From commutativity of the diagram (4.3.9) and statements (4.3.10), (4.3.2), it follows that

$$(4.3.11) \quad b_{1i} = r_{1i}(a_1)$$

Let

$$f : R_1 \dashrightarrow R_2$$

be single transitive R_1 -representation in Ω_2 -algebra R_2 . According to the theorem 3.2.11, a morphism of Ω_2 -algebra

$$r_{2i} : R_2 \longrightarrow B_{2i}$$

such that map (r_{1i}, r_{2i}) is morphism of representations from f into h_i is unique up to choice of image of R_2 -number a_2 . According to the remark 3.2.7, in diagram

of maps

(4.3.12)




diagram (2) is commutative. According to the definition 2.3.1, there exists a unique morphism of Ω_2 -algebra

$$s_2 : R_2 \longrightarrow P_2$$

such that following diagram is commutative

$$(4.3.13) \quad \begin{array}{ccc} P_2 & \xrightarrow{t_{2i}} & B_{2i} \\ \uparrow s_2 & & \uparrow r_{2i} \\ R_2 & & \end{array} \quad t_{2i}(s_2) = r_{2i}$$

Let $a_2 \in R_2$. Let

$$(4.3.14) \quad b_2 = s_2(a_2) \in P_2$$

From commutativity of the diagram (4.3.13) and statements (4.3.14), (4.3.3), it follows that

$$(4.3.15) \quad b_{2i} = r_{2i}(a_2)$$

Let

$$(4.3.16) \quad c_2 = f(a_1)(a_2)$$

From commutativity of the diagram (2) and equalities (4.3.8), (4.3.15), (4.3.16), it follows that


$$(4.3.17) \quad d_{2i} = r_{2i}(c_2)$$

From equalities (4.3.8), (4.3.17), it follows that

$$(4.3.18) \quad d_2 = s_2(c_2)$$

and this is consistent with commutativity of the diagram (4.3.13).

For each $i \in I$, we join diagrams of maps (4.3.4), (4.3.9), (4.3.13), (4.3.12)



From equalities (4.3.7), (4.3.14) and from equalities (4.3.16), (4.3.18), commutativity of the diagram (3) follows. Therefore, the map (s_1, s_2) is morphism of representations from f into g . According to the theorem 3.2.11, the morphism (s_1, s_2) is defined unambiguously, since we require (4.3.18).

According to the definition 2.3.1, the representation g and family of morphisms of representation $((t_{1i}, t_{2i}), i \in I)$ is product in the category $\mathcal{A}_1(\mathcal{A}_2)$. \square

DEFINITION 4.3.5. Let A_1, \dots, A_n, A be Ω_1 -algebras. Let B_1, \dots, B_n, B be Ω_2 -algebras. Let, for any $k, k = 1, \dots, n$,

$$f_k : A_k \longrightarrow B_k$$

be representation of Ω_1 -algebra A_k in Ω_2 -algebra B_k . Let

$$f : A \longrightarrow B$$

be representation of Ω_1 -algebra A in Ω_2 -algebra B . The map

$$\left(r_{1k} : A_k \rightarrow A \quad k = 1, \dots, n \quad r_2 : B_1 \times \dots \times B_n \rightarrow B \right)$$

is called **polymorphism of representations** f_1, \dots, f_n into representation f , if, for any $k, k = 1, \dots, n$, provided that all variables except variables $a_k \in A_k, b_k \in B_k$ have given value, the map (r_{1k}, r_2) is a morphism of representation f_k into representation f .

If $f_1 = \dots = f_n$, then we say that the map $((r_{1,k}, k = 1, \dots, n) r_2)$ is polymorphism of representation f_1 into representation f .

If $f_1 = \dots = f_n = f$, then we say that the map $((r_{1,k}, k = 1, \dots, n) r_2)$ is polymorphism of representation f . \square

We also say that the map $r = (r_1, r_2)$ is polymorphism of representations in Ω_2 -algebras B_1, \dots, B_n into representation in Ω_2 -algebra B .

THEOREM 4.3.6. Let the map $((r_{1,k}, k = 1, \dots, n) r_2)$ be polymorphism of representations f_1, \dots, f_n into representation f . For any $k, k = 1, \dots, n$, the map

(r_{1k}, r_2) satisfies to the equality

$$(4.3.19) \quad r_2(m_1, \dots, f_k(a_k)(m_k), \dots, m_n) = f(r_{1k}(a_k))(r_2(m_1, \dots, m_n))$$

Let $\omega_1 \in \Omega_1(p)$. For any $k, k = 1, \dots, n$, the map r_{1k} satisfies to the equality

$$(4.3.20) \quad r_{1k}(a_{k \cdot 1} \dots a_{k \cdot p} \omega_1) = r_{1k}(a_{k \cdot 1}) \dots r_{1k}(a_{k \cdot p}) \omega_1$$

Let $\omega_2 \in \Omega_2(p)$. For any $k, k = 1, \dots, n$, the map r_2 satisfies to the equality

$$(4.3.21) \quad \begin{aligned} & r_2(m_1, \dots, m_{k \cdot 1} \dots m_{k \cdot p} \omega_2, \dots, m_n) \\ &= r_2(m_1, \dots, m_{k \cdot 1}, \dots, m_n) \dots r_2(m_1, \dots, m_{k \cdot p}, \dots, m_n) \omega_2 \end{aligned}$$

PROOF. The equality (4.3.19) follows from the definition 4.3.5 and the equality (3.2.3). The equality (4.3.20) follows from the statement that, for any $k, k = 1, \dots, n$, provided that all variables except the variable $x_k \in A_k$ have given value, the map r_1 is homomorphism of Ω_1 -algebra A_k into Ω_1 -algebra A . The equality (4.3.21) follows from the statement that, for any $k, k = 1, \dots, n$, provided that all variables except the variable $m_k \in B_k$ have given value, the map r_2 is homomorphism of Ω_2 -algebra B_k into Ω_2 -algebra B . \square

4.4. Reduced Cartesian Product of Representations

DEFINITION 4.4.1. Let A_1 be Ω_1 -algebra. Let \mathcal{A}_2 be category of Ω_2 -algebras. We define **category $A_1(\mathcal{A}_2)$ of representations** of Ω_1 -algebra A_1 in Ω_2 -algebra. Representations of Ω_1 -algebra A_1 in Ω_2 -algebra are objects of this category. Reduced morphisms of corresponding representations are morphisms of this category. \square

THEOREM 4.4.2. In category $A_1(\mathcal{A}_2)$ there exists product of effective representations of Ω_1 -algebra A_1 in Ω_2 -algebra and the product is effective representation of Ω_1 -algebra A_1 .

PROOF. Let

$$A_2 = \prod_{i \in I} A_{2i}$$

be product of family of Ω_2 -algebras $\{A_{2i}, i \in I\}$ and for any $i \in I$ the map

$$t_i : A_2 \longrightarrow A_{2i}$$

be projection onto factor i . For each $i \in I$, let

$$h_i : A_1 \dashrightarrow A_{2i}$$

be effective A_1 -representation in Ω_2 -algebra A_{2i} .

Let $b_1 \in A_1$. Let $b_2 \in A_2$. According to the statement 2.3.3.3, we can represent A_2 -number b_2 as tuple of A_{2i} -numbers

$$(4.4.1) \quad b_2 = (b_{2i}, i \in I) \quad b_{2i} = t_i(b_2) \in A_{2i}$$

LEMMA 4.4.3. For each $i \in I$, consider diagram of maps

$$(4.4.2) \quad \begin{array}{ccc} A_2 & \xrightarrow{t_i} & A_{2i} \\ & \searrow^{g(b_1)} & \nearrow^{h_i(b_1)} \\ A_1 & \xrightarrow{h_i} & A_{2i} \\ & \nearrow^{g} & \searrow^{t_i} \\ & A_2 & \xrightarrow{t_i} & A_{2i} \end{array} \quad (1)$$

Let map

$$g : A_1 \rightarrow \text{End}(\Omega_2; A_2)$$

be defined by the equality

$$(4.4.3) \quad g(b_1)(b_2) = (h_i(b_1)(b_{2i}), i \in I)$$

Then the map g is effective A_1 -representation in Ω_2 -algebra A_2

$$g : A_1 \dashrightarrow A_2$$

The map t_i is reduced morphism of representation g into representation h_i .

PROOF.

4.4.3.1: According to definitions 3.1.1, the map $h_i(b_1)$ is homomorphism of Ω_2 -algebra A_{2i} . According to the theorem 2.3.6, from commutativity of the diagram (1) for each $i \in I$, it follows that the map

$$g(b_1) : A_2 \rightarrow A_2$$

defined by the equality (4.4.3) is homomorphism of Ω_2 -algebra A_2 .

4.4.3.2: According to the definition 3.1.1, the set $\text{End}(\Omega_2; A_{2i})$ is Ω_1 -algebra. According to the lemma 4.3.1, the set ${}^\circ A_2 \subseteq \text{End}(\Omega_2; A_2)$ is Ω_1 -algebra.

4.4.3.3: According to the definition 3.1.1, the map

$$h_i : A_1 \rightarrow \text{End}(\Omega_2, A_{2i})$$

is homomorphism of Ω_1 -algebra. According to the theorem 2.3.6, the map

$$g : A_1 \rightarrow \text{End}(\Omega_2; A_2)$$

defined by the equality

$$g(b_1) = (h_i(b_1), i \in I)$$

is homomorphism of Ω_1 -algebra.

According to statements 4.4.3.1, 4.4.3.3 and to the definition 3.1.1, the map g is A_1 -representation in Ω_2 -algebra A_2 .

For any $i \in I$, according to the definition 3.1.2, A_1 -number a_1 generates unique transformation

$$(4.4.4) \quad b_{22i} = h_i(b_1)(b_{21i})$$

Let $b_{21}, b_{22} \in A_2$. According to the statement 2.3.3.3, we can represent A_2 -numbers b_{21}, b_{22} as tuples of A_{2i} -numbers

$$(4.4.5) \quad \begin{aligned} b_{21} &= (b_{21i}, i \in I) & b_{21i} &= t_i(b_{21}) \in A_{2i} \\ b_{22} &= (b_{22i}, i \in I) & b_{22i} &= t_i(b_{22}) \in A_{2i} \end{aligned}$$

According to the definition (4.4.3) of the representation g , from equalities (4.4.4), (4.4.5), it follows that A_1 -number a_1 generates unique transformation

$$(4.4.6) \quad b_{22} = (h_i(b_1)(b_{21i}), i \in I) = g(b_1)(b_{21})$$

According to the definition 3.1.2, the representation g is effective.

From commutativity of diagram (1) and from the definition 3.2.2, it follows that map t_i is reduced morphism of representation g into representation h_i . \odot

Let

$$(4.4.7) \quad d_2 = g(b_1)(b_2) \quad d_2 = (d_{2i}, i \in I)$$

From equalities (4.4.3), (4.4.7), it follows that

$$(4.4.8) \quad d_{2i} = h_i(b_1)(b_{2i})$$

Let R_2 be other object of category \mathcal{A}_2 . Let

$$f : A_1 \dashrightarrow R_2$$

be effective A_1 -representation in Ω_2 -algebra R_2 . For any $i \in I$, let there exist morphism

$$r_i : R_2 \longrightarrow A_{2i}$$

of representations from f into h_i . According to the remark 3.2.7, in diagram of maps

$$(4.4.9)$$




diagram (2) is commutative. According to the definition 2.3.1, there exists a unique morphism of Ω_2 -algebra

$$s : R_2 \longrightarrow A_2$$

such that following diagram is commutative

$$(4.4.10) \quad \begin{array}{ccc} A_2 & \xrightarrow{t_i} & A_{2i} \\ \uparrow s & & \uparrow r_i \\ R_2 & & \end{array} \quad t_i(s) = r_i$$

Let $a_2 \in R_2$. Let

$$(4.4.11) \quad b_2 = s(a_2) \in A_2$$

From commutativity of the diagram (4.4.10) and statements (4.4.11), (4.4.1), it follows that

$$(4.4.12) \quad b_{2i} = r_i(a_2)$$

Let

$$(4.4.13) \quad c_2 = f(a_1)(a_2)$$

From commutativity of the diagram (2) and equalities (4.4.8), (4.4.12), (4.4.13), it follows that


$$(4.4.14) \quad d_{2i} = r_i(c_2)$$

From equalities (4.4.8), (4.4.14), it follows that

$$(4.4.15) \quad d_2 = s(c_2)$$

and this is consistent with commutativity of the diagram (4.4.10).

For each $i \in I$, we join diagrams of maps (4.4.2), (4.4.10), (4.4.9)



From equalities (4.4.7), (4.4.11) and from equalities (4.4.13), (4.4.15), commutativity of the diagram (3) follows. Therefore, the map s is reduced morphism of representations from f into g . According to the definition 3.4.2, the map s is homomorphism of Ω_2 algebra. According to the theorem 2.3.3 and to the definition 2.3.1, the reduced morphism s is defined unambiguously.

According to the definition 2.3.1, the representation g and family of morphisms of representation $(t_i, i \in I)$ is product in the category $A_1(\mathcal{A}_2)$. \square

DEFINITION 4.4.4. Let A, B_1, \dots, B_n, B be universal algebras. Let, for any $k, k = 1, \dots, n$,

$$f_k : A \dashrightarrow B_k$$

be effective representation of Ω_1 -algebra A in Ω_2 -algebra B_k . Let

$$f : A \dashrightarrow B$$

be effective representation of Ω_1 -algebra A in Ω_2 -algebra B . The map

$$r_2 : B_1 \times \dots \times B_n \rightarrow B$$

is called **reduced polymorphism of representations** f_1, \dots, f_n into representation f , if, for any $k, k = 1, \dots, n$, provided that all variables except the variable $x_k \in B_k$ have given value, the map r_2 is a reduced morphism of representation f_k into representation f .

If $f_1 = \dots = f_n$, then we say that the map r_2 is reduced polymorphism of representation f_1 into representation f .

If $f_1 = \dots = f_n = f$, then we say that the map r_2 is reduced polymorphism of representation f . \square

THEOREM 4.4.5. *Let the map r_2 be reduced polymorphism of effective representations f_1, \dots, f_n into effective representation f .*

- For any $k, k = 1, \dots, n$, the map r_2 satisfies to the equality

$$(4.4.16) \quad r_2(m_1, \dots, f_k(a)(m_k), \dots, m_n) = f(a)(r_2(m_1, \dots, m_n))$$

- For any $k, l, k = 1, \dots, n, l = 1, \dots, n$, the map r_2 satisfies to the equality

$$(4.4.17) \quad \begin{aligned} & r_2(m_1, \dots, f_k(a)(m_k), \dots, m_l, \dots, m_n) \\ &= r_2(m_1, \dots, m_k, \dots, f_l(a)(m_l), \dots, m_n) \end{aligned}$$

- Let $\omega_2 \in \Omega_2(p)$. For any $k, k = 1, \dots, n$, the map r_2 satisfies to the equality

$$(4.4.18) \quad \begin{aligned} & r_2(m_1, \dots, m_{k-1} \dots m_{k-p} \omega_2, \dots, m_n) \\ &= r_2(m_1, \dots, m_{k-1}, \dots, m_n) \dots r_2(m_1, \dots, m_{k-p}, \dots, m_n) \omega_2 \end{aligned}$$

PROOF. The equality (4.4.16) follows from the definition 4.4.4 and the equality (3.4.4). The equality (4.4.17) follows from the equality (4.4.16). The equality (4.4.18) follows from the statement that, for any $k, k = 1, \dots, n$, provided that all variables except the variable $m_k \in B_k$ have given value, the map r_2 is homomorphism of Ω_2 -algebra B_k into Ω_2 -algebra B . \square

We also say that the map r_2 is reduced polymorphism of representations in Ω_2 -algebras B_1, \dots, B_n into representation in Ω_2 -algebra B .

4.5. Multiplicative Ω -Group

Let the map

$$f : A \xrightarrow{*} B$$

be the representation of Ω_1 -algebra A in Ω_2 algebra B . According to the theorem 3.5.3, the set $\text{End}(A(\Omega_2); B)$ is semigroup. At the same time^{4.1}

$$(4.5.1) \quad \text{End}(A(\Omega_2); B) \subseteq \text{End}(\Omega_2; B)$$

According to the definition 3.1.1, the set $\text{End}(\Omega_2, B)$ is Ω_2 -algebra. However, the statement (4.5.1) does not imply that the set $\text{End}(A(\Omega_2); B)$ is Ω_2 -algebra.

To understand what is condition when the set $\text{End}(A(\Omega_2); B)$ is Ω_2 -algebra, we consider connection between the set of representations of Ω_1 -algebra A in Ω_2 -algebra B and the set of reduced morphisms of these representations.

^{4.1} In the statement (4.5.1), I designated Ω_2 category of Ω_2 -algebras and $A(\Omega_2)$ category of representations of Ω_1 -algebra A in Ω_2 -algebra.

THEOREM 4.5.1. *Let the map*

$$r : B \rightarrow B$$

be reduced endomorphism of the representation

$$f : A \xrightarrow{*} B$$

of Ω_1 -algebra A in Ω_2 algebra B . The map

$$(4.5.2) \quad rf : a \in A \rightarrow r \circ f(a) \in \text{End}(\Omega_2; B)$$

is representation of Ω_1 -algebra A in Ω_2 algebra B iff, on the set $f(A) \subseteq \text{End}(\Omega_2, B)$, the product \circ of maps is distributive on the left over any operation $\omega \in \Omega_1$

$$(4.5.3) \quad r \circ (f(a_1) \dots f(a_p)\omega) = (r \circ f(a_1)) \dots (r \circ f(a_p))\omega$$

PROOF. According to the definition 3.1.1, the map $f(a)$ is endomorphism of Ω_2 -algebra B . According to definitions 3.2.2, 3.4.2, the map r is endomorphism of Ω_2 -algebra B . Therefore, the map $r \circ f(a)$ is endomorphism of Ω_2 -algebra B .

4.5.1.1: According to the definition 3.1.1, map rf is representation of Ω_1 -algebra A in Ω_2 algebra B iff the map rf is homomorphism of Ω_1 -algebra.

4.5.1.2: The statement 4.5.1.1 means that, for any operation $\omega \in \Omega_1$, the following equality is true

$$(4.5.4) \quad \begin{aligned} r \circ f(a_1 \dots a_p \omega) &= (rf)(a_1 \dots a_p \omega) = ((rf)(a_1)) \dots ((rf)(a_p))\omega \\ &= (r \circ f(a_1)) \dots (r \circ f(a_p))\omega \end{aligned}$$

Since the map f is representation of Ω_1 -algebra A in Ω_2 algebra B , then, according to the definition 3.1.1, the map f is homomorphism of Ω_1 -algebra

$$(4.5.5) \quad r \circ f(a_1 \dots a_p \omega) = r \circ (f(a_1) \dots f(a_p)\omega)$$

The equality (4.5.3) follows from equalities (4.5.4), (4.5.5).

The theorem follows from the statement 4.5.1.2. \square

THEOREM 4.5.2. *Let the map*

$$f : A \xrightarrow{*} B$$

be the representation of Ω_1 -algebra A in Ω_2 algebra B . Let

$$(4.5.6) \quad f(A) = \text{End}(A(\Omega_2); B)$$

4.5.2.1: *The product in semigroup $\text{End}(A(\Omega_2); B)$ is commutative.*

4.5.2.2: *The product \circ in semigroup $\text{End}(A(\Omega_2); B)$ generates the product $*$ in Ω_1 -algebra A such that*

$$(4.5.7) \quad f(a * b) = f(a) \circ f(b)$$

4.5.2.3: *The semigroup $\text{End}(A(\Omega_2); B)$ is Ω_1 -algebra.*

PROOF. Let a map h be endomorphism of the representation f . According to the statement (4.5.6), there exists $b \in A$ such that $h = f(b)$. Therefore, the equality

$$(4.5.8) \quad f(a) \circ f(b) = f(b) \circ f(a)$$

follows from the equality (3.4.4). According to the statement (4.5.6), maps $f(a)$, $f(b)$ are endomorphisms of the representation f . Therefore, the product \circ in semigroup $\text{End}(A(\Omega_2); B)$ is commutative.

According to the theorem 3.5.3, the product of endomorphisms $f(a)$, $f(b)$ of the representation f is endomorphism h of the representation f . According to the statement (4.5.6), there exists $c \in A$ such that $h = f(c)$. Binary operation $*$ on the set A is defined by the equality

$$c = a * b$$

Therefore, the statement 4.5.2.2 is true.

Let maps h_1, \dots, h_p be endomorphism of the representation f . According to the statement (4.5.6), there exist A -numbers a_1, \dots, a_p such that

$$h_1 = f(a_1) \quad \dots \quad h_n = f(a_n)$$

Since the map f is representation of Ω_1 -algebra A in Ω_2 algebra B , then, according to the definition 3.1.1, the map f is homomorphism of Ω_1 -algebra A

$$(4.5.9) \quad h_1 \dots h_p \omega = f(a_1) \dots f(a_p) \omega = f(a_1 \dots a_p \omega)$$

According to the statement (4.5.6), $h_1 \dots h_p \omega \in \text{End}(A(\Omega_2); B)$. Therefore, the statement 4.5.2.3 is true. \square

According to the theorem 4.5.2, if the statement (4.5.6) is satisfied, then the set $\text{End}(A(\Omega_2); B)$ is equipped by two algebraic structures. Namely, the set $\text{End}(A(\Omega_2); B)$ is semigroup and at the same time this set is Ω_1 -algebra. Similar statement is true for Ω_1 -algebra A . However, we cannot say that product in Ω_1 -algebra A distributive over any operation $\omega \in \Omega_1$ (see the theorem 4.5.1).

THEOREM 4.5.3. *Let the map*

$$f : A \xrightarrow{*} B$$

be the representation of Ω_1 -algebra A in Ω_2 algebra B . and

$$f(A) = \text{End}(A(\Omega_2); B)$$

The product $$ defined in Ω_1 -algebra A is distributive over any operation $\omega \in \Omega_1$ iff the map*

$$(4.5.10) \quad f(b * a) : a \in A \rightarrow f(b * a) \in \text{End}(\Omega_2; B)$$

is representation of Ω_1 -algebra A in Ω_2 algebra B

PROOF. According to the statement 4.5.2.2, it does not matter for us whether we are considering Ω_1 -algebra A or we are considering Ω_1 -algebra $\text{End}(A(\Omega_2); B)$. The theorem follows from the definition (4.5.7) of product $*$ in Ω_1 -algebra A , as well it follows from the theorem 4.5.1 and statements 4.5.2.1, 4.5.2.3. \square

In the theorem 4.5.3, we see universal algebra similar to Ω -group, however this algebra is little different. Since this universal algebra plays an important role in representation theory, I introduce definitions 4.5.4, 4.5.5.

DEFINITION 4.5.4. *Let product*

$$c_1 = a_1 * b_1$$

be operation of Ω_1 -algebra A . Let $\Omega = \Omega_1 \setminus \{\}$. If Ω_1 -algebra A is group with respect to product and, for any operation $\omega \in \Omega(n)$, the product is distributive over the operation ω*

$$a * (b_1 \dots b_n \omega) = (a * b_1) \dots (a * b_n) \omega$$

$$(b_1 \dots b_n \omega) * a = (b_1 * a) \dots (b_n * a) \omega$$

then Ω_1 -algebra A is called **multiplicative Ω -group**. \square

DEFINITION 4.5.5. *If*

$$(4.5.11) \quad a * b = b * a$$

then multiplicative Ω -group is called **Abelian**. \square

DEFINITION 4.5.6. *If*

$$(4.5.12) \quad a * (b * c) = (a * b) * c$$

then multiplicative Ω -group is called **associative**. \square

THEOREM 4.5.7. *Let A, B_1, \dots, B_n, B be universal algebras. Let, for any $k, k = 1, \dots, n,$*

$$f_k : A \xrightarrow{*} B_k$$

be representation of Ω_1 -algebra A in Ω_2 -algebra B_k . Let

$$f : A \xrightarrow{*} B$$

be representation of Ω_1 -algebra A in Ω_2 -algebra B . Let the map

$$r_2 : B_1 \times \dots \times B_n \rightarrow B$$

be reduced polymorphism of representations f_1, \dots, f_n into representation f . The product \circ defined in Ω_1 -algebra $f(A)$ is commutative.

The representation

$$f : A \xrightarrow{*} B$$

permits reduced polymorphism of representations iff following statements are satisfied

4.5.7.1: *The product \circ defined in Ω_1 -algebra $\text{End}(A(\Omega_2); B)$ is distributive over any operation $\omega \in \Omega_1$*

4.5.7.2: *$f(a * b) = f(a) \circ f(b)$*

PROOF. Using the equality (4.4.16), we can write an expression

$$(4.5.13) \quad r_2(m_1, \dots, f_k(a_k)(m_k), \dots, f_l(a_l)(m_l), \dots, m_n)$$

either in the following form

$$(4.5.14) \quad \begin{aligned} & r_2(m_1, \dots, f_k(a_k)(m_k), \dots, f_l(a_l)(m_l), \dots, m_n) \\ &= f(a_k)(r_2(m_1, \dots, m_k, \dots, f_l(a_l)(m_l), \dots, m_n)) \\ &= f(a_k)(f(a_l)(r_2(m_1, \dots, m_k, \dots, m_l, \dots, m_n))) \\ &= (f(a_k) \circ f(a_l))(r_2(m_1, \dots, m_k, \dots, m_l, \dots, m_n)) \end{aligned}$$

or in the following form

$$(4.5.15) \quad \begin{aligned} & r_2(m_1, \dots, f_k(a_k)(m_k), \dots, f_l(a_l)(m_l), \dots, m_n) \\ &= f(a_l)(r_2(m_1, \dots, f_k(a_k)(m_k), \dots, m_l, \dots, m_n)) \\ &= f(a_l)(f(a_k)(r_2(m_1, \dots, m_k, \dots, m_l, \dots, m_n))) \\ &= (f(a_l) \circ f(a_k))(r_2(m_1, \dots, m_k, \dots, m_l, \dots, m_n)) \end{aligned}$$

Commutativity of the product \circ follows from the equalities (4.5.14), (4.5.15). \square

THEOREM 4.5.8. *Let*

$$f : A \longrightarrow B$$

be representation of Ω_1 -algebra A in Ω_2 -algebra B and

$$(4.5.16) \quad f(A) = \text{End}(A(\Omega_2); B)$$

Then the representation f permits reduced polymorphism of representations.

Let $\Omega = \Omega_1 \setminus \{\}$. The representation*

$$h : A_1 \rightarrow \text{End}(\Omega; A_1) \quad h(a) : b \in A_1 \rightarrow a * b \in A_1$$

*of semigroup A_1 in Ω -algebra A_1 exists iff, for any operation $\omega \in \Omega(n)$, the product is **distributive** over the operation ω*

$$(4.5.17) \quad a * (b_1 \dots b_n \omega) = (a * b_1) \dots (a * b_n) \omega$$

$$(4.5.18) \quad (b_1 \dots b_n \omega) * a = (b_1 * a) \dots (b_n * a) \omega$$

PROOF. According to the definition 3.1.1, equalities (4.5.17), (4.5.18) are true iff the map h is representation of semigroup A_1 in Ω -algebra A_1 . The same time equalities (4.5.17), (4.5.18) express distributive law of the product over the operation ω . \square

In Ω_1 -algebra A_1 , we defined the product coordinated with single transitive representation in Ω_2 -algebra A_2 . We can do such construction in case of any representation with request that a product in Ω_1 -algebra A_1 is defined uniquely. However, in general case, a product may be non commutative.

THEOREM 4.5.9. *Let*

$$A \longrightarrow B_1 \quad A \longrightarrow B_2 \quad A \longrightarrow B$$

be effective representations of Abelian multiplicative Ω_1 -group A in Ω_2 -algebras B_1, B_2, B . Let Ω_2 -algebra have 2 operations, namely $\omega_1 \in \Omega(m), \omega_2 \in \Omega(n)$. The equality

$$(4.5.19) \quad (a_{11} \dots a_{1n} \omega_2) \dots (a_{m1} \dots a_{mn} \omega_2) \omega_1 = (a_{11} \dots a_{m1} \omega_1) \dots (a_{1n} \dots a_{mn} \omega_1) \omega_2$$

is necessary condition of existence of reduced polymorphism

$$R : B_1 \times B_2 \rightarrow B$$

PROOF. Let $a_1, \dots, a_p \in B_1, b_1, \dots, b_q \in B_2$. According to the equality (4.4.18), the expression

$$(4.5.20) \quad r_2(a_1 \dots a_p \omega_1, b_1 \dots b_q \omega_2)$$

can have 2 values

$$(4.5.21) \quad \begin{aligned} & r_2(a_1 \dots a_m \omega_1, b_1 \dots b_n \omega_2) \\ &= r_2(a_1, b_1 \dots b_n \omega_2) \dots r_2(a_m, b_1 \dots b_n \omega_2) \omega_1 \\ &= (r_2(a_1, b_1) \dots r_2(a_1, b_n) \omega_2) \dots (r_2(a_m, b_1) \dots r_2(a_m, b_n) \omega_2) \omega_1 \end{aligned}$$

$$(4.5.22) \quad \begin{aligned} & r_2(a_1 \dots a_m \omega_1, b_1 \dots b_n \omega_2) \\ &= r_2(a_1 \dots a_m \omega_1, b_1) \dots r_2(a_1 \dots a_m \omega_1, b_n) \omega_2 \\ &= (r_2(a_1, b_1) \dots r_2(a_m, b_1) \omega_1) \dots (r_2(a_1, b_n) \dots r_2(a_m, b_n) \omega_1) \omega_2 \end{aligned}$$

From equalities (4.5.21), (4.5.22), it follows that

$$(4.5.23) \quad \begin{aligned} & (r_2(a_1, b_1) \dots r_2(a_1, b_n) \omega_2) \dots (r_2(a_m, b_1) \dots r_2(a_m, b_n) \omega_2) \omega_1 \\ & = (r_2(a_1, b_1) \dots r_2(a_m, b_1) \omega_1) \dots (r_2(a_1, b_n) \dots r_2(a_m, b_n) \omega_1) \omega_2 \end{aligned}$$

Therefore, the expression (4.5.20) is properly defined iff the equality (4.5.23) is true. Let

$$(4.5.24) \quad a_{i,j} = r_2(a_i, b_j) \in A$$

The equality (4.5.19) follows from equalities (4.5.23), (4.5.24). \square

THEOREM 4.5.10. *There exists reduced polymorphism of effective representations of Abelian multiplicative Ω -group in Abelian group.*

PROOF. Since sum in Abelian group is commutative and associative, then the theorem follows from the theorem 4.5.9. \square

THEOREM 4.5.11. *There is no reduced polymorphism of effective representations of Abelian multiplicative Ω -group in ring.*

PROOF. There are two operations in the ring: sum which is commutative and associative and product which is distributive over sum. According to the theorem 4.5.9, the existence of polymorphism of effective representation in the ring implies that sum and product must satisfy the equality

$$(4.5.25) \quad a_{11}a_{21} + a_{12}a_{22} = (a_{11} + a_{12})(a_{21} + a_{22})$$

However right hand side of the equality (4.5.25) has form

$$\begin{aligned} (a_{11} + a_{12})(a_{21} + a_{22}) & = (a_{11} + a_{12})a_{21} + (a_{11} + a_{12})a_{22} \\ & = a_{11}a_{21} + a_{12}a_{21} + a_{11}a_{22} + a_{12}a_{22} \end{aligned}$$

Therefore, the equality (4.5.25) is not true. \square

QUESTION 4.5.12. *It is possible that polymorphism of representations exists only for effective representation in Abelian group. However, this statement has not been proved.* \square

4.6. Ω -ring

DEFINITION 4.6.1. *Let sum*

$$c_1 = a_1 + b_1$$

which is not necessarily commutative and product

$$c_1 = a_1 * b_1$$

*be operations of Ω_1 -algebra A . Let $\Omega = \Omega_1 \setminus \{+, *\}$. If Ω_1 -algebra A is $\Omega \cup \{*\}$ -group and multiplicative $\Omega \cup \{+\}$ -group, then Ω_1 -algebra A is called **Ω -ring**.* \square

THEOREM 4.6.2. *The product in Ω -ring is distributive over addition*

$$\begin{aligned} a * (b_1 + b_2) & = a * b_1 + a * b_2 \\ (b_1 + b_2) * a & = b_1 * a + b_2 * a \end{aligned}$$

PROOF. The theorem follows from the definitions 4.2.10, 4.5.4, 4.6.1. \square

DEFINITION 4.6.3. Let A be Ω -ring. The **matrix** over Ω -ring A is a table of A -numbers a_j^i where the index i is the number of row and the index j is the number of column. \square

CONVENTION 4.6.4. We will use Einstein summation convention. When an index is present in an expression twice (one above and one below) and a set of index is known, we have the sum with respect to repeated index. In this case we assume that we know the set of summation index and do not use summation symbol

$$a^i v_i = \sum_{i \in I} a^i v_i$$

If needed to clearly show set of index, I will do it. \square

The product of matrices is associated with the product of homomorphisms of vector spaces over field. According to the custom the product of matrices a and b is defined as product of rows of the matrix a and columns of the matrix b .

EXAMPLE 4.6.5. Let \bar{e} be basis of right vector space V over D -algebra A (see the definition 9.6.2 and the theorem 9.6.15). We represent the basis \bar{e} as row of matrix

$$e = \left(e_1 \quad \dots \quad e_n \right)$$

We represent coordinates of vector v as vector column

$$v = \begin{pmatrix} v^1 \\ \dots \\ v^n \end{pmatrix}$$

Therefore, we can represent the vector v as product of matrices

$$v = \left(e_1 \quad \dots \quad e_n \right) \begin{pmatrix} v^1 \\ \dots \\ v^n \end{pmatrix} = e_i v^i$$

We represent homomorphism of right vector space V using matrix

$$(4.6.1) \quad v'^i = f_j^i v^j$$

The equality (4.6.1) expresses a traditional product of matrices f and v . \square

EXAMPLE 4.6.6. Let \bar{e} be basis of left vector space V over D -algebra A (see the definition 9.5.2 and the theorem 9.5.15). We represent the basis \bar{e} as row of matrix

$$e = \left(e_1 \quad \dots \quad e_n \right)$$

We represent coordinates of vector v as vector column

$$v = \begin{pmatrix} v^1 \\ \dots \\ v^n \end{pmatrix}$$

However, we cannot represent the vector

$$v = v^i e_i$$

as product of matrices

$$v = \begin{pmatrix} v^1 \\ \dots \\ v^n \end{pmatrix} \quad e = \begin{pmatrix} e_1 & \dots & e_n \end{pmatrix}$$

because this product is not defined. We represent homomorphism of left vector space V using matrix

$$(4.6.2) \quad v^i = v^j f_j^i$$

We cannot express the equality (4.6.2) as traditional product of matrices v and f . \square

From examples 4.6.5, 4.6.6, it follows that we cannot confine ourselves to traditional product of matrices and we need to define two products of matrices. To distinguish between these products we introduced a new notation. In order to keep this notation consistent with the existing one we assume that we have in mind $*^*$ -product when no clear notation is present.

DEFINITION 4.6.7. Let the number of columns of the matrix a equal the number of rows of the matrix b . $*^*$ -**product** of matrices a and b has form

$$(4.6.3) \quad \begin{cases} a_*^* b = (a_k^i b_j^k) \\ (a_*^* b)_j^i = a_k^i b_j^k \end{cases}$$

and can be expressed as product of a row of matrix a over a column of matrix b .^{4.2} \square

DEFINITION 4.6.8. Let the number of rows of the matrix a equal the number of columns of the matrix b . $*^*$ -**product** of matrices a and b has form

$$(4.6.4) \quad \begin{cases} a^*_* b = (a_i^k b_k^j) \\ (a^*_* b)_j^i = a_i^k b_k^j \end{cases}$$

and can be expressed as product of a column of matrix a over a row of matrix b .^{4.3} \square

We also consider following operations on the set of matrices.

DEFINITION 4.6.9. The transpose a^T of the matrix a exchanges rows and columns

$$(4.6.5) \quad (a^T)_j^i = a_i^j$$

\square

^{4.2} We will use symbol $*^*$ - in following terminology and notation. We will read symbol $*^*$ as rc -product or product of row over column. To draw symbol of product of row over column, we put two symbols of product in the place of index which participate in sum. For instance, if product of A -numbers has form $a \circ b$, then $*^*$ -product of matrices a and b has form $a_*^* b$.

^{4.3} We will use symbol $*^*$ - in following terminology and notation. We will read symbol $*^*$ as cr -product or product of column over row. To draw symbol of product of column over row, we put two symbols of product in the place of index which participate in sum. For instance, if product of A -numbers has form $a \circ b$, then $*^*$ -product of matrices a and b has form $a^*_* b$.

DEFINITION 4.6.10. *The sum of matrices a and b is defined by the equality*

$$(a + b)_j^i = a_j^i + b_j^i$$

□

REMARK 4.6.11. *We will use symbol $*^*$ - or $*_*$ - in name of properties of each product and in the notation. We can read symbols $*^*$ and $*_*$ as rc-product and cr-product. This rule we extend to following terminology.*

□

THEOREM 4.6.12.

$$(4.6.6) \quad (a_*^* b)^T = a^{T*} {}_* b^T$$

PROOF. The chain of equalities

$$(4.6.7) \quad ((a_*^* b)^T)_i^j = (a_*^* b)_j^i = a_k^i b_j^k = (a^T)_i^k (b^T)_k^j = ((a^T)^* (b^T))_i^j$$

follows from (4.6.5), (4.6.3) and (4.6.4). The equality (4.6.6) follows from (4.6.7).

□

DEFINITION 4.6.13. *The set \mathcal{A} is a **biring** if we defined on \mathcal{A} an unary operation, say transpose, and three binary operations, say $*^*$ -product, $*_*$ -product and sum, such that*

- $*^*$ -product and sum define structure of ring on \mathcal{A}
- $*_*$ -product and sum define structure of ring on \mathcal{A}
- both products have common identity δ
- products satisfy equation

$$(a_*^* b)^T = a^{T*} {}_* b^T$$

- transpose of identity is identity

$$(4.6.8) \quad \delta^T = \delta$$

- double transpose is original element

$$(4.6.9) \quad (a^T)^T = a$$

□

THEOREM 4.6.14 (**duality principle for biring**). *Let \mathcal{A} be true statement about biring A . If we exchange the same time*

- $a \in A$ and a^T
- $*^*$ -product and $*_*$ -product

then we soon get true statement.

THEOREM 4.6.15 (**duality principle for biring of matrices**). *Let \mathcal{A} be true statement about matrices. If we exchange the same time*

- rows and columns of all matrices
- $*^*$ -product and $*_*$ -product

then we soon get true statement.

PROOF. This is the immediate consequence of the theorem 4.6.14.

□

REMARK 4.6.16. *If product in Ω - A ring is commutative, then*

$$(4.6.10) \quad a *_* b = (a_i^k b_k^j) = (b_k^j a_i^k) = b *_* a$$

Reducible biring is the biring which holds **condition of reducibility of products** (4.6.10). So, in reducible biring, it is enough to consider only $*_*$ -product. However in case when the order of factors is essential we will use $*_*$ -product also. \square

4.7. Tensor Product of Representations

DEFINITION 4.7.1. *Let A be Abelian multiplicative Ω_1 -group. Let A_1, \dots, A_n be Ω_2 -algebras.^{4.4} Let, for any $k, k = 1, \dots, n,$*

$$f_k : A \dashrightarrow A_k$$

be effective representation of multiplicative Ω_1 -group A in Ω_2 -algebra A_k . Consider category \mathcal{A} whose objects are reduced polymorphisms of representations f_1, \dots, f_n

$$r_1 : B_1 \times \dots \times B_n \longrightarrow S_1 \quad r_2 : B_1 \times \dots \times B_n \longrightarrow S_2$$

where S_1, S_2 are Ω_2 -algebras and

$$g_1 : A \dashrightarrow S_1 \quad g_2 : A \dashrightarrow S_2$$

are effective representations of multiplicative Ω_1 -group A . We define morphism $r_1 \rightarrow r_2$ to be reduced morphism of representations $h : S_1 \rightarrow S_2$ making following diagram commutative

$$\begin{array}{ccc} & & S_1 \\ & \nearrow r_1 & \downarrow h \\ B_1 \times \dots \times B_n & & \\ & \searrow r_2 & \\ & & S_2 \end{array}$$

*Universal object $B_1 \otimes \dots \otimes B_n$ of category \mathcal{A} is called **tensor product** of representations A_1, \dots, A_n . \square*

THEOREM 4.7.2. *Since there exists tensor product of effective representations, then tensor product is unique up to isomorphism of representations.*

PROOF. Let A be Abelian multiplicative Ω_1 -group. Let A_1, \dots, A_n be Ω_2 -algebras. Let, for any $k, k = 1, \dots, n,$

$$f_k : A \dashrightarrow B_k$$

be effective representation of multiplicative Ω_1 -group A in Ω_2 -algebra B_k . Let effective representations

$$g_1 : A \dashrightarrow S_1 \quad g_2 : A \dashrightarrow S_2$$

^{4.4} I give definition of tensor product of representations of universal algebra following to definition in [2], p. 601 - 603.

be tensor product of representations B_1, \dots, B_n . From commutativity of the diagram

$$(4.7.1) \quad \begin{array}{ccc} & & S_1 \\ & \nearrow^{R_1} & \uparrow \\ B_1 \times \dots \times B_n & & \\ & \searrow_{R_2} & \downarrow \\ & & S_2 \end{array} \quad \begin{array}{c} \curvearrowright \\ h_2 \\ \curvearrowleft \\ h_1 \end{array}$$

it follows that

$$(4.7.2) \quad \begin{aligned} R_1 &= h_2 \circ h_1 \circ R_1 \\ R_2 &= h_1 \circ h_2 \circ R_2 \end{aligned}$$

From equalities (4.7.2), it follows that morphisms of representation $h_1 \circ h_2, h_2 \circ h_1$ are identities. Therefore, morphisms of representation h_1, h_2 are isomorphisms. \square

CONVENTION 4.7.3. *Algebras S_1, S_2 may be different sets. However they are indistinguishable for us when we consider them as isomorphic representations. In such case, we write the statement $S_1 = S_2$.* \square

DEFINITION 4.7.4. *Tensor product*

$$B^{\otimes n} = B_1 \otimes \dots \otimes B_n \quad B_1 = \dots = B_n = B$$

is called **tensor power** of representation B . \square

THEOREM 4.7.5. *Since there exists polymorphism of representations, then there exists tensor product of representations.*

PROOF. Let

$$f : A \multimap M$$

be representation of Ω_1 -algebra A generated by Cartesian product $B_1 \times \dots \times B_n$ of sets B_1, \dots, B_n .^{4.5} Injection

$$i : B_1 \times \dots \times B_n \longrightarrow M$$

is defined according to rule^{4.6}

$$(4.7.3) \quad i \circ (b_1, \dots, b_n) = (b_1, \dots, b_n)$$

Let N be equivalence generated by following equalities^{4.7}

$$(4.7.4) \quad (b_1, \dots, b_{i-1} \dots b_{i,p} \omega, \dots, b_n) = (b_1, \dots, b_{i-1}, \dots, b_n) \dots (b_1, \dots, b_{i,p}, \dots, b_n) \omega$$

$$(4.7.5) \quad (b_1, \dots, f_i(a) \circ b_i, \dots, b_n) = f(a) \circ (b_1, \dots, b_i, \dots, b_n)$$

$$b_k \in B_k \quad k = 1, \dots, n \quad b_{i-1}, \dots, b_{i,p} \in B_i \quad \omega \in \Omega_2(p) \quad a \in A$$

^{4.5}According to theorems 2.3.3, 4.4.2, the set generated by reduced Cartesian product of representations B_1, \dots, B_n coincides with Cartesian product $B_1 \times \dots \times B_n$ of sets B_1, \dots, B_n . At this point of the proof, we do not consider any algebra structure on the set $B_1 \times \dots \times B_n$.

^{4.6}The equality (4.7.3) states that we identify the basis of the representation M with the set $B_1 \times \dots \times B_n$.

^{4.7}I considered generating of elements of representation according to the theorem 6.1.4. The theorem 4.7.11 requires the fulfillment of conditions (4.7.4), (4.7.5).

LEMMA 4.7.6. *Let $\omega \in \Omega_2(p)$. Then*

$$(4.7.6) \quad \begin{aligned} & f(c) \circ (b_1, \dots, b_{i-1} \dots b_{i-p} \omega, \dots, b_n) \\ &= f(c) \circ ((b_1, \dots, b_{i-1}, \dots, b_n) \dots (b_1, \dots, b_{i-p}, \dots, b_n) \omega) \end{aligned}$$

PROOF. From the equality (4.7.5), it follows that

$$(4.7.7) \quad f(c) \circ (b_1, \dots, b_{i-1} \dots b_{i-p} \omega, \dots, b_n) = (b_1, \dots, f_i(c) \circ (b_{i-1} \dots b_{i-p} \omega), \dots, b_n)$$

Since $f_i(c)$ is endomorphism of Ω_2 -algebra B_i , then from the equality (4.7.7), it follows that

$$(4.7.8) \quad f(c) \circ (b_1, \dots, b_{i-1} \dots b_{i-p} \omega, \dots, b_n) = (b_1, \dots, (f_i(c) \circ b_{i-1}) \dots (f_i(c) \circ b_{i-p}) \omega, \dots, b_n)$$

From equalities (4.7.8), (4.7.4), it follows that

$$(4.7.9) \quad \begin{aligned} & f(c) \circ (b_1, \dots, b_{i-1} \dots b_{i-p} \omega, \dots, b_n) \\ &= (b_1, \dots, f_i(c) \circ b_{i-1}, \dots, b_n) \dots (b_1, \dots, f_i(c) \circ b_{i-p}, \dots, b_n) \omega \end{aligned}$$

From equalities (4.7.9), (4.7.5), it follows that

$$(4.7.10) \quad \begin{aligned} & f(c) \circ (b_1, \dots, b_{i-1} \dots b_{i-p} \omega, \dots, b_n) \\ &= (f(c) \circ (b_1, \dots, b_{i-1}, \dots, b_n)) \dots (f(c) \circ (b_1, \dots, b_{i-p}, \dots, b_n)) \omega \end{aligned}$$

Since $f(c)$ is endomorphism of Ω_2 -algebra B , then the equality (4.7.6) follows from the equality (4.7.10). \odot

LEMMA 4.7.7.

$$(4.7.11) \quad f(c) \circ (b_1, \dots, f_i(a) \circ b_i, \dots, b_n) = f(c) \circ (f(a) \circ (b_1, \dots, b_i, \dots, b_n))$$

PROOF. From the equality (4.7.5), it follows that

$$(4.7.12) \quad \begin{aligned} & f(c) \circ (b_1, \dots, f_i(a) \circ b_i, \dots, b_n) = (b_1, \dots, f_i(c) \circ (f_i(a) \circ b_i), \dots, b_n) \\ &= (b_1, \dots, (f_i(c) \circ f_i(a)) \circ b_i, \dots, b_n) \\ &= (f(c) \circ f(a)) \circ (b_1, \dots, b_i, \dots, b_n) \\ &= f(c) \circ (f(a) \circ (b_1, \dots, b_i, \dots, b_n)) \end{aligned}$$

The equality (4.7.11) follows from the equality (4.7.12). \odot

LEMMA 4.7.8. *For any $c \in A$, endomorphism $f(c)$ of Ω_2 -algebra M is coordinated with equivalence N .*

PROOF. The lemma follows from lemmas 4.7.6, 4.7.7 and from the definition 3.3.2. \odot

From the lemma 4.7.8 and the theorem 3.3.3, it follows that Ω_1 -algebra is defined on the set ${}^*M/N$. Consider diagram

$$\begin{array}{ccc}
 M/N & \xrightarrow{F(a)} & M/N \\
 \uparrow j & \nearrow F & \uparrow j \\
 A & & \\
 \searrow f & & \\
 M & \xrightarrow{f(a)} & M
 \end{array} \quad j = \text{nat } N$$

According to lemma 4.7.8, from the condition

$$j \circ b_1 = j \circ b_2$$

it follows that

$$j \circ (f(a) \circ b_1) = j \circ (f(a) \circ b_2)$$

Therefore, transformation $F(a)$ is well defined and

$$(4.7.13) \quad F(a) \circ j = j \circ f(a)$$

If $\omega \in \Omega_1(p)$, then we assume

$$(F(a_1) \dots F(a_p)\omega) \circ (J \circ b) = J \circ ((f(a_1) \dots f(a_p)\omega) \circ b)$$

Therefore, map F is representations of Ω_1 -algebra A . From (4.7.13) it follows that j is reduced morphism of representations f and F .

Consider commutative diagram

$$(4.7.14) \quad \begin{array}{ccc} & & M/N \\ & \nearrow g_1 & \\ B_1 \times \dots \times B_n & \xrightarrow{i} & M \\ & \searrow j & \end{array}$$

From commutativity of the diagram (4.7.14) and from the equality (4.7.3), it follows that

$$(4.7.15) \quad g_1 \circ (b_1, \dots, b_n) = j \circ (b_1, \dots, b_n)$$

From equalities (4.7.3), (4.7.4), (4.7.5), it follows that

$$(4.7.16) \quad \begin{aligned} & g_1 \circ (b_1, \dots, b_{i-1} \dots b_{i-p}\omega, \dots, b_n) \\ &= (g_1 \circ (b_1, \dots, b_{i-1}, \dots, b_n)) \dots (g_1 \circ (b_1, \dots, b_{i-p}, \dots, b_n))\omega \end{aligned}$$

$$(4.7.17) \quad g_1 \circ (b_1, \dots, f_i(a) \circ b_i, \dots, b_n) = f(a) \circ (g_1 \circ (b_1, \dots, b_i, \dots, b_n))$$

From equalities (4.7.16) and (4.7.17) it follows that map g_1 is reduced polymorphism of representations f_1, \dots, f_n .

Since $B_1 \times \dots \times B_n$ is the basis of representation M of Ω_1 algebra A , then, according to the theorem 6.2.10, for any representation

$$A \twoheadrightarrow V$$

and any reduced polymorphism

$$g_2 : B_1 \times \dots \times B_n \longrightarrow V$$

there exists a unique morphism of representations $k : M \rightarrow V$, for which following diagram is commutative

$$(4.7.18) \quad \begin{array}{ccc} B_1 \times \dots \times B_n & \xrightarrow{i} & M \\ & \searrow g_2 & \downarrow k \\ & & V \end{array}$$

Since g_2 is reduced polymorphism, then $\ker k \supseteq N$.

According to the theorem 3.4.8, map j is universal in the category of morphisms of representation f whose kernel contains N . Therefore, we have morphism of representations

$$h : M/N \rightarrow V$$

which makes the following diagram commutative

$$(4.7.19) \quad \begin{array}{ccc} & M/N & \\ & \uparrow j & \downarrow h \\ M & & V \\ & \downarrow k & \end{array}$$

We join diagrams (4.7.14), (4.7.18), (4.7.19), and get commutative diagram

$$\begin{array}{ccccc} & & & M/N & \\ & & g_1 & \nearrow & \downarrow h \\ B_1 \times \dots \times B_n & \xrightarrow{i} & M & \xrightarrow{j} & \\ & \searrow g_2 & \downarrow k & & \\ & & V & & \end{array}$$

Since $\text{Im } g_1$ generates M/N , than map h is uniquely determined. □

According to proof of theorem 4.7.5

$$B_1 \otimes \dots \otimes B_n = M/N$$

If $d_i \in A_i$, we write

$$(4.7.20) \quad j \circ (d_1, \dots, d_n) = d_1 \otimes \dots \otimes d_n$$

From equalities (4.7.15), (4.7.20), it follows that

$$(4.7.21) \quad g_1 \circ (d_1, \dots, d_n) = d_1 \otimes \dots \otimes d_n$$

THEOREM 4.7.9. *The map*

$$(x_1, \dots, x_n) \in B_1 \times \dots \times B_n \rightarrow x_1 \otimes \dots \otimes x_n \in B_1 \otimes \dots \otimes B_n$$

is polymorphism.

PROOF. The theorem follows from definitions 4.4.4, 4.7.1. \square

THEOREM 4.7.10. *Let B_1, \dots, B_n be Ω_2 -algebras. Let*

$$f : B_1 \times \dots \times B_n \rightarrow B_1 \otimes \dots \otimes B_n$$

be reduced polymorphism defined by equality

$$(4.7.22) \quad f \circ (b_1, \dots, b_n) = b_1 \otimes \dots \otimes b_n$$

Let

$$g : B_1 \times \dots \times B_n \rightarrow V$$

be reduced polymorphism into Ω -algebra V . There exists morphism of representations

$$h : B_1 \otimes \dots \otimes B_n \rightarrow V$$

such that the diagram

$$\begin{array}{ccc} & & B_1 \otimes \dots \otimes B_n \\ & \nearrow f & \downarrow h \\ B_1 \times \dots \times B_n & & V \\ & \searrow g & \end{array}$$

is commutative.

PROOF. equality (4.7.22) follows from equalities (4.7.3) and (4.7.20). An existence of the map h follows from the definition 4.7.1 and constructions made in the proof of the theorem 4.7.5. \square

THEOREM 4.7.11. *Let*

$$b_k \in B_k \quad k = 1, \dots, n \quad b_{i_1}, \dots, b_{i_p} \in B_i \quad \omega \in \Omega_2(p) \quad a \in A$$

Tensor product is distributive over operation ω

$$(4.7.23) \quad \begin{aligned} & b_1 \otimes \dots \otimes (b_{i_1} \dots b_{i_p} \omega) \otimes \dots \otimes b_n \\ &= (b_1 \otimes \dots \otimes b_{i_1} \otimes \dots \otimes b_n) \dots (b_1 \otimes \dots \otimes b_{i_p} \otimes \dots \otimes b_n) \omega \end{aligned}$$

The representation of multiplicative Ω_1 -group A in tensor product is defined by equality

$$(4.7.24) \quad b_1 \otimes \dots \otimes (f_i(a) \circ b_i) \otimes \dots \otimes b_n = f(a) \circ (b_1 \otimes \dots \otimes b_i \otimes \dots \otimes b_n)$$

PROOF. The equality (4.7.23) follows from the equality (4.7.16) and from the definition (4.7.21). The equality (4.7.24) follows from the equality (4.7.17) and from the definition (4.7.21). \square

4.8. Associativity of Tensor Product

Let A be multiplicative Ω_1 -group. Let B_1, B_2, B_3 be Ω_2 -algebras. Let, for $k = 1, 2, 3$,

$$f_k : A \xrightarrow{*} B_k$$

be effective representation of multiplicative Ω_1 -group A in Ω_2 -algebra B_k .

LEMMA 4.8.1. *For given value of $x_3 \in B_3$, the map*

$$(4.8.1) \quad h_{12} : (B_1 \otimes B_2) \times B_3 \rightarrow B_1 \otimes B_2 \otimes B_3$$

defined by equality

$$(4.8.2) \quad h_{12}(x_1 \otimes x_2, x_3) = x_1 \otimes x_2 \otimes x_3$$

is reduced morphism of the representation $B_1 \otimes B_2$ into the representation $B_1 \otimes B_2 \otimes B_3$.

PROOF. According to the theorem 4.7.9, for given value of $x_3 \in B_3$, the map

$$(4.8.3) \quad (x_1, x_2, x_3) \in B_1 \times B_2 \times B_3 \rightarrow x_1 \otimes x_2 \otimes x_3 \in B_1 \otimes B_2 \otimes B_3$$

is polymorphism with respect to $x_1 \in B_1, x_2 \in B_2$. Therefore, for given value of $x_3 \in B_3$, the lemma follows from the theorem 4.7.10. \square

LEMMA 4.8.2. *For given value of $x_{12} \in B_1 \otimes B_2$ the map h_{12} is reduced morphism of the representation B_3 into the representation $B_1 \otimes B_2 \otimes B_3$.*

PROOF. According to the theorem 4.7.9 and the equality (4.7.21), for given value of $x_1 \in B_1, x_2 \in B_2$, the map

$$(4.8.4) \quad (x_1 \otimes x_2, x_3) \in B_1 \times B_2 \times B_3 \rightarrow x_1 \otimes x_2 \otimes x_3 \in B_1 \otimes B_2 \otimes B_3$$

is morphism with respect to $x_3 \in B_3$. Therefore, the theorem follows from the equality (4.4.16) and from the theorem 4.5.9. \square

LEMMA 4.8.3. *There exists reduced morphism of representations*

$$h : (B_1 \otimes B_2) \otimes B_3 \rightarrow B_1 \otimes B_2 \otimes B_3$$

PROOF. According to lemmas 4.8.1, 4.8.2 and to the definition 4.4.4, the map h_{12} is reduced polymorphism of representations. The lemma follows from the theorem 4.7.10. \square

LEMMA 4.8.4. *There exists reduced morphism of representations*

$$g : B_1 \otimes B_2 \otimes B_3 \rightarrow (B_1 \otimes B_2) \otimes B_3$$

PROOF. The map

$$(x_1, x_2, x_3) \in B_1 \times B_2 \times B_3 \rightarrow (x_1 \otimes x_2) \otimes x_3 \in (B_1 \otimes B_2) \otimes B_3$$

is polymorphism with respect to $x_1 \in B_1, x_2 \in B_2, x_3 \in B_3$. Therefore, the lemma follows from the theorem 4.7.10. \square

THEOREM 4.8.5.

$$(4.8.5) \quad (A_1 \otimes A_2) \otimes A_3 = A_1 \otimes (A_2 \otimes A_3) = A_1 \otimes A_2 \otimes A_3$$

PROOF. According to lemma 4.8.3, there exists reduced morphism of representations

$$h : (B_1 \otimes B_2) \otimes B_3 \rightarrow B_1 \otimes B_2 \otimes B_3$$

According to lemma 4.8.4, there exists reduced morphism of representations

$$g : B_1 \otimes B_2 \otimes B_3 \rightarrow (B_1 \otimes B_2) \otimes B_3$$

Therefore, reduced morphisms of representations h, g are isomorphisms. Therefore, the following equality is true

$$(4.8.6) \quad (B_1 \otimes B_2) \otimes B_3 = B_1 \otimes B_2 \otimes B_3$$

We prove similarly the equality

$$B_1 \otimes (B_2 \otimes B_3) = B_1 \otimes B_2 \otimes B_3$$

□

REMARK 4.8.6. *It is evident that structures of Ω_2 -algebras $(B_1 \otimes B_2) \otimes B_3$, $B_1 \otimes B_2 \otimes B_3$ are little different. We write down the equality (4.8.6) based on the convention 4.7.3 and this allows us to speak about associativity of tensor product of representations.* □

Representation of Multiplicative Ω -Group

5.1. Representation of Multiplicative Ω -Group

Consistency of product in multiplicative Ω -group G and corresponding transformations of the representation f allows us to consider more details of the representation f . However, the construction considered in the theorem 4.5.7 is not complete in case of non commutative product.

If for given representation

$$g : A_1 \xrightarrow{*} A_2$$

for any A_1 -numbers a_1, b_1 , there is unique A_1 -number c_1 such that

$$f(c_1) = f(a_1) \circ f(b_1)$$

then what format of the product we should choose:

$$(5.1.1) \quad c_1 = a_1 * b_1$$

or

$$(5.1.2) \quad c_1 = b_1 * a_1$$

EXAMPLE 5.1.1. Consider the representation

$$f : G \xrightarrow{*} A_2$$

of non commutative group G in Ω_2 -algebra such that

$$f(g_1 g_2) = f(g_1) \circ f(g_2)$$

From the equality

$$f(g) = f(ge) = f(g) \circ f(e)$$

it follows that the map $f(e)$ is identity map. From the equality

$$f(g) \circ f(g^{-1}) = f(gg^{-1}) = f(e)$$

it follows that

$$f(g^{-1}) = (f(g))^{-1}$$

Consider the map

$$h : g \in G \rightarrow f(g^{-1}) \in \text{End}(\Omega_2, A_2)$$

From the equality

$$h(g_1 g_2) = f((g_1 g_2)^{-1}) = f(g_2^{-1} g_1^{-1}) = f(g_2^{-1}) \circ f(g_1^{-1}) = h(g_2) \circ h(g_1)$$

it follows that the map h is not homomorphism of the group G . However, if we introduce product

$$b * a = ab$$

then the map h becomes the representation of multiplicative \emptyset -group. \square

EXAMPLE 5.1.2. Let V be left module over ring D . It means that we defined representation

$$f : D \dashrightarrow V \quad f(d) : v \rightarrow dv$$

such that

$$\begin{aligned} (d_1 + d_2)v &= d_1v + d_2v \\ d(v_1 + v_2) &= dv_1 + dv_2 \\ d_1(d_2v) &= (d_1d_2)v \end{aligned}$$

The map

$$w : V \rightarrow D$$

is called additive if

$$w(v_1 + v_2) = w(v_1) + w(v_2)$$

We use notation

$$(w, v) = w(v)$$

for image of additive map. We define sum of additive maps by the equality

$$(w_1 + w_2, v) = (w_1, v) + (w_2, v)$$

It is easy to show that the set W of additive maps is Abelian group.

We define the map

$$h : D \dashrightarrow W \quad h(d) : w \rightarrow wd$$

using the equality

$$(wd, v) = (w, dv)$$

From equalities

$$\begin{aligned} ((w_1 + w_2)d, v) &= (w_1 + w_2, dv) = (w_1, dv) + (w_2, dv) \\ &= (w_1d, v) + (w_2d, v) \\ &= (w_1d + w_2d, v) \\ (w(d_1 + d_2), v) &= (w, (d_1 + d_2)v) = (w, d_1v + d_2v) \\ &= (w, d_1v) + (w, d_2v) = (wd_1, v) + (wd_2, v) \\ &= (wd_1 + wd_2, v) \\ (5.1.3) \quad ((wd_1)d_2, v) &= (wd_1, d_2v) = (w, d_1(d_2v)) = (w, (d_1d_2)v) \\ &= (w(d_1d_2), v) \end{aligned}$$

it follows that the map h is representation of group G . However we can write the equality (5.1.3) in the following form

$$((h(d_2) \circ h(d_1))(w), v) = ((h(d_2)h(d_1))(w), v) = (h(d_1d_2)(w), v)$$

which implies that the map h is not homomorphism of group G . \square

From the analysis of examples 5.1.1, 5.1.2, it follows that we have two choices.

- We accept that in multiplicative Ω -group A_1 we can define both types of product ((5.1.1) and (5.1.2)) in order to coordinate product in multiplicative Ω -group A_1 and product of transformations of representation of multiplicative Ω -group A_1 . We accept this point of view in case of commutative product. This point of view corresponds to considerations of covariant and contravariant representations of multiplicative Ω -group A_1 .

- We assume that transformations of representation of multiplicative Ω -group A_1 may act on A_2 -numbers either on the left or on the right. In this case it is sufficient to restrict ourselves to the product (5.1.1) in multiplicative Ω -group A_1 . Thus, the idea of representation of multiplicative Ω -group is that we multiply elements of multiplicative Ω -group in the same order as we multiply transformations of representation.

Second point of view is simpler and, as we see in the example 5.1.2, appears in a natural way. In the example 5.1.2, we also see that we need to change notation before we can use second point of view. Instead of considering $f \in \text{End}(\Omega_2; A_2)$ as map

$$f : a_2 \in A_2 \rightarrow f(a_2) \in A_2$$

we must consider an endomorphism f as operator.

DEFINITION 5.1.3. Let $\text{End}(\Omega_2, A_2)$ be a multiplicative Ω -group with product^{5.1}

$$(f, g) \rightarrow f \bullet g$$

Let an endomorphism f act on A_2 -number a on the left. We will use notation

$$(5.1.4) \quad f(a_2) = f \bullet a_2$$

Let A_1 be multiplicative Ω -group with product

$$(a, b) \rightarrow a * b$$

We call a homomorphism of multiplicative Ω -group

$$(5.1.5) \quad f : A_1 \rightarrow \text{End}(\Omega_2, A_2)$$

left-side representation of multiplicative Ω -group A_1 or **left-side A_1 -representation** in Ω_2 -algebra A_2 if the map f holds

$$(5.1.6) \quad f(a_1 * b_1) \bullet a_2 = (f(a_1) \bullet f(b_1)) \bullet a_2$$

We identify an A_1 -number a_1 and its image $f(a_1)$ and write left-side transformation caused by A_1 -number a_1 as

$$a'_2 = f(a_1) \bullet a_2 = a_1 * a_2$$

In this case, the equality (5.1.6) gets following form

$$(5.1.7) \quad f(a_1 * b_1) \bullet a_2 = (a_1 * b_1) * a_2$$

The map

$$(a_1, a_2) \in A_1 \times A_2 \rightarrow a_1 * a_2 \in A_2$$

generated by left-side representation f is called **left-side product** of A_2 -number a_2 over A_1 -number a_1 . \square

^{5.1} Very often a product in multiplicative Ω -group $\text{End}(\Omega_2, A_2)$ is superposition of endomorphisms

$$f \bullet g = f \circ g$$

However, as we see in the example 5.2.5, a product in multiplicative Ω -group $\text{End}(\Omega_2, A_2)$ may be different from superposition of endomorphisms. According to the definition 4.6.13, we can consider two products in universal algebra A .

Let

$$\begin{aligned} f &: A_2 \rightarrow A_2 \\ g &: A_2 \rightarrow A_2 \end{aligned}$$

be endomorphisms of Ω_2 -algebra A_2 . Let product in multiplicative Ω -group $\text{End}(\Omega_2, A_2)$ is composition of endomorphisms. Since the product of maps f and g is defined in the same order as these maps act on A_2 -number, then we consider the equality

$$(5.1.8) \quad (f \circ g) \circ a = f \circ (g \circ a)$$

as **associative law**. This allows writing of equality (5.1.8) without using of brackets

$$f \circ g \circ a = f \circ (g \circ a) = (f \circ g) \circ a$$

as well it allows writing of equality (5.1.6) in the following form

$$(5.1.9) \quad f(a_1 * b_1) \circ a_2 = f(a_1) \circ f(b_1) \circ a_2$$

From the equality (5.1.7), it follows that

$$(5.1.10) \quad (a_1 * b_1) * a_2 = a_1 * (b_1 * a_2)$$

We consider the equality (5.1.10) as **associative law**.

REMARK 5.1.4. *Let the map*

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

be the left-side representation of multiplicative Ω -group A_1 in Ω_2 -algebra A_2 . Let the map

$$g : B_1 \longrightarrow B_2$$

be the left-side representation of multiplicative Ω -group B_1 in Ω_2 -algebra B_2 . Let the map

$$(r_1 : A_1 \rightarrow B_1, r_2 : A_2 \rightarrow B_2)$$

be morphism of representations. We use notation

$$r_2(a_2) = r_2 \circ a_2$$

for image of A_2 -number a_2 with respect to the map r_2 . Then we can write the equality (3.2.3) in the following form

$$r_2 \circ (a_1 * a_2) = r_1(a_1) * (r_2 \circ a_2)$$

□

DEFINITION 5.1.5. *Let $\text{End}(\Omega_2, A_2)$ be a multiplicative Ω -group with product^{5.2}*

$$(f, g) \rightarrow f \bullet g$$

Let an endomorphism f act on A_2 -number a on the right. We will use notation

$$(5.1.11) \quad f(a_2) = a_2 \bullet f$$

^{5.2} Very often a product in multiplicative Ω -group $\text{End}(\Omega_2, A_2)$ is superposition of endomorphisms

$$f \bullet g = f \circ g$$

However, as we see in the example 5.2.5, a product in multiplicative Ω -group $\text{End}(\Omega_2, A_2)$ may be different from superposition of endomorphisms. According to the definition 4.6.13, we can consider two products in universal algebra A .

Let A_1 be multiplicative Ω -group with product

$$(a, b) \rightarrow a * b$$

We call a homomorphism of multiplicative Ω -group

$$(5.1.12) \quad f : A_1 \rightarrow \text{End}(\Omega_2, A_2)$$

right-side representation of multiplicative Ω -group A_1 or **right-side A_1 -representation** in Ω_2 -algebra A_2 if the map f holds

$$(5.1.13) \quad a_2 \bullet f(a_1 * b_1) = a_2 \bullet (f(a_1) \bullet f(b_1))$$

We identify an A_1 -number a_1 and its image $f(a_1)$ and write right-side transformation caused by A_1 -number a_1 as

$$a'_2 = a_2 \bullet f(a_1) = a_2 * a_1$$

In this case, the equality (5.1.13) gets following form

$$(5.1.14) \quad a_2 \bullet f(a_1 * b_1) = a_2 * (a_1 * b_1)$$

The map

$$(a_1, a_2) \in A_1 \times A_2 \rightarrow a_2 * a_1 \in A_2$$

generated by right-side representation f is called **right-side product** of A_2 -number a_2 over A_1 -number a_1 . \square

Let

$$f : A_2 \rightarrow A_2$$

$$g : A_2 \rightarrow A_2$$

be endomorphisms of Ω_2 -algebra A_2 . Let product in multiplicative Ω -group $\text{End}(\Omega_2, A_2)$ is composition of endomorphisms. Since the product of maps f and g is defined in the same order as these maps act on A_2 -number, then we consider the equality

$$(5.1.15) \quad a \circ (g \circ f) = (a \circ g) \circ f$$

as **associative law**. This allows writing of equality (5.1.15) without using of brackets

$$a \circ g \circ f = (a \circ g) \circ f = a \circ (g \circ f)$$

as well it allows writing of equality (5.1.13) in the following form

$$(5.1.16) \quad a_2 \circ f(a_1 * b_1) = a_2 \circ f(a_1) \circ f(b_1)$$

From the equality (5.1.14), it follows that

$$(5.1.17) \quad a_2 * (a_1 * b_1) = (a_2 * a_1) * b_1$$

We consider the equality (5.1.17) as **associative law**.

REMARK 5.1.6. Let the map

$$f : A_1 \dashrightarrow A_2$$

be the left-side representation of multiplicative Ω -group A_1 in Ω_2 -algebra A_2 . Let the map

$$g : B_1 \dashrightarrow B_2$$

be the left-side representation of multiplicative Ω -group B_1 in Ω_2 -algebra B_2 . Let the map

$$(r_1 : A_1 \rightarrow B_1, r_2 : A_2 \rightarrow B_2)$$

be morphism of representations. We use notation

$$r_2(a_2) = r_2 \circ a_2$$

for image of A_2 -number a_2 with respect to the map r_2 . Then we can write the equality (3.2.3) in the following form

$$r_2 \circ (a_2 * a_1) = (r_2 \circ a_2) * r_1(a_1)$$

□

If multiplicative Ω -group A_1 is Abelian, then there is no difference between left-side and right-side representations.

DEFINITION 5.1.7. Let A_1 be Abelian multiplicative Ω -group. We call a homomorphism of multiplicative Ω -group

$$(5.1.18) \quad f : A_1 \rightarrow \text{End}(\Omega_2, A_2)$$

representation of multiplicative Ω -group A_1 or **A_1 -representation** in Ω_2 -algebra A_2 if the map f holds

$$(5.1.19) \quad f(a_1 * b_1) \bullet a_2 = (f(a_1) \bullet f(b_1)) \bullet a_2$$

□

Usually we identify a representation of the Abelian multiplicative Ω -group A_1 and a left-side representation of the multiplicative Ω -group A_1 . However, if it is necessary for us, we identify a representation of the Abelian multiplicative Ω -group A_1 and a right-side representation of the multiplicative Ω -group A_1 .

From the analysis of examples 5.1.1, 5.1.2, it follows that choice between left-side and right-side representation depends from considered model. Since left-side representation and right-side representation are based on homomorphism of Ω -group, then the following statement is true.

THEOREM 5.1.8 (duality principle for representation of multiplicative Ω -group). Any statement which holds for left-side representation of multiplicative Ω -group A_1 holds also for right-side representation of multiplicative Ω -group A_1 , if we will use right-side product over A_1 -number a_1 instead of left-side product over A_1 -number a_1 . □

REMARK 5.1.9. If Ω_1 -algebra is not multiplicative Ω -group, then we cannot tell whether representation acts on left or on right. In this case we continue to us functional notation $f(a_1)(a_2)$ for representation of Ω_1 -algebra. □

5.2. Left and Right Shifts

THEOREM 5.2.1. The product

$$(a, b) \rightarrow a * b$$

in multiplicative Ω -group A determines two different representations.

- the left shift

$$a' = L(b) \circ a = b * a$$

is left-side representation of multiplicative Ω -group A in Ω -algebra A

$$(5.2.1) \quad L(c * b) = L(c) \circ L(b)$$

- **the right shift**

$$a' = a \circ R(b) = a * b$$

is right-side representation of multiplicative Ω -group A in Ω -algebra A

$$(5.2.2) \quad R(b * c) = R(b) \circ R(c)$$

PROOF. According to the definition 4.5.4, left and right shifts are endomorphisms of Ω -algebra A . According to the definition 4.5.4, we can define Ω -algebra on the set of left shifts. According to the definition of multiplicative group,^{5.3} the equality $a_1 = a_2$ follows from the equality

$$L(a_1) \circ x = a_1 * x = a_2 * x = L(a_2) \circ x$$

for any x . In particular, the equality (5.2.1) follows from the equality

$$L(c * b) \circ a = (c * b) * a = c * (b * a) = L(c) \circ (L(b) \circ a) = L(c) \circ L(b) \circ a$$

Therefore, the map

$$a \in A \rightarrow L(a)$$

is left-side representation of multiplicative Ω -group A in Ω -algebra A . Similar reasoning is true for right shift. \square

Associative D -algebra is multiplicative Ω -group. Non associative D -algebra A is not Ω -group, because A is groupoid with respect to product. However we also study representation of non associative D -algebra.

DEFINITION 5.2.2. *Let product*

$$c_1 = a_1 * b_1$$

be operation of Ω_1 -algebra A . Let $\Omega = \Omega_1 \setminus \{*\}$. If Ω_1 -algebra A is groupoid with respect to product and, for any operation $\omega \in \Omega(n)$, the product is distributive over the operation ω

$$a * (b_1 \dots b_n \omega) = (a * b_1) \dots (a * b_n) \omega$$

$$(b_1 \dots b_n \omega) * a = (b_1 * a) \dots (b_n * a) \omega$$

then Ω_1 -algebra A is called **Ω -groupoid**. \square

We will use the same notation for representation of Ω -groupoid as we use for representation of multiplicative Ω -group.

THEOREM 5.2.3. *The product in non associative Ω -groupoid A determines two different representations.*

- *The left shift*

$$a' = L(b) \circ a = b * a$$

is representation of Ω -algebra A in Ω -algebra A .

- *The right shift*

$$a' = a \circ R(b) = a * b$$

is representation of Ω -algebra A in Ω -algebra A .

^{5.3} See, for instance, definition on pages [2]-3, [2]-7.

PROOF. According to the definition 4.5.4, left and right shifts are endomorphisms of Ω -algebra A . According to the definition 5.2.2, we can define Ω -algebra on the set of left shifts. Therefore, the map

$$a \in A \rightarrow L(a)$$

is representation of Ω -algebra A in Ω -algebra A . \square

THEOREM 5.2.4. *Let*

$$L : A \xrightarrow{*} A$$

be representation of non associative Ω -groupoid A in Ω -algebra A . Then, on the set $\text{End}(\Omega, A)$, there exists product which is different from the superposition of endomorphisms.

PROOF. Consider the map

$$L : A \rightarrow \text{End}(\Omega, A) \quad L(a) : b \rightarrow ab$$

Since the product in Ω -groupoid A is not associative, then, in general

$$L(a) \circ (L(b) \circ c) = a * (b * c) \neq (a * b) * c = L(a * b) \circ c$$

Therefore, $L(ab) \neq L(a) \circ L(b)$. \square

According to the theorem 5.2.1, if A is multiplicative Ω -group, then the equality (5.2.1) ensures that left shift generates is left-side representation of multiplicative Ω -group A in Ω -algebra A . According to the theorem 5.2.4 this equality is not true in non associative Ω -groupoid A . However theorems 5.2.3, 5.2.4 do not answer the question about the possibility of consideration of left-side representation of non associative Ω -groupoid A in Ω -algebra A . According to the example 5.2.5, there exists possibility of such representation, even product in Ω -groupoid is non associative.

EXAMPLE 5.2.5. *Let A be Lie algebra. The product^{5.4} $[a, b]$ of A -numbers a, b satisfies to the equality*

$$(5.2.3) \quad [a, b] = -[b, a]$$

and to Lee identity

$$(5.2.4) \quad [c, [b, a]] + [b, [a, c]] + [a, [c, b]] = 0$$

We define left shift on Lie algebra A by the equality

$$(5.2.5) \quad L(b) \circ a = [b, a]$$

From the equality (5.2.5), it follows that

$$(5.2.6) \quad L(c) \circ L(b) \circ a = L(c) \circ (L(b) \circ a) = [c, [b, a]]$$

The equality

$$(5.2.7) \quad \begin{aligned} L(c) \circ L(b) \circ a - L(b) \circ L(c) \circ a &= [c, [b, a]] - [b, [c, a]] \\ &= [c, [b, a]] + [b, [a, c]] \end{aligned}$$

follows from equalities (5.2.3), (5.2.6). The equality

$$(5.2.8) \quad [c, [b, a]] + [b, [a, c]] = -[a, [c, b]] = [[c, b], a]$$

^{5.4} See definition [17]-1 on the page 3.

follows from equalities (5.2.3), (5.2.4). The equality

$$(5.2.9) \quad L(c) \circ L(b) \circ a - L(b) \circ L(c) \circ a = L([c, b]) \circ a$$

follows from equalities (5.2.5), (5.2.7), (5.2.8).

If I define Lie product

$$[L(c), L(b)] \circ a = L(c) \circ L(b) \circ a - L(b) \circ L(c) \circ a$$

on the set of left shifts then the equality (5.2.9) gets the form

$$(5.2.10) \quad [L(c), L(b)] \circ a = L([c, b]) \circ a$$

Therefore, Lie algebra A with product $[a, b]$ generates representation in vector space A . \square

5.3. Orbit of Representation of Multiplicative Ω -Group

THEOREM 5.3.1. Let the map

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

be the left-side representation of multiplicative Ω_1 -group A_1 . and e be unit of multiplicative Ω_1 -group A_1 . Then

$$f(e) = \delta$$

where δ is identity transformation of Ω_2 -algebra A_2 .

PROOF. The theorem follows from the equality

$$f(a) = f(a * e) = f(a) \circ f(e)$$

for any A_1 -number. \square

THEOREM 5.3.2. Let the map

$$g : A_1 \longrightarrow A_2$$

be the left-side representation of multiplicative Ω -group A_1 . For any $g \in A_1$ transformation has inverse map and satisfies the equality

$$(5.3.1) \quad f(g^{-1}) = f(g)^{-1}$$

PROOF. Let e be unit of multiplicative Ω -group A_1 and δ be identity transformation of the set A_2 . Based on (5.1.6) and the theorem 5.3.1, we have

$$u = \delta \circ u = f(gg^{-1}) \circ u = f(g) \circ f(g^{-1}) \circ u$$

This completes the proof. \square

DEFINITION 5.3.3. Let A_1 be Ω -groupoid with product

$$(a, b) \rightarrow a * b$$

Let the map

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

be the left-side representation of Ω -groupoid A_1 in Ω_2 -algebra A_2 . For any $a_2 \in A_2$, we define **orbit of representation** of the Ω -groupoid A_1 as set

$$A_1 * a_2 = \{b_2 = a_1 * a_2 : a_1 \in A_1\}$$

\square

DEFINITION 5.3.4. Let A_1 be Ω -groupoid with product

$$(a, b) \rightarrow a * b$$

Let the map

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

be the left-side representation of Ω -groupoid A_1 in Ω_2 -algebra A_2 . For any $a_2 \in A_2$, we define **orbit of representation** of the Ω -groupoid A_1 as set

$$a_2 * A_1 = \{b_2 = a_2 * a_1 : a_1 \in A_1\}$$

□

THEOREM 5.3.5. Let the map

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

be the left-side representation of multiplicative Ω -group A_1 . Then $a_2 \in A_1 * a_2$.

PROOF. According to the theorem 5.3.1,

$$a_2 = e * a_2 = f(e) \circ a_2$$

□

THEOREM 5.3.6. Let

$$L : A \longrightarrow A$$

be representation of Lie algebra generated by the set of left shifts. Then $a \notin [A, a]$.

PROOF. The theorem follows from absence of unit in Lie algebra. Besides, the set of vectors of three dimensional space where we defined cross product is the most simple example of Lie algebra. It is evident that there no exist vector b such that

$$a = b \times a$$

□

THEOREM 5.3.7. Let the map

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

be the left-side representation of multiplicative Ω -group A_1 . Let

$$(5.3.2) \quad b_2 \in A_1 * a_2$$

Then

$$(5.3.3) \quad A_1 * a_2 = A_1 * b_2$$

PROOF. From (5.3.2) it follows that there exists $a_1 \in A_1$ such that

$$(5.3.4) \quad b_2 = a_1 * a_2$$

Let $c_2 \in A_1 * b_2$. Then there exists $b_1 \in A_1$ such that

$$(5.3.5) \quad c_2 = b_1 * b_2$$

If we substitute (5.3.4) into (5.3.5) we get

$$(5.3.6) \quad c_2 = b_1 * a_1 * a_2$$

Based (5.1.6), we see that from (5.3.6) it follows that $c_2 \in A_1 * a_2$. Thus

$$(5.3.7) \quad A_1 * b_2 \subseteq A_1 * a_2$$

Based (5.3.1), we see that, from (5.3.4), it follows that

$$(5.3.8) \quad a_2 = a_1^{-1} * b_2$$

From (5.3.8) it follows that $a_2 \in A_1 * b_2$ and therefore

$$(5.3.9) \quad A_1 * a_2 \subseteq A_1 * b_2$$

The equality (5.3.3) follows from statements (5.3.7), (5.3.9). \square

Thus, the left-side representation of multiplicative Ω -group A_1 in Ω_2 -algebra A_2 forms equivalence S and the orbit $A_1 * a_2$ is equivalence class. We will use notation A_2/A_1 for quotient set A_2/S and this set is called **space of orbits of left-side representation f** .

5.4. Representation in Ω -Group

THEOREM 5.4.1. *We call kernel of inefficiency of left-side representation of multiplicative Ω -group A_1 in Ω_2 -algebra A_2 a set*

$$K_f = \{a_1 \in A_1 : f(a_1) = \delta\}$$

A kernel of inefficiency of left-side representation is a subgroup of the multiplicative group A_1 .

PROOF. Assume $f(a_1) = \delta$ and $f(a_2) = \delta$. Then

$$\begin{aligned} f(a_1 * a_2) &= f(a_1) \bullet f(a_2) = \delta \\ f(a_1^{-1}) &= (f(a_1))^{-1} = \delta \end{aligned}$$

\square

THEOREM 5.4.2. *Left-side representation of multiplicative Ω -group A_1 in Ω_2 -algebra A_2 is **effective** iff kernel of inefficiency $K_f = \{e\}$.*

PROOF. Statement follows from the definitions 3.1.2 and from the theorem 5.4.1. \square

THEOREM 5.4.3. *If a representation*

$$f : A_1 \dashrightarrow A_2$$

of multiplicative Ω -group A_1 in Ω_2 -algebra A_2 is not effective we can switch to the effective representation replacing the multiplicative Ω -group A_1 by the multiplicative Ω -group $A'_1 = A_1/K_f$.

PROOF. Let the operation $\omega \in \Omega(n)$. To prove the theorem, we need to show that the equality

$$(5.4.1) \quad f(a_1 \dots a_n \omega) = f(b_1 \dots b_n \omega)$$

follows from the statement $f(a_1) = f(b_1), \dots, f(a_n) = f(b_n)$. Indeed, the equality (5.4.1) follows from the equality

$$f(a_1 \dots a_n \omega) = f(a_1) \dots f(a_n) \omega = f(b_1) \dots f(b_n) \omega = f(b_1 \dots b_n \omega)$$

\square

The theorem 5.4.3 means that we can study only an effective action.

5.5. Single Transitive Right-Side Representation of Group

THEOREM 5.5.1. *Let the map*

$$g : A_1 \longrightarrow A_2$$

*be the left-side representation of multiplicative Ω -group A_1 in Ω_2 -algebra A_2 . A **little group** or **stability group** of $a_2 \in A_2$ is the set*

$$A_{1a_2} = \{a_1 \in A_1 : a_1 * a_2 = a_2\}$$

*The representation f is **free**, iff, for any $a_2 \in A_2$, stability group $A_{1a_2} = \{e\}$.*

PROOF. According to the definition 3.1.4, the representation f is free iff the statement

$$(5.5.1) \quad f(a_1) = f(b_1)$$

implies the equality $a_1 = b_1$. The equality (5.5.1) is equivalent to the equality

$$(5.5.2) \quad f(b_1^{-1} * a_1) = \delta$$

The statement (5.5.2) implies the equality $a_1 = b_1$ iff, for any $a_2 \in A_2$, stability group $A_{1a_2} = \{e\}$. \square

THEOREM 5.5.2. *Let the map*

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

be the free left-side representation of multiplicative Ω -group A_1 in Ω_2 -algebra A_2 . There exist 1 – 1 correspondence between any two orbits of representation, as well between any orbit of representation and multiplicative Ω -group A_1 .

PROOF. Given $a_2 \in A_2$ there exist $a_1, b_1 \in A_1$

$$(5.5.3) \quad a_1 * a_2 = b_1 * a_2$$

We multiply both parts of equation (5.5.3) by a_1^{-1}

$$a_2 = a_1^{-1} * b_1 * a_2$$

Since the representation is free, $a_1 = b_1$. Since we established 1 – 1 correspondence between orbit and multiplicative Ω -group A_1 , we proved the statement of the theorem. \square

THEOREM 5.5.3. *Left-side representation*

$$g : A_1 \longrightarrow A_2$$

*of multiplicative Ω -group A_1 in Ω_2 -algebra A_2 is **single transitive** iff, for any $a_2, b_2 \in A_2$, exists one and only one $a_1 \in A_1$ such that $a_2 = a_1 * b_2$.*

PROOF. Corollary of definitions 3.1.2 and 3.1.8. \square

THEOREM 5.5.4. *If there exists single transitive representation*

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

of multiplicative Ω -group A_1 in Ω_2 -algebra A_2 , then we can uniquely define coordinates on A_2 using A_1 -numbers.

If f is left-side single transitive representation then $f(a)$ is equivalent to the left shift $L(a)$ on the group A_1 . If f is right-side single transitive representation then $f(a)$ is equivalent to the right shift $R(a)$ on the group A_1 .

PROOF. Let f be left-side single transitive representation. We select A_2 -number a_2 and define coordinates of A_2 -number b_2 as A_1 -number a_1 such that

$$b_2 = a_1 * a_2 = (a_1 * e) * a_2 = (L(a_1) \circ e) * a_2$$

Coordinates defined this way are unique up to choice of A_2 -number a_2 because the action is effective. For left-side single transitive representation, we also use notation

$$f(a_1) \bullet a_2 = L(a_1) \circ a_2 = (L(a_1) \circ e) * a_2$$

We use notation $L(a_1) \circ a_2$ for left-side single transitive representation f because, according to the theorem 5.2.1, product of left shifts equals their composition.

Let f be right-side single transitive representation. We select A_2 -number a_2 and define coordinates of A_2 -number b_2 as A_1 -number a_1 such that

$$b_2 = a_2 * a_1 = a_2 * (e * a_1) = a_2 * (e \circ R(a_1))$$

Coordinates defined this way are unique up to choice of A_2 -number a_2 because the action is effective. For right-side single transitive representation, we also use notation

$$a_2 \bullet f(a_1) = a_2 \circ R(a_1) = a_2 * (e \circ R(a_1))$$

We use notation $a_2 \circ R(a_1)$ for right-side single transitive representation f because, according to the theorem 5.2.1, product of right shifts equals their composition. \square

DEFINITION 5.5.5. We call Ω_2 -algebra A_2 **homogeneous space** of multiplicative Ω -group A_1 if there exists single transitive left-side representation

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

\square

THEOREM 5.5.6. Free left-side representation of multiplicative Ω -group A_1 in Ω_2 -algebra A_2 is single transitive representation on orbit.

PROOF. The theorem follows from the theorem 5.5.2. \square

THEOREM 5.5.7. Left and right shifts on multiplicative Ω -group A_1 are commuting.

PROOF. The theorem follows from the associativity of product on multiplicative Ω -group A_1

$$(L(a) \circ c) \circ R(b) = (a * c) * b = a * (c * b) = L(a) \circ (c \circ R(b))$$

\square

Theorem 5.5.7 can be phrased in the following way.

THEOREM 5.5.8. Let A_1 be multiplicative Ω -group. For any $a_1 \in A_1$, the map $L(a_1)$ is automorphism of representation R .

PROOF. According to theorem 5.5.7

$$(5.5.4) \quad L(a_1) \circ R(b_1) = R(b_1) \circ L(a_1)$$

Equation (5.5.4) coincides with equation (3.2.2) from definition 3.2.2 when $r_1 = id$, $r_2 = L(a_1)$. \square

THEOREM 5.5.9. *Let left-side A_1 -representation f on Ω_2 -algebra A_2 be single transitive. Then we can uniquely define a single transitive right-side A_1 -representation h on Ω_2 -algebra A_2 such that diagram*

$$\begin{array}{ccc} A_2 & \xrightarrow{h(a_1)} & A_2 \\ \downarrow f(b_1) & & \downarrow f(b_1) \\ A_2 & \xrightarrow{h(a_1)} & A_2 \end{array}$$

is commutative for any $a_1, b_1 \in A_1$.^{5.5}

PROOF. We use group coordinates for A_2 -numbers a_2 . Then according to theorem 5.5.4 we can write the left shift $L(a_1)$ instead of the transformation $f(a_1)$.

Let $a_2, b_2 \in A_2$. Then we can find one and only one $a_1 \in A_1$ such that

$$b_2 = a_2 * a_1 = a_2 \circ R(a_1)$$

We assume

$$h(a) = R(a)$$

For some $b_1 \in A_1$, we have

$$c_2 = f(b_1) \bullet a_2 = L(b_1) \circ a_2 \quad d_2 = f(b_1) \bullet b_2 = L(b_1) \circ b_2$$

According to the theorem 5.5.7, the diagram

$$(5.5.5) \quad \begin{array}{ccc} a_2 & \xrightarrow{h(a_1)=R(a_1)} & b_2 \\ \downarrow f(b_1)=L(b_1) & & \downarrow f(b_1)=L(b_1) \\ c_2 & \xrightarrow{h(a_1)=R(a_1)} & d_2 \end{array}$$

is commutative.

Changing b_1 we get that c_2 is an arbitrary A_2 -number.

We see from the diagram that if $a_2 = b_2$ then $c_2 = d_2$ and therefore $h(e) = \delta$. On other hand if $a_2 \neq b_2$ then $c_2 \neq d_2$ because the left-side A_1 -representation f is single transitive. Therefore the right-side A_1 -representation h is effective.

In the same way we can show that for given c_2 we can find a_1 such that $d_2 = c_2 \bullet h(a_1)$. Therefore the right-side A_1 -representation h is single transitive.

In general the product of transformations of the left-side A_1 -representation f is not commutative and therefore the right-side A_1 -representation h is different from the left-side A_1 -representation f . In the same way we can create a left-side A_1 -representation f using the right-side A_1 -representation h . \square

Representations f and h are called **twin representations** of the multiplicative Ω -group A_1 .

REMARK 5.5.10. *It is clear that transformations $L(a)$ and $R(a)$ are different until the multiplicative Ω -group A_1 is nonabelian. However they both are maps onto. Theorem 5.5.9 states that if both right and left shift presentations exist on the set A_2 , then we can define two commuting representations on the set A_2 . The*

^{5.5}You can see this statement in [4].

right shift or the left shift only cannot represent both types of representation. To understand why it is so let us change diagram (5.5.5) and assume

$$h(a_1) \bullet a_2 = L(a_1) \circ a_2 = b_2$$

instead of

$$a_2 \bullet h(a_1) = a_2 \circ R(a_1) = b_2$$

and let us see what expression $h(a_1)$ has at the point c_2 . The diagram

$$\begin{array}{ccc} a_2 & \xrightarrow{h(a_1)=L(a_1)} & b_2 \\ \downarrow f(b_1)=L(b_1) & & \downarrow f(b_1)=L(b_1) \\ c_2 & \xrightarrow{h(a_1)} & d_2 \end{array}$$

is equivalent to the diagram

$$\begin{array}{ccc} a_2 & \xrightarrow{h(a_1)=L(a_1)} & b_2 \\ \uparrow (f(b_1))^{-1}=L(b_1^{-1}) & & \downarrow f(b_1)=L(b_1) \\ c_2 & \xrightarrow{h(a_1)} & d_2 \end{array}$$

and we have $d_2 = b_1 b_2 = b_1 a_1 a_2 = b_1 a_1 b_1^{-1} c_2$. Therefore

$$h(a_1) \bullet c_2 = (b_1 a_1 b_1^{-1}) c_2$$

We see that the representation of h depends on its argument. \square

THEOREM 5.5.11. *Let f and h be twin representations of the multiplicative Ω -group A_1 . For any $a_1 \in A_1$ the map $h(a_1)$ is automorphism of representation f .*

PROOF. The statement of theorem is corollary of theorems 5.5.8 and 5.5.9. \square

QUESTION 5.5.12. *Is there a morphism of representations from L to L different from automorphism $R(a_1)$? If we assume*

$$r_1(a_1) = c_1 a_1 c_1^{-1}$$

$$r_2(a_1) \circ a_2 = c_1 a_2 a_1 c_1^{-1}$$

then it is easy to see that the map $(r_1 \ r_2(a_1))$ is morphism of the representations from L to L . However this map is not automorphism of the representation L , because $r_1 \neq \text{id}$. \square

Basis of Representation of Universal Algebra

6.1. Generating Set of Representation

DEFINITION 6.1.1. *Let*

$$f : A_1 \dashrightarrow A_2$$

*be representation of Ω_1 -algebra A_1 in Ω_2 -algebra A_2 . The set $B_2 \subset A_2$ is called **stable set of representation** f , if $f(a)(m) \in B_2$ for each $a \in A_1$, $m \in B_2$. \square*

We also say that the set A_2 is stable with respect to the representation f .

THEOREM 6.1.2. *Let*

$$f : A_1 \dashrightarrow A_2$$

be representation of Ω_1 -algebra A_1 in Ω_2 -algebra A_2 . Let set $B_2 \subset A_2$ be subalgebra of Ω_2 -algebra A_2 and stable set of representation f . Then there exists representation

$$f_{B_2} : A_1 \dashrightarrow B_2$$

*such that $f_{B_2}(a) = f(a)|_{B_2}$. Representation f_{B_2} is called **subrepresentation** of representation f .*

PROOF. Let ω_1 be n -ary operation of Ω_1 -algebra A_1 . Then for each $a_1, \dots, a_n \in A_1$ and each $b \in B_2$

$$\begin{aligned} (f_{B_2}(a_1) \dots f_{B_2}(a_n) \omega_1)(b) &= (f(a_1) \dots f(a_n) \omega_1)(b) = f(a_1 \dots a_n \omega_1)(b) \\ &= f_{B_2}(a_1 \dots a_n \omega_1)(b) \end{aligned}$$

Let ω_2 be n -ary operation of Ω_2 -algebra A_2 . Then for each $b_1, \dots, b_n \in B_2$ and each $a \in A_1$

$$\begin{aligned} f_{B_2}(a)(b_1) \dots f_{B_2}(a)(b_n) \omega_2 &= f(a)(b_1) \dots f(a)(b_n) \omega_2 = f(a)(b_1 \dots b_n \omega_2) \\ &= f_{B_2}(a)(b_1 \dots b_n \omega_2) \end{aligned}$$

We proved the statement of theorem. \square

From the theorem 6.1.2, it follows that if f_{B_2} is subrepresentation of representation f , then the map

$$(\text{id} : A \rightarrow A, \text{id}_{B_2} : B_2 \rightarrow A_2)$$

is morphism of representations.

THEOREM 6.1.3. *The set^{6.1} \mathcal{B}_f of all subrepresentations of representation f generates a closure system on Ω_2 -algebra A_2 and therefore is a complete lattice.*

PROOF. Let $(K_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ be the set off subalgebras of Ω_2 -algebra A_2 that are stable with respect to representation f . We define the operation of intersection on the set \mathcal{B}_f according to rule

$$\bigcap f_{K_\lambda} = f_{\cap K_\lambda}$$

We defined the operation of intersection of subrepresentations properly. $\cap K_\lambda$ is subalgebra of Ω_2 -algebra A_2 . Let $m \in \cap K_\lambda$. For each $\lambda \in \Lambda$ and for each $a \in A_1$, $f(a)(m) \in K_\lambda$. Therefore, $f(a)(m) \in \cap K_\lambda$. Therefore, $\cap K_\lambda$ is the stable set of representation f . \square

We denote the corresponding closure operator by $J[f]$. Thus $J[f, X]$ is the intersection of all subalgebras of Ω_2 -algebra A_2 containing X and stable with respect to representation f .

THEOREM 6.1.4. *Let^{6.2}*

$$g : A_1 \dashrightarrow A_2$$

be representation of Ω_1 -algebra A_1 in Ω_2 -algebra A_2 . Let $X \subset A_2$. Define a subset $X_k \subset A_2$ by induction on k .

$$6.1.4.1: X_0 = X$$

$$6.1.4.2: x \in X_k \Rightarrow x \in X_{k+1}$$

$$6.1.4.3: x_1 \in X_k, \dots, x_n \in X_k, \omega \in \Omega_2(n) \Rightarrow x_1 \dots x_n \omega \in X_{k+1}$$

$$6.1.4.4: x \in X_k, a \in A \Rightarrow f(a)(x) \in X_{k+1}$$

Then

$$(6.1.1) \quad \bigcup_{k=0}^{\infty} X_k = J[f, X]$$

PROOF. If we put $U = \cup X_k$, then by definition of X_k , we have $X_0 \subset J[f, X]$, and if $X_k \subset J[f, X]$, then $X_{k+1} \subset J[f, X]$. By induction it follows that $X_k \subset J[f, X]$ for all k . Therefore,

$$(6.1.2) \quad U \subset J[f, X]$$

If $a \in U^n$, $a = (a_1, \dots, a_n)$, where $a_i \in X_{k_i}$, and if $k = \max\{k_1, \dots, k_n\}$, then $a_1 \dots a_n \omega \in X_{k+1} \subset U$. Therefore, U is subalgebra of Ω_2 -algebra A_2 .

If $m \in U$, then there exists such k that $m \in X_k$. Therefore, $f(a)(m) \in X_{k+1} \subset U$ for any $a \in A_1$. Therefore, U is stable set of the representation f .

Since U is subalgebra of Ω_2 -algebra A_2 and is a stable set of the representation f , then subrepresentation f_U is defined. Therefore,

$$(6.1.3) \quad J[f, X] \subset U$$

From (6.1.2), (6.1.3), it follows that $J[f, X] = U$. \square

^{6.1} This definition is similar to definition of the lattice of subalgebras ([14], p. 79, 80). In general, In this and subsequent theorems of this chapter, it is necessary to consider the structure of universal algebras A_1 and A_2 . Because the main task of this chapter is the study of the structure of the representation, I deliberately simplified the theorems so that the details do not obscure the basic statements. This topic will be discussed in more details in the chapter 8, where theorems will be formulated in general form.

^{6.2}The statement of theorem is similar to the statement of theorem 5.1, [14], page 79.

DEFINITION 6.1.5. $J[f, X]$ is called **subrepresentation** generated by set X , and X is a generating set of subrepresentation $J[f, X]$. In particular, a **generating set** of representation f is a subset $X \subset A_2$ such that $J[f, X] = A_2$. \square

The next definition follows from the theorem 6.1.4.

DEFINITION 6.1.6. Let $X \subset A_2$. For each $m \in J[f, X]$ there exists Ω_2 -word defined according to following rules. $w[f, X, m]$

6.1.6.1: If $m \in X$, then m is Ω_2 -word.

6.1.6.2: If m_1, \dots, m_n are Ω_2 -words and $\omega \in \Omega_2(n)$, then $m_1 \dots m_n \omega$ is Ω_2 -word.

6.1.6.3: If m is Ω_2 -word and $a \in A_1$, then $f(a)(m)$ is Ω_2 -word.

We will identify an element $m \in J[f, X]$ and corresponding it Ω_2 -word using equation

$$m = w[f, X, m]$$

Similarly, for an arbitrary set $B \subset J[f, X]$ we consider the set of Ω_2 -words^{6.3}

$$w[f, X, B] = \{w[f, X, m] : m \in B\}$$

We also use notation

$$w[f, X, B] = (w[f, X, m], m \in B)$$

Denote $w[f, X]$ the set of Ω_2 -words of representation $J[f, X]$. \square

THEOREM 6.1.7. $w[f, X, X] = X$.

PROOF. The theorem follows from the statement 6.1.6.1. \square

THEOREM 6.1.8. Let X, Y be generating sets of representation

$$f : A_1 \xrightarrow{*} A_2$$

Let $w[f, X, m]$ be Ω_2 -word of A_2 -number m relative generating set X . Let $w[f, Y, X]$ be the set of Ω_2 -words of the set X relative generating set Y . If, in the word $w[f, X, m]$, we substitute image $w[f, Y, x]$ of each $x \in X$, then we get Ω_2 -word $w[f, Y, m]$ of A_2 -number m relative generating set Y .

Transformation of Ω_2 -words

$$w[f, X, m] \rightarrow w[f, Y, m]$$

$$w[f, Y, m] = w[f, Y, X] \circ w[f, X, m]$$

is called superposition of coordinates.

PROOF. We prove the theorem by induction over complexity of Ω_2 -word.

If $m \in X$, then $w[f, X, m] = m$. If we substitute image $w[f, Y, x]$ of m , then we get Ω_2 -word $w[f, Y, m]$ of A_2 -number m relative generating set Y .

Let Ω_2 -word $w[f, X, m]$ of A_2 -number m has form

$$(6.1.4) \quad w[f, X, m] = w[f, X, m_1] \dots w[f, X, m_n] \omega$$

where $\omega \in \Omega_2(n)$ and, for each A_2 -number m_i , we defined map

$$w[f, X, m_i] \rightarrow w[f, Y, m_i]$$

^{6.3}The expression $w[f, X, m]$ is a special case of the expression $w[f, X, B]$, namely

$$w[f, X, \{m\}] = \{w[f, X, m]\}$$

According to the statement 6.1.6.2, the expression

$$w[f, Y, m_1] \dots w[f, Y, m_n] \omega$$

is Ω_2 -word $w[f, Y, m]$ of A_2 -number m relative generating set Y . Therefore, we defined map

$$w[f, X, m] \rightarrow w[f, Y, m]$$

for A_2 -number m .

Let Ω_2 -word $w[f, X, m]$ of A_2 -number m has form

$$(6.1.5) \quad w[f, X, m] = f(a)(w[f, X, m_1])$$

where, for A_2 -number m_1 , we defined map

$$w[f, X, m_1] \rightarrow w[f, Y, m_1]$$

According to the statement 6.1.6.3, the expression

$$f(a)(w[f, Y, m_1])$$

is Ω_2 -word $w[f, Y, m]$ of A_2 -number m relative generating set Y . Therefore, we defined map

$$w[f, X, m] \rightarrow w[f, Y, m]$$

for A_2 -number m . □

Choice of Ω_2 -word relative generating set X is ambiguous. Therefore, if Ω_2 -number has different Ω_2 -words, then we will use indexes to distinguish them: $w[f, X, m]$, $w_1[f, X, m]$, $w_2[f, X, m]$.

DEFINITION 6.1.9. *Generating set X of representation f generates equivalence*

$$\rho[f, X] = \{(w[f, X, m], w_1[f, X, m]) : m \in A_2\}$$

on the set of Ω_2 -words. □

According to the definition 6.1.9, two Ω_2 -words with respect to the generating set X of representation f are equivalent iff they correspond to the same A_2 -number. When we write equality of two Ω_2 -words with respect to the generating set X of representation f , we will keep in mind that this equality is true up to equivalence $\rho[f, X]$.

THEOREM 6.1.10. *Let*

$$f : A_1 \xrightarrow{*} A_2$$

be representation of Ω_1 -algebra A_1 in Ω_2 -algebra A_2 . Let

$$g : A_1 \xrightarrow{*} B_2$$

be representation of Ω_1 -algebra A_1 in Ω_2 -algebra B_2 . Let X be the generating set of representation f . Let

$$R : A_2 \rightarrow B_2$$

be reduced morphism of representation^{6.4} and $X' = R(X)$. Reduced morphism R of representation generates the map of Ω_2 -words

$$w[f \rightarrow g, X, R] : w[f, X] \rightarrow w[g, X']$$

such that

^{6.4} I considered morphism of representation in the theorem 8.1.7.

6.1.10.1: If $m \in X$, $m' = R(m)$, then

$$w[f \rightarrow g, X, R](m) = m'$$

6.1.10.2: If

$$m_1, \dots, m_n \in w[f, X]$$

$$m'_1 = w[f \rightarrow g, X, R](m_1) \quad \dots \quad m'_n = w[f \rightarrow g, X, R](m_n)$$

then for operation $\omega \in \Omega_2(n)$ holds

$$w[f \rightarrow g, X, R](m_1 \dots m_n \omega) = m'_1 \dots m'_n \omega$$

6.1.10.3: If

$$m \in w[f, X] \quad m' = w[f \rightarrow g, X, R](m) \quad a \in A_1$$

then

$$w[f \rightarrow g, X, R](f(a)(m)) = g(a)(m')$$

PROOF. Statements 6.1.10.1, 6.1.10.2 are true by definition of the reduced morphism R . The statement 6.1.10.3 follows from the equality (3.4.5). \square

REMARK 6.1.11. Let

$$R : A_2 \rightarrow B_2$$

be reduced morphism of representation. Let

$$m \in J[f, X] \quad m' = R(m) \quad X' = R(X)$$

The theorem 6.1.10 states that $m' \in J[g, X']$. The theorem 6.1.10 also states that Ω_2 -word representing m relative X and Ω_2 -word representing m' relative X' are generated according to the same algorithm. This allows considering of the set of Ω_2 -words $w[g, X', m']$ as map

$$(6.1.6) \quad W[f, X, m] : (g, X') \rightarrow (g, X') \circ W[f, X, m] = w[g, X', m']$$

where

$$X' = R(X) \quad m' = R(m)$$

for certain reduced morphism R .

If $f = g$, then, instead of the map (6.1.6), we consider the map

$$W[f, X, m] : X' \rightarrow X' \circ W[f, X, m] = w[f, X', m']$$

such that, if for certain endomorphism R

$$X' = R(X) \quad m' = R(m)$$

then

$$W[f, X, m](X') = X' \circ W[f, X, m] = w[f, X', m'] = m'$$

The map $W[f, X, m]$ is called **coordinates of A_2 -number m relative to the set X** . Similarly, we consider coordinates of a set $B \subset J[f, X]$ relative to the set X

$$W[f, X, B] = \{W[f, X, m] : m \in B\} = (W[f, X, m], m \in B)$$

Denote

$$W[f, X] = \{W[f, X, m] : m \in J[f, X]\} = (W[f, X, m], m \in J[f, X])$$

the set of coordinates of representation $J[f, X]$. \square

THEOREM 6.1.12. *There is a structure of Ω_2 -algebra on the set of coordinates $W[f, X]$.*

PROOF. Let $\omega \in \Omega_2(n)$. Then for any $m_1, \dots, m_n \in J[f, X]$, we assume

$$(6.1.7) \quad W[f, X, m_1] \dots W[f, X, m_n] \omega = W[f, X, m_1 \dots m_n \omega]$$

According to the remark 6.1.11,

$$(6.1.8) \quad \begin{aligned} X \circ (W[f, X, m_1] \dots W[f, X, m_n] \omega) &= X \circ W[f, X, m_1 \dots m_n \omega] \\ &= w[f, X, m_1 \dots m_n \omega] \end{aligned}$$

follows from the equation (6.1.7). According to rule 6.1.6.2, from the equation (6.1.8), it follows that

$$(6.1.9) \quad \begin{aligned} &X \circ (W[f, X, m_1] \dots W[f, X, m_n] \omega) \\ &= w[f, X, m_1] \dots w[f, X, m_n] \omega \\ &= (X \circ W[f, X, m_1]) \dots (X \circ W[f, X, m_n]) \omega \end{aligned}$$

From the equation (6.1.9), it follows that the operation ω defined by the equation (6.1.7) on the set of coordinates is defined properly. \square

THEOREM 6.1.13. *There exists the representation of Ω_1 -algebra A_1 in Ω_2 -algebra $W[f, X]$.*

PROOF. Let $a \in A_1$. Then for any $m \in J[f, X]$, we assume

$$(6.1.10) \quad f(a)(W[f, X, m]) = W[f, X, f(a)(m)]$$

According to the remark 6.1.11,

$$(6.1.11) \quad X \circ (f(a)(W[f, X, m])) = X \circ W[f, X, f(a)(m)] = w[f, X, f(a)(m)]$$

follows from the equation (6.1.10). According to rule 6.1.6.3, from the equation (6.1.11), it follows that

$$(6.1.12) \quad X \circ (f(a)(W[f, X, m])) = f(a)(w[f, X, m]) = f(a)(X \circ W[f, X, m])$$

From the equation (6.1.12), it follows that the representation (6.1.10) of Ω_1 -algebra A_1 in Ω_2 -algebra $W[f, X]$ is defined properly. \square

THEOREM 6.1.14. *Let*

$$f : A_1 \dashrightarrow A_2$$

be representation of Ω_1 -algebra A_1 in Ω_2 -algebra A_2 . Let

$$g : A_1 \dashrightarrow B_2$$

be representation of Ω_1 -algebra A_1 in Ω_2 -algebra B_2 . For given sets $X \subset A_2$, $X' \subset B_2$, let map

$$R_1 : X \rightarrow X'$$

agree with the structure of representation f , i. e.

$$\begin{aligned} \omega \in \Omega_2(n) \quad x_1, \dots, x_n, x_1 \dots x_n \omega \in X, \quad R_1(x_1 \dots x_n \omega) \in X' \\ \Rightarrow R_1(x_1 \dots x_n \omega) = R_1(x_1) \dots R_1(x_n) \omega \\ x \in X, a \in A, R_1(f(a)(x)) \in X' \\ \Rightarrow R_1(f(a)(x)) = g(a)(R_1(x)) \end{aligned}$$

Consider the map of Ω_2 -words

$$w[f \rightarrow g, X, X', R_1] : w[f, X] \rightarrow w[g, X']$$

that satisfies conditions **6.1.10.1**, **6.1.10.2**, **6.1.10.3** and such that

$$x \in X \Rightarrow w[f \rightarrow g, X, X', R_1](x) = R_1(x)$$

There exists unique map

$$R : A_2 \rightarrow B_2$$

defined by rule

$$R(m) = w[f \rightarrow g, X, X', R_1](w[f, X, m])$$

which is reduced morphism of representations $J[f, X]$ and $J[g, X']$.

PROOF. We prove the theorem by induction over complexity of Ω_2 -word.

If $w[f, X, m] = m$, then $m \in X$. According to condition **6.1.10.1**,

$$R(m) = w[f \rightarrow g, X, X', R_1](w[f, X, m]) = w[f, X, R_1](m) = R_1(m)$$

Therefore, maps R and R_1 coincide on the set X , and the map R agrees with structure of representation f .

Let $\omega \in \Omega_2(n)$. Let the map R be defined for $m_1, \dots, m_n \in J[f, X]$. Let

$$w_1 = w[f, X, m_1] \quad \dots \quad w_n = w[f, X, m_n]$$

if $m = m_1 \dots m_n \omega$, then according to rule **6.1.6.2**,

$$w[f, X, m] = w_1 \dots w_n \omega$$

According to condition **6.1.10.2**,

$$\begin{aligned} R(m) &= w[f \rightarrow g, X, X', R_1](w[f, X, m]) = w[f \rightarrow g, X, X', R_1](w_1 \dots w_n \omega) \\ &= w[f \rightarrow g, X, X', R_1](w_1) \dots w[f \rightarrow g, X, X', R_1](w_n) \omega \\ &= R(m_1) \dots R(m_n) \omega \end{aligned}$$

Therefore, the map R is endomorphism of Ω_2 -algebra A_2 .

Let the map R be defined for $m_1 \in J[f, X]$, $w_1 = w[f, X, m_1]$. Let $a \in A_1$. If $m = f(a)(m_1)$, then according to rule **6.1.6.3**,

$$w[f, X, f(a)(m_1)] = f(a)(w_1)$$

According to condition **6.1.10.3**,

$$\begin{aligned} R(m) &= w[f \rightarrow g, X, X', R_1](w[f, X, m]) = w[f \rightarrow g, X, X', R_1](f(a)(w_1)) \\ &= f(a)(w[f \rightarrow g, X, X', R_1](w_1)) = f(a)(R(m_1)) \end{aligned}$$

From equation **(3.2.3)**, it follows that the map R is morphism of the representation f .

The statement that the endomorphism R is unique and therefore this endomorphism is defined properly follows from the following argument. Let $m \in A_2$ have different Ω_2 -words relative the set X , for instance

$$(6.1.13) \quad m = x_1 \dots x_n \omega = f(a)(x)$$

Because R is endomorphism of representation, then, from the equation (6.1.13), it follows that

$$(6.1.14) \quad R(m) = R(x_1 \dots x_n \omega) = R(x_1) \dots R(x_n) \omega = R(f(a)(x)) = f(a)(R(x))$$

From the equation (6.1.14), it follows that

$$(6.1.15) \quad R(m) = R(x_1) \dots R(x_n) \omega = f(a)(R(x))$$

From equations (6.1.13), (6.1.15), it follows that the equation (6.1.13) is preserved under the map. Therefore, the image of A_2 does not depend on the choice of coordinates. \square

REMARK 6.1.15. *The theorem 6.1.14 is the theorem of extension of map. The only statement we know about the set X is the statement that X is generating set of the representation f . However, between the elements of the set X there may be relationships generated by either operations of Ω_2 -algebra A_2 , or by transformation of representation f . Therefore, any map of set X , in general, cannot be extended to a reduced morphism of representation f .^{6.5} However, if the map R_1 is coordinated with the structure of representation on the set X , then we can construct an extension of this map and this extension is reduced morphism of representation f . \square*

DEFINITION 6.1.16. *Let X be the generating set of the representation*

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

of Ω_1 -algebra A_1 in Ω_2 -algebra A_2 . Let Y be the generating set of the representation

$$g : A_1 \longrightarrow B_2$$

of Ω_1 -algebra A_1 in Ω_2 -algebra B_2 . Let

$$R : A_2 \rightarrow B_2$$

*be the reduced morphism of the representation f . The set of coordinates $W[g, Y, R(X)]$ is called **coordinates of reduced morphism of representation**. \square*

From definitions 6.1.6, 6.1.16, it follows that

$$W[g, Y, R(X)] = (W[g, Y, R(x)], x \in X)$$

Let $m \in A_2$. If, in the word $w[f, X, m]$, we substitute image $w[g, Y, R(x)]$ of each $x \in X$, then, according to the theorem 6.1.14, we get Ω_2 -word $w[g, Y, R(m)]$. The definition 6.1.17 follows from this statement.

DEFINITION 6.1.17. *Let X be the generating set of the representation*

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

of Ω_1 -algebra A_1 in Ω_2 -algebra A_2 . Let Y be the generating set of the representation

$$g : A_1 \longrightarrow B_2$$

^{6.5}In the theorem 6.2.10, requirements to generating set are more stringent. Therefore, the theorem 6.2.10 says about extension of arbitrary map. A more detailed analysis is given in the remark 6.2.12.

of Ω_1 -algebra A_1 in Ω_2 -algebra B_2 . Let R

$$R : A_2 \rightarrow B_2$$

be the reduced morphism of the representation f . Let $m \in A_2$. We define **superposition of coordinates** of the reduced morphism R of the representation f and A_2 -number m as coordinates defined according to rule

$$(6.1.16) \quad W[g, Y, R(X)] \circ W[f, X, m] = W[g, Y, R(m)]$$

We define superposition of coordinates of the reduced morphism R of the representation f and the set $B \subseteq A_2$ according to rule

$$(6.1.17) \quad W[g, Y, R(X)] \circ W[f, X, B] = (W[g, Y, R(X)] \circ W[f, X, m], m \in B) \\ W[g, Y, R(X)] \circ w[f, X, B] = w[g, Y, R(X)] \circ W[f, X, B] = w[g, Y, R(B)]$$

□

THEOREM 6.1.18. Let X be the generating set of the representation

$$f : A_1 \dashrightarrow A_2$$

of Ω_1 -algebra A_1 in Ω_2 -algebra A_2 . Let Y be the generating set of the representation

$$g : A_1 \dashrightarrow B_2$$

of Ω_1 -algebra A_1 in Ω_2 -algebra B_2 . Reduced morphism of representation

$$R : A_2 \rightarrow B_2$$

generates the map of coordinates of representation

$$(6.1.18) \quad W[f \rightarrow g, X, Y, R] : W[f, X] \rightarrow W[g, Y]$$

such that

$$(6.1.19) \quad W[f, X, m] \rightarrow W[f \rightarrow g, X, Y, R] \circ W[f, X, m] = W[g, Y, R(m)]$$

PROOF. According to the remark 6.1.11, we consider equations (6.1.16), (6.1.18) relative to given generating sets X, Y . The word

$$(6.1.20) \quad X \circ W[f, X, m] = w[f, X, m]$$

corresponds to coordinates $W[f, X, m]$; the word

$$(6.1.21) \quad Y \circ W[g, Y, R(m)] = w[g, Y, R(m)]$$

corresponds to coordinates $W[g, Y, R(m)]$. Therefore, in order to prove the theorem, it is sufficient to show that the map $W[f, X, R]$ corresponds to map $w[f, X, R]$. We prove this statement by induction over complexity of Ω_2 -word.

If $m \in X$, $m' = R(m)$, then, according to equations (6.1.20), (6.1.21), maps $W[f, X, R]$ and $w[f, X, R]$ are coordinated.

Let for $m_1, \dots, m_n \in X$ maps $W[f, X, R]$ and $w[f, X, R]$ be coordinated. Let $\omega \in \Omega_2(n)$. According to the theorem 6.1.12

$$(6.1.22) \quad W[f, X, m_1 \dots m_n \omega] = W[f, X, m_1] \dots W[f, X, m_n] \omega$$

Because R is endomorphism of Ω_2 -algebra A_2 , then from the equation (6.1.22), it follows that

$$(6.1.23) \quad W[f, X, R \circ (m_1 \dots m_n \omega)] = W[f, X, (R \circ m_1) \dots (R \circ m_n) \omega] \\ = W[f, X, R \circ m_1] \dots W[f, X, R \circ m_n] \omega$$

From equations (6.1.22), (6.1.23) and the statement of induction, it follows that the maps $W[f, X, R]$ and $w[f, X, R]$ are coordinated for $m = m_1 \dots m_n \omega$.

Let for $m_1 \in A_2$ maps $W[f, X, R]$ and $w[f, X, R]$ are coordinated. Let $a \in A_1$. According to the theorem 6.1.13

$$(6.1.24) \quad W[f, X, f(a)(m_1)] = f(a)(W[f, X, m_1])$$

Because R is endomorphism of representation f , then, from the equation (6.1.24), it follows that

$$(6.1.25) \quad W[f, X, R \circ f(a)(m_1)] = W[f, X, f(a)(R \circ m_1)] = f(a)(W[f, X, R \circ m_1])$$

From equations (6.1.24), (6.1.25) and the statement of induction, it follows that maps $W[f, X, R]$ and $w[f, X, R]$ are coordinated for $m = f(a)(m_1)$. \square

COROLLARY 6.1.19. *Let X be the generating set of the representation f . Let R be the endomorphism of the representation f . The map $W[f, X, R]$ is endomorphism of representation of Ω_1 -algebra A_1 in Ω_2 -algebra $W[f, X]$.* \square

Hereinafter we will identify map $W[f, X, R]$ and the set of coordinates $W[f, X, R \circ X]$.

THEOREM 6.1.20. *Let X be the generating set of the representation f . Let R be the endomorphism of the representation f . Let $Y \subset A_2$. Then*

$$(6.1.26) \quad W[f, X, R(X)] \circ W[f, X, Y] = W[f, X, R(Y)]$$

PROOF. The equation (6.1.26) follows from the equation

$$R \circ Y = (R \circ m, m \in Y)$$

as well from equations (6.1.16), (6.1.17). \square

THEOREM 6.1.21. *Let X be the generating set of the representation f . Let R, S be the endomorphisms of the representation f . Then*

$$(6.1.27) \quad W[f, X, R] \circ W[f, X, S] = W[f, X, R \circ S]$$

PROOF. The equation (6.1.27) follows from the equation (6.1.26), if we assume $Y = S \circ X$. \square

The concept of superposition of coordinates is very simple and resembles a kind of Turing machine. If element $m \in A_2$ has form either

$$m = m_1 \dots m_n \omega$$

or

$$m = f(a)(m_1)$$

then we are looking for coordinates of elements m_i to substitute them in an appropriate expression. As soon as an element $m \in A_2$ belongs to the generating set of Ω_2 -algebra A_2 , we choose coordinates of the corresponding element of the second factor. Therefore, we require that the second factor in the superposition has been the set of coordinates of the image of the generating set X .

The following forms of writing an image of the set Y under endomorphism R are equivalent.

$$(6.1.28) \quad R \circ Y = (R(X)) \circ W[f, X, Y] = (X \circ W[f, X, R]) \circ W[f, X, Y]$$

From equations (6.1.26), (6.1.28), it follows that

$$(6.1.29) \quad X \circ (W[f, X, R] \circ W[f, X, Y]) = (X \circ W[f, X, R]) \circ W[f, X, Y]$$

The equation (6.1.29) is associative law for composition and allows us to write expression

$$X \circ W[f, X, R] \circ W[f, X, Y]$$

without brackets.

DEFINITION 6.1.22. Let $X \subset A_2$ be generating set of representation

$$f : A_1 \dashrightarrow A_2$$

Let the map

$$H : A_2 \rightarrow A_2$$

be endomorphism of the representation f . Let the set $X' = H \circ X$ be the image of the set X under the map H . Endomorphism H of representation f is called **regular** on the generating set X , if the set X' is the generating set of representation f . Otherwise, endomorphism H of representation f is called **singular** on the generating set X . \square

DEFINITION 6.1.23. Endomorphism of representation f is called **regular**, if it is regular on every generating set. Otherwise, endomorphism H of representation f is called **singular**. \square

THEOREM 6.1.24. Automorphism R of representation

$$f : A_1 \dashrightarrow A_2$$

is regular endomorphism.

PROOF. Let X be generating set of representation f . Let $X' = R(X)$.

According to theorem 6.1.10 endomorphism R forms the map of Ω_2 -words $w[f \rightarrow g, X, R]$.

Let $m' \in A_2$. Since R is automorphism, then there exists $m \in A_2$, $R \circ m = m'$. According to definition 6.1.6, $w[f, X, m]$ is Ω_2 -word, representing A_2 relative to generating set X . According to theorem 6.1.10, $w[f, X', m']$ is Ω_2 -word, representing of m' relative to generating set X'

$$w[f, X', m'] = w[f \rightarrow g, X, R](w[f, X, m])$$

Therefore, X' is generating set of representation f . According to definition 6.1.23, automorphism R is regular. \square

6.2. Basis of representation

DEFINITION 6.2.1. Let

$$f : A_1 \dashrightarrow A_2$$

be representation of Ω_1 -algebra A_1 in Ω_2 -algebra A_2 and

$$\text{Gen}[f] = \{X \subseteq A_2 : J[f, X] = A_2\}$$

If, for the set $X \subset A_2$, it is true that $X \in \text{Gen}[f]$, then for any set Y , $X \subset Y \subset A_2$, also it is true that $Y \in \text{Gen}[f]$. If there exists minimal set $X \in \text{Gen}[f]$, then the set X is called **quasibasis of representation** f . \square

THEOREM 6.2.2. If the set X is the quasibasis of the representation f , then, for any $m \in X$, the set $X \setminus \{m\}$ is not generating set of the representation f .

PROOF. Let X be quasibasis of the representation f . Assume that for some $m \in X$ there exist Ω_2 -word

$$w = w[f, X \setminus \{m\}, m]$$

Consider A_2 -number m' such that it has Ω_2 -word $w' = w[f, X, m']$ that depends on m . According to the definition 6.1.6, any occurrence of A_2 -number m into Ω_2 -word w' can be substituted by the Ω_2 -word w . Therefore, the Ω_2 -word w' does not depend on m , and the set $X \setminus \{m\}$ is generating set of representation f . Therefore, X is not quasibasis of representation f . \square

REMARK 6.2.3. *The proof of the theorem 6.2.2 gives us effective method for constructing the quasibasis of the representation f . Choosing an arbitrary generating set, step by step, we remove from set those elements which have coordinates relative to other elements of the set. If the generating set of the representation is infinite, then this construction may not have the last step. If the representation has finite generating set, then we need a finite number of steps to construct a quasibasis of this representation.* \square

We introduced Ω_2 -word of $x \in A_2$ relative generating set X in the definition 6.1.6. From the theorem 6.2.2, it follows that if the generating set X is not an quasibasis, then a choice of Ω_2 -word relative generating set X is ambiguous. However, even if the generating set X is an quasibasis, then a representation of $m \in A_2$ in form of Ω_2 -word is ambiguous.

REMARK 6.2.4. *There are three reasons of ambiguity in notation of Ω_2 -word.*

6.2.4.1: *In Ω_i -algebra A_i , $i = 1, 2$, equalities may be defined. For instance, if e is unit of multiplicative group A_i , then the equality*

$$ae = a$$

is true for any $a \in A_i$.

6.2.4.2: *Ambiguity of choice of Ω_2 -word may be associated with properties of representation. For instance, if m_1, \dots, m_n are Ω_2 -words, $\omega \in \Omega_2(n)$ and $a \in A_1$, then^{6.6}*

$$(6.2.1) \quad f(a)(m_1 \dots m_n \omega) = (f(a)(m_1)) \dots (f(a)(m_n)) \omega$$

At the same time, if ω is operation of Ω_1 -algebra A_1 and operation of Ω_2 -algebra A_2 , then we require that Ω_2 -words $f(a_1 \dots a_n \omega)(x)$ and $(f(a_1)(x)) \dots (f(a_n)(x)) \omega$ describe the same element of Ω_2 -algebra A_2 .^{6.7}

$$(6.2.2) \quad f(a_1 \dots a_n \omega)(x) = (f(a_1)(x)) \dots (f(a_n)(x)) \omega$$

6.2.4.3: *Equalities like (6.2.1), (6.2.2) persist under morphism of representation. Therefore we can ignore this form of ambiguity of Ω_2 -word. However, a fundamentally different form of ambiguity is possible. We can see an example of such ambiguity in theorems 9.3.15, 9.3.16.*

^{6.6} For instance, let $\{e_1, e_2\}$ be the basis of vector space over field k . The equation (6.2.1) has the form of distributive law

$$a(b^1 e_1 + b^2 e_2) = (ab^1) e_1 + (ab^2) e_2$$

^{6.7} For vector space, this requirement has the form of distributive law

$$(a + b) e_1 = a e_1 + b e_1$$

So we see that we can define different equivalence relations on the set of Ω_2 -words. ^{6.8}
 Our goal is to find a maximum equivalence on the set of Ω_2 -words which persist under morphism of representation.

A similar remark concerns the map $W[f, X, m]$ defined in the remark ^{6.1.11}. ^{6.9} □

THEOREM 6.2.5. Let X be quasibasis of the representation

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

Consider equivalence

$$\lambda[f, X] \subseteq w[f, X] \times w[f, X]$$

which is generated exclusively by the following statements.

6.2.5.1: If in Ω_2 -algebra A_2 there is an equality

$$w_1[f, X, m] = w_2[f, X, m]$$

defining structure of Ω_2 -algebra, then

$$(w_1[f, X, m], w_2[f, X, m]) \in \lambda[f, X]$$

6.2.5.2: If in Ω_1 -algebra A_1 there is an equality

$$w_1[f, X, m] = w_2[f, X, m]$$

defining structure of Ω_1 -algebra, then

$$(f(w_1)(w[f, X, m]), f(w_2)(w[f, X, m])) \in \lambda[f, X]$$

6.2.5.3: For any operation $\omega \in \Omega_1(n)$,

$$(f(a_{11} \dots a_{1n} \omega)(a_2), f(a_{11}) \dots f(a_{1n}) \omega)(a_2)) \in \lambda[f, X]$$

6.2.5.4: For any operation $\omega \in \Omega_2(n)$,

$$(f(a_1)(a_{21} \dots a_{2n} \omega), f(a_1)(a_{21}) \dots f(a_1)(a_{2n}) \omega) \in \lambda[f, X]$$

^{6.8} Evidently each of the equalities (6.2.1), (6.2.2) generates some equivalence relation.

^{6.9} If vector space has finite basis, then we represent the basis as matrix

$$\bar{e} = \begin{pmatrix} e_1 & \dots & e_n \end{pmatrix}$$

We present the map $W[f, \bar{e}](v)$ as matrix

$$W[f, \bar{e}, v] = \begin{pmatrix} v^1 \\ \dots \\ v^n \end{pmatrix}$$

Then

$$W[f, \bar{e}, v](\bar{e}') = W[f, \bar{e}, v] \begin{pmatrix} e'_1 & \dots & e'_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v^1 \\ \dots \\ v^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e'_1 & \dots & e'_n \end{pmatrix}$$

has form of matrix product.

6.2.5.5: Let $\omega \in \Omega_1(n) \cap \Omega_2(n)$. If the representation f satisfies equality^{6.10}

$$f(a_{11} \dots a_{1n} \omega)(a_2) = (f(a_{11})(a_2)) \dots (f(a_{1n})(a_2)) \omega$$

then we can assume that the following equality is true

$$(f(a_{11} \dots a_{1n} \omega)(a_2), (f(a_{11})(a_2)) \dots (f(a_{1n})(a_2)) \omega) \in \lambda[f, X]$$

PROOF. The theorem is true because considered equalities are preserved under homomorphisms of universal algebras A_1 and A_2 . \square

DEFINITION 6.2.6. Quasibasis \bar{e} of the representation f such that

$$\rho[f, \bar{e}] = \lambda[f, \bar{e}]$$

is called **basis of representation** f . \square

REMARK 6.2.7. As noted by Paul Cohn in [14], p. 82, 83, the representation may have inequivalent bases. For instance, the cyclic group of order six has bases $\{a\}$ and $\{a^2, a^3\}$ which we cannot map one into another by endomorphism of the representation. \square

REMARK 6.2.8. We write a basis also in following form

$$\bar{e} = (e, e \in \bar{e})$$

If basis is finite, then we also use notation

$$\bar{e} = (e_i, i \in I) = (e_1, \dots, e_n)$$

\square

THEOREM 6.2.9. Automorphism of the representation f maps a basis of the representation f into basis.

PROOF. Let the map R be automorphism of the representation f . Let the set \bar{e} be a basis of the representation f . Let^{6.11} $\bar{e}' = R \circ \bar{e}$. Assume that the set \bar{e}' is not basis. According to the theorem 6.2.2 there exists such $e' \in \bar{e}'$ that $\bar{e}' \setminus \{e'\}$ is generating set of the representation f . According to the theorem 3.5.5, the map R^{-1} is automorphism of the representation f . According to the theorem 6.1.24 and definition 6.1.23, the set $\bar{e} \setminus \{e\}$ is generating set of the representation f . The contradiction completes the proof of the theorem. \square

THEOREM 6.2.10. Let \bar{e} be the basis of the representation f . Let

$$R_1 : \bar{e} \rightarrow \bar{e}'$$

be arbitrary map of the set X . Consider the map of Ω_2 -words

$$w[f \rightarrow g, \bar{e}, \bar{e}', R_1] : w[f, \bar{e}] \rightarrow w[g, \bar{e}']$$

^{6.10} Consider a representation of commutative ring D in D -algebra A . We will use notation

$$f(a)(v) = av$$

The operations of addition and multiplication are defined in both algebras. However the equality

$$f(a+b)(v) = f(a)(v) + f(b)(v)$$

is true, and the equality

$$f(ab)(v) = f(a)(v)f(b)(v)$$

is wrong.

^{6.11} According to definitions 5.1.3, 6.4.1, we will use notation $R(\bar{e}) = R \circ \bar{e}$.

that satisfies conditions 6.1.10.1, 6.1.10.2, 6.1.10.3 and such that

$$e \in \bar{e} \Rightarrow w[f \rightarrow g, \bar{e}, \bar{e}', R_1](e) = R_1(e)$$

There exists unique endomorphism of representation f ^{6.12}

$$r_2 : A_2 \rightarrow A_2$$

defined by rule

$$R(m) = w[f \rightarrow g, \bar{e}, \bar{e}', R_1](w[f, \bar{e}, m])$$

PROOF. The statement of theorem is corollary theorems 6.1.10, 6.1.14. \square

COROLLARY 6.2.11. Let \bar{e}, \bar{e}' be the bases of the representation f . Let R be the automorphism of the representation f such that $\bar{e}' = R \circ \bar{e}$. Automorphism R is uniquely defined. \square

REMARK 6.2.12. The theorem 6.2.10, as well as the theorem 6.1.14, is the theorem of extension of map. However in this theorem, \bar{e} is not arbitrary generating set of the representation, but basis. According to remark 6.2.3, we cannot determine coordinates of any element of basis through the remaining elements of the same basis. Therefore, we do not need to coordinate the map of the basis with representation. \square

THEOREM 6.2.13. The set of coordinates $W[f, \bar{e}, \bar{e}]$ corresponds to identity transformation

$$W[f, \bar{e}, E] = W[f, \bar{e}, \bar{e}]$$

PROOF. The statement of the theorem follows from the equation

$$m = \bar{e} \circ W[f, \bar{e}, m] = \bar{e} \circ W[f, \bar{e}, \bar{e}] \circ W[f, \bar{e}, m]$$

\square

THEOREM 6.2.14. Let $W[f, \bar{e}, R \circ \bar{e}]$ be the set of coordinates of automorphism R . There exists set of coordinates $W[f, R \circ \bar{e}, \bar{e}]$ corresponding to automorphism R^{-1} . The set of coordinates $W[f, R \circ \bar{e}, \bar{e}]$ satisfies to equation

$$(6.2.3) \quad \begin{aligned} W[f, \bar{e}, R \circ \bar{e}] \circ W[f, R \circ \bar{e}, \bar{e}] &= W[f, \bar{e}, \bar{e}] \\ W[f \rightarrow f, \bar{e}, \bar{e}, R^{-1}] &= W[f \rightarrow f, \bar{e}, \bar{e}, R]^{-1} = W[f, R \circ \bar{e}, \bar{e}] \end{aligned}$$

PROOF. Since R is automorphism of the representation f , then, according to the theorem 6.2.9, the set $R \circ \bar{e}$ is a basis of the representation f . Therefore, there exists the set of coordinates $W[f, R \circ \bar{e}, \bar{e}]$. The equation (6.2.3) follows from the chain of equations

$$\begin{aligned} W[f, \bar{e}, R \circ \bar{e}] \circ W[f, R \circ \bar{e}, \bar{e}] &= W[f, \bar{e}, R \circ \bar{e}] \circ W[f, \bar{e}, R^{-1} \circ \bar{e}] \\ &= W[f, \bar{e}, R \circ R^{-1} \circ \bar{e}] = W[f, \bar{e}, \bar{e}] \end{aligned}$$

\square

REMARK 6.2.15. In Ω_2 -algebra A_2 there is no universal algorithm for determining the set of coordinates $W[f, R \circ \bar{e}, \bar{e}]$ for given set $W[f, \bar{e}, R \circ \bar{e}]$. ^{6.13} We

^{6.12}This statement is similar to the theorem [2]-4.1, p. 135.

^{6.13}In vector space, the matrix of numbers corresponds to linear transformation. Accordingly, the inverse matrix corresponds to inverse transformation.

assume that in the theorem 6.2.14 this algorithm is given implicitly. It is evident also that the set of Ω_2 -words

$$(6.2.4) \quad \bar{e} \circ W[f, R \circ \bar{e}, \bar{e}] \circ W[f, \bar{e}, R \circ \bar{e}]$$

in general, does not coincide with the set of Ω_2 -words

$$(6.2.5) \quad \bar{e} \circ W[f, \bar{e}, \bar{e}]$$

The theorem 6.2.14 states that sets of Ω_2 -words (6.2.4) and (6.2.5) coincide up to equivalence generated by the representation f . \square

THEOREM 6.2.16. *The group of automorphisms $GA(f)$ of effective representation f in Ω_2 -algebra A_2 generates effective left-side representation in Ω_2 -algebra A_2 .*

PROOF. From the corollary 6.2.11, it follows that if automorphism R maps a basis \bar{e} into a basis \bar{e}' , then the set of coordinates $W[f, \bar{e}, \bar{e}']$ uniquely determines an automorphism R . From the theorem 6.1.18, it follows that the set of coordinates $W[f, \bar{e}, \bar{e}']$ determines the map of coordinates relative to the basis \bar{e} under automorphism of the representation f . From the equation (6.1.28), it follows that automorphism R acts from the left on elements of Ω_2 -algebra A_2 . From the equation (6.1.27), it follows that the representation of group is left-side representation. According to the theorem 6.2.13, the set of coordinates $W[f, \bar{e}, \bar{e}]$ corresponds to identity transformation. From the theorem 6.2.14, it follows that the set of coordinates $W[f, R \circ \bar{e}, \bar{e}]$ corresponds to transformation, inverse to transformation $W[f, \bar{e}, R \circ \bar{e}]$. \square

6.3. Free Representation

In the section 3.1, we considered the definition 3.1.4 of free representation. However we may consider another definition which is similar to the definition of free module.

DEFINITION 6.3.1. *The representation*

$$f : A_1 \xrightarrow{*} A_2$$

is called free representation if this representation has a basis. \square

THEOREM 6.3.2. *Let*

$$f : A_1 \xrightarrow{*} A_2$$

be free representation according to the definition 6.3.1. Then the representation f is free according to the definition 3.1.4.

PROOF. Let \bar{e} be basis of representation f and $m \in \bar{e}$. Let there exist A_1 -numbers a_1, b_1 such that $f(a_1) = f(b_1)$. According to the assumption, $f(a_1)(m) = f(b_1)(m)$. However, if $a_1 \neq b_1$, then $f(a_1)(m)$ and $f(b_1)(m)$ are different Ω_2 -words. Therefore, \bar{e} is not a basis. From this contradiction, it follows that $a_1 = b_1$. Therefore, the representation f is free according to the definition 3.1.4. \square

THEOREM 6.3.3. *Let*

$$f : A_1 \xrightarrow{*} A_2$$

be free representation according to the definition 3.1.4. Then the representation f is free according to the definition 6.3.1.

QUESTION 6.3.4. *It is very important to find a proof of the theorem 6.3.3 or to find an example when this theorem is wrong. We will see in the chapter 7 how is important a free presentation defined in the definition 6.3.1. Because in the future I will assume that a representation always has a basis, then within the framework of this book I can use the theorem 6.3.2.* \square

6.4. Basis Manifold of Representation

The set $\mathcal{B}[f]$ of bases of representation f is called **basis manifold** of representation f .

DEFINITION 6.4.1. *According to theorems 6.1.20, 6.2.9, automorphism R of the representation f generates transformation*

$$(6.4.1) \quad \begin{aligned} R : \bar{h} &\rightarrow R \circ \bar{h} \\ R \circ \bar{h} &= W[f, \bar{e}, R \circ \bar{e}] \circ \bar{h} \end{aligned}$$

*of the basis manifold of representation. This transformation is called **active**. According to the theorem 3.5.5, we defined left-side representation*

$$A(f) : GA(f) \longrightarrow \mathcal{B}[f]$$

*of group $GA(f)$ in basis manifold $\mathcal{B}[f]$. Representation $A(f)$ is called **active representation**. According to the corollary 6.2.11, this representation is single transitive.* \square

REMARK 6.4.2. *According to remark 6.2.3, it is possible that there exist bases of representation f such that there is no active transformation between them. Then we consider the orbit of selected basis as basis manifold. Therefore, it is possible that the representation f has different basis manifolds. We will assume that we have chosen a basis manifold.*

THEOREM 6.4.3. *There exists single transitive right-side representation*

$$P(f) : GA(f) \longrightarrow \mathcal{B}[f]$$

*of group $GA(f)$ in basis manifold $\mathcal{B}[f]$. Representation $P(f)$ is called **passive representation**.*

PROOF. Since $A(f)$ is single transitive left-side representation of group $GA(f)$, then single transitive right-side representation $P(f)$ is uniquely defined according to the theorem 5.5.9. \square

THEOREM 6.4.4. *Transformation of representation $P(f)$ is called **passive transformation of the basis manifold** of representation. We also use notation*

$$S(\bar{e}) = \bar{e} \circ S$$

to denote the image of basis \bar{e} under passive transformation s . Passive transformation of basis has form

$$(6.4.2) \quad \begin{aligned} S : \bar{h} &\rightarrow \bar{h} \circ S \\ \bar{h} \circ S &= \bar{h} \circ W[f, \bar{e}, \bar{e} \circ S] \end{aligned}$$

PROOF. According to the equality (6.4.1), active transformation acts from left on coordinates of basis. The equality (6.4.2) follows from theorems 5.5.8, 5.5.9, 5.5.11; according to these theorems, passive transformation acts from right on coordinates of basis. \square

THEOREM 6.4.5. *Passive transformation of the basis manifold is automorphism of representation $A(f)$.*

PROOF. The theorem follows from the theorem 5.5.11. \square

THEOREM 6.4.6. *Let S be passive transformation of the basis manifold of the representation f . Let \bar{e}_1 be the basis of the representation f , $\bar{e}_2 = \bar{e}_1 \circ S$. For basis \bar{e}_3 , let there exists an active transformation R such that $\bar{e}_3 = R \circ \bar{e}_1$. Let $\bar{e}_4 = R \circ \bar{e}_2$. Then $\bar{e}_4 = \bar{e}_3 \circ S$.*

PROOF. According to the equality (6.4.1), active transformation of coordinates of basis \bar{e}_3 has form

$$(6.4.3) \quad \bar{e}_4 = W[f, \bar{e}_1, \bar{e}_3] \circ \bar{e}_2 = W[f, \bar{e}_1, \bar{e}_3] \circ \bar{e}_1 \circ W[f, \bar{e}_1, \bar{e}_2]$$

Let $\bar{e}_5 = \bar{e}_3 \circ S$. From the equality (6.4.2), it follows that

$$(6.4.4) \quad \bar{e}_5 = \bar{e}_3 \circ W[f, \bar{e}_1, \bar{e}_2] = W[f, \bar{e}_1, \bar{e}_3] \circ \bar{e}_1 \circ W[f, \bar{e}_1, \bar{e}_2]$$

From match of expressions in equalities (6.4.3), (6.4.4), it follows that $\bar{e}_4 = \bar{e}_5$. Therefore, the diagram

$$\begin{array}{ccc} \bar{e}_1 \in \mathcal{B}[f] & \xrightarrow{R} & \bar{e}_3 \in \mathcal{B}[f] \\ s \downarrow & & s \downarrow \\ \bar{e}_2 \in \mathcal{B}[f] & \xrightarrow{R} & \bar{e}_4 \in \mathcal{B}[f] \end{array}$$

is commutative. \square

6.5. Geometric Object of Representation of Universal Algebra

An active transformation changes a basis of the representation and Ω_2 -number uniformly and coordinates of Ω_2 -number relative basis do not change. A passive transformation changes only the basis and it leads to change of coordinates of Ω_2 -number relative to the basis.

THEOREM 6.5.1. *Let passive transformation $S \in GA(f)$ maps basis $\bar{e}_1 \in \mathcal{B}[f]$ into basis $\bar{e}_2 \in \mathcal{B}[f]$*

$$(6.5.1) \quad \bar{e}_2 = \bar{e}_1 \circ S = \bar{e}_1 \circ W[f, \bar{e}_1, \bar{e}_1 \circ S]$$

Let A_2 -number m has Ω_2 -word

$$(6.5.2) \quad m = \bar{e}_1 \circ W[f, \bar{e}_1, m]$$

relative to basis \bar{e}_1 and has Ω_2 -word

$$(6.5.3) \quad m = \bar{e}_2 \circ W[f, \bar{e}_2, m]$$

relative to basis \bar{e}_2 . Coordinate transformation

$$(6.5.4) \quad W[f, \bar{e}_2, m] = W[f, \bar{e}_1 \circ S, \bar{e}_1] \circ W[f, \bar{e}_1, m]$$

does not depend on A_2 -number m or basis \bar{e}_1 , but is defined only by coordinates of A_2 -number m relative to basis \bar{e}_1 .

PROOF. From (6.5.1) and (6.5.3), it follows that

$$(6.5.5) \quad \begin{aligned} \bar{e}_1 \circ W[f, \bar{e}_1, m] &= \bar{e}_2 \circ W[f, \bar{e}_2, m] = \bar{e}_1 \circ W[f, \bar{e}_1, \bar{e}_2] \circ W[f, \bar{e}_2, m] \\ &= \bar{e}_1 \circ W[f, \bar{e}_1, \bar{e}_1 \circ S] \circ W[f, \bar{e}_2, m] \end{aligned}$$

Comparing (6.5.2) and (6.5.5) we get

$$(6.5.6) \quad W[f, \bar{e}_1, m] = W[f, \bar{e}_1, \bar{e}_1 \circ S] \circ W[f, \bar{e}_2, m]$$

Since S is automorphism, then the equality (6.5.4) follows from (6.5.6) and the theorem 6.2.14. \square

THEOREM 6.5.2. *Coordinate transformations (6.5.4) form effective left-side representation of group $GA(f)$ which is called **coordinate representation** in Ω_2 -algebra.*

PROOF. According to corollary 6.1.19, the transformation (6.5.4) is the endomorphism of representation ^{6.14}

$$f : A_1 \longrightarrow W[f, \bar{e}_1]$$

Suppose we have two consecutive passive transformations S and T . Coordinate transformation

$$(6.5.7) \quad W[f, \bar{e}_2, m] = W[f, \bar{e}_1 \circ S, \bar{e}_1] \circ W[f, \bar{e}_1, m]$$

corresponds to passive transformation S . Coordinate transformation

$$(6.5.8) \quad W[f, \bar{e}_2, m] = W[f, \bar{e}_1 \circ T, \bar{e}_1] \circ W[f, \bar{e}_1, m]$$

corresponds to passive transformation T . According to the theorem 8.3.3, product of coordinate transformations (6.5.7) and (6.5.8) has form

$$\begin{aligned} W[f, \bar{e}_3, m] &= W[f, \bar{e}_1 \circ T, \bar{e}_1] \circ W[f, \bar{e}_1 \circ S, \bar{e}_1] \circ W[f, \bar{e}_1, m] \\ &= W[f, \bar{e}_1 \circ T \circ S, \bar{e}_1] \circ W[f, \bar{e}_1, m] \end{aligned}$$

and is coordinate transformation corresponding to passive transformation $T \circ S$. It proves that coordinate transformations form left-side representation of group $GA(f)$.

Suppose coordinate transformation does not change coordinates of selected basis. Then unit of group $GA(f)$ corresponds to it because representation is single transitive. Therefore, coordinate representation is effective. \square

Let f be representation of Ω_1 -algebra A_1 in Ω_2 -algebra A_2 . Let g be representation of Ω_1 -algebra A_1 in Ω_3 -algebra A_3 . Passive representation $P(g)$ is coordinated with passive representation $P(f)$, if there exists homomorphism h of group $GA(f)$ into group $GA(g)$. Consider diagram

$$\begin{array}{ccc} \text{End}(B[f]) & \xrightarrow{H} & \text{End}(B[g]) \\ P(f) \uparrow & \nearrow f' & \uparrow P(g) \\ GA(f) & \xrightarrow{h} & GA(g) \end{array}$$

^{6.14}This transformation does not generate an endomorphism of the representation f . Coordinates change because basis relative which we determinate coordinates changes. However, A_2 -number, coordinates of which we are considering, does not change.

Since maps $P(f), P(g)$ are isomorphisms of group, then map H is homomorphism of groups. Therefore, map f' is representation of group $GA(f)$ in basis manifold $\mathcal{B}(g)$. According to design, passive transformation $H(S)$ of basis manifold $\mathcal{B}(g)$ corresponds to passive transformation S of basis manifold $\mathcal{B}(f)$

$$(6.5.9) \quad \bar{e}_{g1} = \bar{e}_g \circ H(S)$$

Then coordinate transformation in representation g gets form

$$(6.5.10) \quad W[g, \bar{e}_{g1}, m] = W[g, \bar{e}_g \circ H(S), \bar{e}_g] \circ W[g, \bar{e}_g, m]$$

DEFINITION 6.5.3. *Orbit*

$$\begin{aligned} \mathcal{O}(f, g, \bar{e}_g, m) &= H(GA(f)) \circ W[g, \bar{e}_g, m] \\ &= (W[g, \bar{e}_g \circ H(S), \bar{e}_g] \circ W[g, \bar{e}_g, m], \bar{e}_f \circ S, S \in GA(f)) \end{aligned}$$

is called **geometric object in coordinate representation** defined in the representation f . For any basis $\bar{e}_{f1} = \bar{e}_f \circ S$ corresponding point (6.5.10) of orbit defines **coordinates of geometric object** relative basis \bar{e}_{f1} . \square

DEFINITION 6.5.4. *Orbit*

$$\mathcal{O}(f, g, m) = (W[g, \bar{e}_g \circ H(S), \bar{e}_g] \circ W[g, \bar{e}_g, m], \bar{e}_g \circ H(S), \bar{e}_f \circ S, S \in GA(f))$$

is called **geometric object** defined in the representation f . We also say that m is a **geometric object of type H** . For any basis $\bar{e}_{f1} = \bar{e}_f \circ S$ corresponding point (6.5.10) of orbit defines A_2 -number

$$m = \bar{e}_g \circ W[g, \bar{e}_g, m]$$

called **representative of geometric object** in the representation f . \square

Since a geometric object is an orbit of representation, we see that according to the theorem 5.3.7 the definition of the geometric object is a proper definition.

Definition 6.5.3 introduces a geometric object in coordinate space. We assume in definition 6.5.4 that we selected a basis of representation g . This allows using a representative of the geometric object instead of its coordinates.

THEOREM 6.5.5 (**invariance principle**). *Representative of geometric object does not depend on selection of basis \bar{e}_f .*

PROOF. To define representative of geometric object, we need to select basis \bar{e}_f of representation f , basis \bar{e}_g of representation g and coordinates of geometric object $W[g, \bar{e}_g, n]$. Corresponding representative of geometric object has form

$$n = \bar{e}_g \circ W[g, \bar{e}_g, n]$$

Suppose we map basis \bar{e}_f to basis \bar{e}_{f1} by passive transformation

$$\bar{e}_{f1} = \bar{e}_f \circ S$$

According building this forms passive transformation (6.5.9) and coordinate transformation (6.5.10). Corresponding representative of geometric object has form

$$\begin{aligned} n' &= \bar{e}_{g1} \circ W[g, \bar{e}_{g1}, n'] \\ &= \bar{e}_g \circ W[g, \bar{e}_g, \bar{e}_g \circ H(S)] \circ W[g, \bar{e}_g \circ H(S), \bar{e}_g] \circ W[g, \bar{e}_g, n] \\ &= \bar{e}_g \circ W[g, \bar{e}_g, n] = n \end{aligned}$$

Therefore representative of geometric object is invariant relative selection of basis. \square

THEOREM 6.5.6. *The set of geometric objects of type H is Ω_3 -algebra.*

PROOF. Let

$$m_i = \bar{e}_g \circ W[g, \bar{e}_g, m_i] \quad i = 1, \dots, n$$

For operation $\omega \in \Omega_3(n)$ we assume

$$(6.5.11) \quad m_1 \dots m_n \omega = \bar{e}_g \circ (W[g, \bar{e}_g, m_1] \dots W[g, \bar{e}_g, m_n] \omega)$$

Since for arbitrary endomorphism S of Ω_2 -algebra A_2 , the map $W[g, \bar{e}_g, \bar{e}_g \circ H(S)]$ is endomorphism of Ω_3 -algebra A_3 , then the definition (6.5.11) is correct. \square

THEOREM 6.5.7. *There exists the representation of Ω_1 -algebra A_1 in Ω_3 -algebra N of geometric objects of type H .*

PROOF. Let

$$m = \bar{e}_g \circ W[g, \bar{e}_g, m]$$

For $a \in A_1$, we assume

$$(6.5.12) \quad f(a)(m) = \bar{e}_g \circ f(a)(W[g, \bar{e}_g, m])$$

Since for arbitrary endomorphism S of Ω_2 -algebra A_2 , the map $W[g, \bar{e}_g, \bar{e}_g \circ H(S)]$ is endomorphism of representation g , then the definition (6.5.12) is correct. \square

Diagram of Representations of Universal Algebras

7.1. Diagram of Representations of Universal Algebras

From a comparison of theorems 6.1.4 and [14]-5.1, it follows that there is no rigid boundary between universal algebra and representation of universal algebra. This implies the possibility of a generalization of representation of universal algebra.

The simplest construction arises as follows. Let

$$f_{12} : A_1 \xrightarrow{*} A_2$$

be representation of Ω_1 -algebra A_1 in Ω_2 -algebra A_2 . If, instead of Ω_2 -algebra A_2 , we consider representation

$$f_{23} : A_2 \xrightarrow{*} A_3$$

of Ω_2 -algebra A_2 in Ω_3 -algebra A_3 , then we get a diagram of the following form

$$(7.1.1) \quad A_1 \xrightarrow{f_{12}} A_2 \xrightarrow{f_{23}} A_3$$

It is evident that, in the diagram (7.1.1), we assume that A_3 is representation

$$f_{34} : A_3 \xrightarrow{*} A_4$$

We can make a chain of representations of universal algebras as long as we wish. Thus we obtain the following definition.

DEFINITION 7.1.1. Consider set of Ω_k -algebras A_k , $k = 1, \dots, n$. Let $A = (A_1, \dots, A_n)$. Let $f = (f_{12}, \dots, f_{n-1n})$. Set of representations f_{kk+1} , $k = 1, \dots, n$, of Ω_k -algebra A_k in Ω_{k+1} -algebra A_{k+1} is called **tower** (f, A) **of representations of Ω -algebras**. \square


We can represent tower of representations (f, A) using the following diagram

$$A_1 \xrightarrow{f_{12}} A_2 \xrightarrow{f_{23}} \dots \xrightarrow{f_{n-1n}} A_n$$


When we consider the tower of representations, we again consider that A_2 or A_3 are representations of universal algebras or towers of representations. In this case, the diagram (7.1.1) gets form

$$\begin{array}{ccccc} A_1 & \xrightarrow{f_{12}} & A_2 & \xrightarrow{f_{23}} & A_3 \\ & & \uparrow f_{42} & & \uparrow f_{53} \\ & & A_4 & & A_5 \\ & & \uparrow f_{64} & & \\ & & A_6 & & \end{array}$$


or



We also assume that some algebras or maps on the diagram coincide. Thus, we say that diagrams



and



are equivalent.

DEFINITION 7.1.2. Diagram (f, A) of representations of universal algebras is oriented graph such that

7.1.2.1: the vertex of A_k , $k = 1, \dots, n$, is Ω_k -algebra;

7.1.2.2: the edge f_{ki} is representation of Ω_k -algebra A_k in Ω_i -algebra A_i ;

We require that this graph is connected graph and does not have loops. Let $A_{[0]}$ be set of initial vertices of the graph. Let $A_{[k]}$ be set of vertices of the graph for which the maximum path from the initial vertices is k . \square

REMARK 7.1.3. Since different vertices of the graph can be the same algebra, then we denote $A = (A_{(1)} \dots A_{(n)})$ the set of universal algebras which are distinct. From the equality

$$A = (A_{(1)} \dots A_{(n)}) = (A_1 \dots A_n)$$

it follows that, for any index (i) , there exists at least one index i such that $A_{(i)} = A_i$. If there are two sets of sets $A = (A_{(1)} \dots A_{(n)})$, $B = (B_{(1)} \dots B_{(n)})$ and there is a map

$$h_{(i)} : A_{(i)} \rightarrow B_{(i)}$$

for an index (i) , then also there is a map

$$h_i : A_i \rightarrow B_i$$

for any index i such that $A_{(i)} = A_i$ and in this case $h_i = h_{(i)}$. \square

THEOREM 7.1.4 (induction over diagram of representations). Let the theorem \mathcal{T} be true for the set of universal algebras $A_{[0]}$ of diagram (f, A) of representations of universal algebras. Let the statement that the theorem \mathcal{T} is true for the set of universal algebras $A_{[k]}$ of diagram (f, A) of representations imply the

statement that the theorem \mathcal{T} is true for the set of universal algebras $A_{[k+1]}$ of diagram (f, A) of representations. Then the theorem \mathcal{T} is true for the set of universal algebras of diagram (f, A) of representations.

PROOF. The theorem follows from the principle of mathematical induction. \square

DEFINITION 7.1.5. Diagram (f, A) of representations of universal algebras is called **commutative** when diagram meets the following requirement. for each pair of representations

$$\begin{aligned} f_{ik} &: A_i \longrightarrow A_k \\ f_{jk} &: A_j \longrightarrow A_k \end{aligned}$$

the following equality is true^{7.1}

$$(7.1.2) \quad f_{ik}(a_i)(f_{jk}(a_j)(a_k)) = f_{jk}(a_j)(f_{ik}(a_i)(a_k))$$

\square

THEOREM 7.1.6. Let

$$f_{ij} : A_i \longrightarrow A_j$$


be representation of Ω_i -algebra A_i in Ω_j -algebra A_j . Let

$$f_{jk} : A_j \longrightarrow A_k$$

be representation of Ω_j -algebra A_j in Ω_k -algebra A_k . We represent the fragment^{7.2}

$$A_i \xrightarrow{f_{ij}} A_j \xrightarrow{f_{jk}} A_k$$

of the diagram of representations using the diagram



The map

$$f_{ijk} : A_i \rightarrow \text{End}(\Omega_j, \text{End}(\Omega_k, A_k))$$

is defined by the equality

$$(7.1.4) \quad f_{ijk}(a_i)(f_{jk}(a_j)) = f_{jk}(f_{ij}(a_i)(a_j))$$

^{7.1} Metaphorically speaking, representations f_{ik} and f_{jk} are transparent to each other.

^{7.2} The theorem 7.1.6 states that transformations in diagram of representations are coordinated.

where $a_i \in A_i$, $a_j \in A_j$. If the representation f_{jk} is effective and the representation f_{ij} is free, then the map f_{ijk} is free representation

$$f_{ijk} : A_i \longrightarrow \text{End}(\Omega_k, A_k)$$

of Ω_i -algebra A_i in Ω_j -algebra $\text{End}(\Omega_k, A_k)$.

PROOF.

LEMMA 7.1.7. *The map f_{ijk} is injection.*

PROOF. Let $(a_i, b_i) \in \ker f_{ijk}$. Then

$$(7.1.5) \quad \begin{aligned} f_{jk}(f_{ij}(a_i)(a_j)) &= f_{ijk}(a_i)(f_{jk}(a_j)) = f_{ijk}(b_i)(f_{jk}(a_j)) \\ &= f_{jk}(f_{ij}(b_i)(a_j)) \end{aligned}$$

If the representation f_{jk} is effective, then the equality

$$(7.1.6) \quad f_{ij}(a_i)(a_j) = f_{ij}(b_i)(a_j)$$

follows from the definition 3.1.2 and from the equality (7.1.5) for any $a_j \in A_j$. The statement $a_i = b_i$ follows from the definition 3.1.4. \odot

LEMMA 7.1.8. *There is the structure of Ω_i -algebra on the set $\text{End}(\Omega_j, \text{End}(\Omega_k, A_k))$.*

PROOF. Let $\omega \in \Omega_i$. Let $a_1, \dots, a_m \in A_i$. We define operation ω on the set $\text{End}(\Omega_j, \text{End}(\Omega_k, A_k))$ using the following equality

$$(7.1.7) \quad f_{ijk}(a_1) \dots f_{ijk}(a_m) \omega = f_{ijk}(a_1 \dots a_m \omega)$$

According to the lemma 7.1.7, the equality (7.1.7) properly defines operation ω . \odot

COROLLARY 7.1.9. *The map f_{ijk} is homomorphism of Ω_i -algebra.* \odot

LEMMA 7.1.10. *The map $f_{ijk}(a)$ is homomorphism of Ω_j -algebra.*

PROOF. Let $b_1, \dots, b_m \in A_j$. Then the equality

$$(7.1.8) \quad f_{ijk}(a)(f_{jk}(b_1)) \dots f_{ijk}(a)(f_{jk}(b_m)) \omega = f_{jk}(f_{ij}(a)(b_1)) \dots f_{jk}(f_{ij}(a)(b_m)) \omega$$

follows from the equality (7.1.4). Since maps $f_{ij}(a)$, f_{jk} are homomorphisms of Ω_j -algebra, then the equality

$$(7.1.9) \quad \begin{aligned} &f_{ijk}(a)(f_{jk}(b_1)) \dots f_{ijk}(a)(f_{jk}(b_m)) \omega \\ &= f_{jk}(f_{ij}(a)(b_1)) \dots f_{jk}(f_{ij}(a)(b_m)) \omega \\ &= f_{jk}(f_{ij}(a)(b_1 \dots b_m \omega)) \end{aligned}$$

follows from the equality (7.1.8). The equality

$$(7.1.10) \quad f_{ijk}(a)(f_{jk}(b_1)) \dots f_{ijk}(a)(f_{jk}(b_m)) \omega = f_{ijk}(a)(f_{jk}(b_1 \dots b_m \omega))$$

follows from the equalities (7.1.4), (7.1.9). Since the map f_{jk} is homomorphism of Ω_2 -algebra, then the equality

$$(7.1.11) \quad f_{ijk}(a)(f_{jk}(b_1)) \dots f_{ijk}(a)(f_{jk}(b_m)) \omega = f_{ijk}(a)(f_{jk}(b_1)) \dots f_{ijk}(b_m) \omega$$

follows from the equality (7.1.10). \odot

The theorem follows from corollary 7.1.9 and from the lemma 7.1.10. \square

THEOREM 7.1.11. *The map f_{jk} is reduced morphism of representations from f_{ij} into f_{ijk} .*

PROOF. Consider diagram (7.1.3) in more detail.

$$(7.1.12) \quad \begin{array}{ccc} A_j & \xrightarrow{f_{jk}} & \text{End}(\Omega_k, A_k) \\ & \swarrow \text{---}^* \text{---} & \nearrow \text{---}^* \text{---} \\ & A_i & \end{array}$$

The statement of theorem follows from the equality (7.1.4) and from the definition 3.4.2. \square

THEOREM 7.1.12. *Let*

$$f_{ij} : A_i \text{---}^* \text{---} A_j$$

be representation of Ω_i -algebra A_i in Ω_j -algebra A_j . Let

$$f_{jk} : A_j \text{---}^* \text{---} A_k$$

be representation of Ω_j -algebra A_j in Ω_k -algebra A_k . Then there exists representation

$$f_{ij,k} : A_i \times A_j \text{---}^* \text{---} A_k$$

of the set^{7.3} $A_i \times A_j$ in Ω_k -algebra A_k .

PROOF. We represent the fragment

$$A_i \text{---}^* \text{---} A_j \text{---}^* \text{---} A_k$$

of the diagram of representations using the diagram

$$(7.1.13) \quad \begin{array}{ccc} & A_i \times A_j & \\ & \parallel \text{---} f_{ij,k} \text{---} & \\ A_k & \xrightarrow{\quad} & A_k \\ & \text{---} f_{jk}(f_{ij}(a_i)(a_j)) \text{---} & \\ & \text{---} f_{jk} \text{---} & \\ & A_j & \\ & \xrightarrow{\quad f_{ij}(a_i) \quad} & A_j \\ & \parallel \text{---} f_{ij} \text{---} & \\ & A_i & \end{array}$$

From the diagram (7.1.13), it follows that the map $f_{ij,k}$ is defined by the equality

$$f_{ij,k}(a_i, a_j) = f_{jk}(f_{ij}(a_i)(a_j))$$

\square

^{7.3} Since Ω_i -algebra A_i and Ω_j -algebra A_j have different set of operations, we cannot define the structure of universal algebra on the set $A_i \times A_j$.

7.2. Morphism of Diagram of Representations

DEFINITION 7.2.1. Let (f, A) be the diagram of representations where $A = (A_{(1)} \dots A_{(n)})$ is the set of universal algebras. Let (B, g) be the diagram of representations where $B = (B_{(1)} \dots B_{(n)})$ is the set of universal algebras. The set of maps $h = (h_{(1)} \dots h_{(n)})$

$$h_{(i)} : A_{(i)} \rightarrow B_{(i)}$$

is called **morphism from diagram of representations (f, A) into diagram of representations (B, g)** , if for any indexes $(i), (j)$, i, j such that $A_{(i)} = A_i$, $A_{(j)} = A_j$ and for any representation

$$f_{ji} : A_j \xrightarrow{*} A_i$$

the tuple of maps $(h_j \ h_i)$ is morphism of representations from f_{ji} into g_{ji} . \square

We will use notation

$$h : A \rightarrow B$$

if tuple of maps h is morphism from diagram of representations (f, A) into diagram of representations (B, g) .

When studying morphism of the representation of universal algebra, we very often assume that algebra generating representation is given. Therefore, we are not interested in the map of this algebra; this convention simplifies the structure of morphism. Such morphism of representation we call reduced morphism of representation.

We see a similar problem when we study morphism of diagram of representations. For each universal algebra from diagram of representations, there exists the set of algebras preceding this algebra in corresponding graph. We can assume that some of these algebras are given and we will not consider corresponding homomorphisms. Corresponding morphism of diagram of representations also is called reduced. However, because diagram of representations is complicated structure, we will not consider reduced morphism of diagram of representations.

For any representation f_{ij} , $i = 1, \dots, n$, $j = 1, \dots, n$, we have diagram

$$(7.2.1) \quad \begin{array}{ccc} & A_j & \xrightarrow{h_j} & B_j \\ & \downarrow f_{ij}(a_i) & & \downarrow g_{ij}(h_i(a_i)) \\ & A_j & \xrightarrow{h_j} & B_j \\ f_{ij} \nearrow & & & \nwarrow g_{ij} \\ A_i & \xrightarrow{h_i} & B_i & \end{array} \quad (1)$$

Equalities

$$(7.2.2) \quad h_j \circ f_{ij}(a_i) = g_{ij}(h_i(a_i)) \circ h_j$$

$$(7.2.3) \quad h_j(f_{ij}(a_i)(a_j)) = g_{ij}(h_i(a_i))(h_j(a_j))$$

express commutativity of diagram (1).

Let representations f_{ij} and f_{jk} of universal algebras be defined. Assuming diagram (7.2.1) for representations f_{ij} and f_{jk} we will get the following diagram

$$(7.2.4) \quad \begin{array}{ccc} A_k & \xrightarrow{h_k} & B_k \\ f_{jk}(f_{ij}(a_i)(a_j)) \swarrow & & \searrow g_{jk}(g_{ij}(h_i(a_i))(h_j(a_j))) \\ & A_k \xrightarrow{h_k} B_k & \\ f_{ijk}(a_i) \leftarrow & F & \rightarrow g_{ijk}(h_i(a_i)) \\ & A_k \xrightarrow{h_k} B_k & \\ f_{jk}(a_j) \swarrow & & \searrow g_{jk}(h_j(a_j)) \\ A_k & \xrightarrow{h_k} & B_k \end{array}$$

It is evident that there exists morphism from $\text{End}(\Omega_k, A_k)$ into $\text{End}(\Omega_k, B_k)$, which maps $f_{ijk}(a_i)$ into $g_{ijk}(h_i(a_i))$.

THEOREM 7.2.2. *If the representation f_{jk} is effective and the representation f_{ij} is free, then (h_i, h_k^*) is morphism of representations from representation f_{ijk} into representation g_{ijk} of Ω_i -algebra.*

PROOF. Consider the diagram

$$\begin{array}{ccccc} A_j & \xrightarrow{h_j} & & & B_j \\ & \searrow f_{jk} & & & \swarrow g_{jk} \\ & & \text{End}(\Omega_k, A_k) & \xrightarrow{h_k^*} & \text{End}(\Omega_k, B_k) \\ & & \downarrow f_{ijk}(a_i) & & \downarrow g_{ijk}(h_i(a_i)) \\ f_{ij}(a_i) & & & & \\ & & & & \\ & & \text{End}(\Omega_k, A_k) & \xrightarrow{h_k^*} & \text{End}(\Omega_k, B_k) \\ & & \downarrow f_{jk} & & \downarrow g_{jk} \\ & & A_j & \xrightarrow{h_j} & B_j \end{array}$$

The existence of map h_k^* and commutativity of the diagram (2) and (3) follows from effectiveness of map f_{jk} and theorem 3.2.9. Commutativity of diagrams (4) and (5) follows from theorem 7.1.11.

From commutativity of the diagram (4) it follows that

$$(7.2.5) \quad f_{jk} \circ f_{ij}(a_i) = f_{ijk}(a_i) \circ f_{jk}$$

From the equality (7.2.5) it follows that

$$(7.2.6) \quad h_k^* \circ f_{jk} \circ f_{ij}(a_i) = h_k^* \circ f_{ijk}(a_i) \circ f_{jk}$$

^{7.4} See the definition of the map h^* in the theorem 3.2.9.

From commutativity of diagram (3) it follows that

$$(7.2.7) \quad h_k^* \circ f_{jk} = g_{jk} \circ h_j$$

From the equality (7.2.7) it follows

$$(7.2.8) \quad h_k^* \circ f_{jk} \circ f_{ij}(a_i) = g_{jk} \circ h_j \circ f_{ij}(a_i)$$

From equalities (7.2.6) and (7.2.8) it follows that

$$(7.2.9) \quad h_k^* \circ f_{ijk}(a_i) \circ f_{jk} = g_{jk} \circ h_j \circ f_{ij}(a_i)$$

From commutativity of the diagram (5) it follows that

$$(7.2.10) \quad g_{jk} \circ g_{ij}(h_i(a_i)) = g_{ijk}(h_i(a_i)) \circ g_{jk}$$

From the equality (7.2.10) it follows that

$$(7.2.11) \quad g_{jk} \circ g_{ij}(h_i(a_i)) \circ h_j = g_{ijk}(h_i(a_i)) \circ g_{jk} \circ h_j$$

From commutativity of the diagram (2) it follows that

$$(7.2.12) \quad h_k^* \circ f_{jk} = g_{jk} \circ h_j$$

From the equality (7.2.12) it follows that

$$(7.2.13) \quad g_{ijk}(h_i(a_i)) \circ h_k^* \circ f_{jk} = g_{ijk}(h_i(a_i)) \circ g_{jk} \circ h_j$$

From equalities (7.2.11) and (7.2.13) it follows that

$$(7.2.14) \quad g_{jk} \circ g_{ij}(h_i(a_i)) \circ h_j = g_{ij}(h_i(a_i)) \circ h_k^* \circ f_{jk}$$

External diagram is diagram (7.2.1) when $i = 1$. Therefore, external diagram is commutative

$$(7.2.15) \quad h_j \circ f_{ij}(a_i) = g_{ij}(h_i(a_i)) \circ h_j$$

From the equality (7.2.15) it follows that

$$(7.2.16) \quad g_{jk} \circ h_j \circ f_{ij}(a_i) = g_{jk} \circ g_{ij}(h_i(a_i)) \circ h_j(a_j)$$

From equalities (7.2.9), (7.2.14) and (7.2.16) it follows that

$$(7.2.17) \quad h_k^* \circ f_{ijk}(a_i) \circ f_{jk} = g_{ijk}(h_i(a_i)) \circ h_k^* \circ f_{jk}$$

Because the map $f_{i+1, i+2}$ is injection, then from the equality (7.2.17) it follows that

$$(7.2.18) \quad h_k^* \circ f_{ijk}(a_i) = g_{ijk}(h_i(a_i)) \circ h_k^*$$

From the equality (7.2.18) commutativity of the diagram (1) follows. This proves the statement of theorem. \square

The theorem 7.2.2 states that unknown map on the diagram (7.2.4) is the map h_k^* . Meaning of theorems 7.1.11 and 7.2.2 is that all maps in diagram of representations act coherently when all representations are free.

THEOREM 7.2.3. *Consider the set of Ω_i -algebras $A_{(i)}, B_{(i)}, C_{(i)}$, $(i) = (1), \dots, (n)$. Let*

$$p : (f, A) \rightarrow (g, B)$$


$$q : (g, B) \rightarrow (h, C)$$

be morphisms of diagrams of representations. There exists morphism of representations of Ω -algebra

$$r : (f, A) \rightarrow (h, C)$$

where $r_{(k)} = q_{(k)} \circ p_{(k)}$, $(k) = (1), \dots, (n)$. We call morphism r of diagram of representations from f into h **product of morphisms p and q of diagram of representations**.

PROOF. For any i, j such that $A_{(j)} = A_j$, if there exists the representation f_{ij} , we represent statement of theorem using diagram



Map r_i is homomorphism of Ω_i -algebra A_i into Ω_i -algebra C_i . We need to show that tuple of maps (r_i, r_j) satisfies to (7.2.2):

$$\begin{aligned}
 r_k(f_{ij}(a_i)(a_j)) &= q_j \circ p_j(f_{ij}(a_i)(a_j)) \\
 &= q_k(g_{ij}(p_i(a_i))(p_j(a_j))) \\
 &= h_{ij}(q_i \circ p_i(a_i))(q_j \circ p_j(a_j)) \\
 &= h_{ij}(r_i(a_i))(r_j(a_j))
 \end{aligned}$$

□

7.3. Automorphism of Diagram of Representations

DEFINITION 7.3.1. Let (f, A) be diagram of representations of universal algebras. The morphism of diagram of representations $(h_{(1)}, \dots, h_{(n)})$ such, that for each (k) , $(k) = (1), \dots, (n)$, $h_{(k)}$ is endomorphism of $\Omega_{(k)}$ -algebra $A_{(k)}$ is called **endomorphism of diagram of representations**. □

DEFINITION 7.3.2. Let (f, A) be diagram of representations of universal algebras. The morphism of diagram of representations $(h_{(1)}, \dots, h_{(n)})$ such, that for each (k) , $(k) = (1), \dots, (n)$, $h_{(k)}$ is automorphism of $\Omega_{(k)}$ -algebra $A_{(k)}$ is called **automorphism of diagram of representations**. □

THEOREM 7.3.3. Let (f, A) be diagram of representations of universal algebras. The set of automorphisms of the diagram of representations (f, A) forms **group $GA(f)$** .

PROOF. Let $r = (r_{(1)}, \dots, r_{(n)})$, $p = (p_{(1)}, \dots, p_{(n)})$ be automorphisms of the diagram of representations (f, A) . According to definition 7.3.2, for each (k) , $(k) = (1), \dots, (n)$, maps $r_{(k)}, p_{(k)}$ are automorphisms of $\Omega_{(k)}$ -algebra $A_{(k)}$.

According to theorem II.3.2 ([14], p. 57), for each (k) , $(k) = (1), \dots, (n)$, the map $r_{(k)} \circ p_{(k)}$ is automorphism of $\Omega_{(k)}$ -algebra $A_{(k)}$. From the theorem 7.2.3 and the definition 7.3.2, it follows that product of automorphisms $r \circ p$ of the diagram of representations (f, A) is automorphism of the diagram of representations (f, A) .

According to proof of the theorem 3.5.5, for any (k) , $(k) = (1), \dots, (n)$, the product of automorphisms of $\Omega_{(k)}$ -algebra is associative. Therefore, the product of automorphisms of diagram of representations is associative.

Let $r = (r_{(1)}, \dots, r_{(n)})$ be an automorphism of the diagram of representations (f, A) . According to definition 7.3.2 for each (k) , $(k) = (1), \dots, (n)$, the map $r_{(k)}$ is automorphism of $\Omega_{(k)}$ -algebra $A_{(k)}$. Therefore, for each (k) , $(k) = (1), \dots, (n)$, the map $r_{(k)}^{-1}$ is automorphism of $\Omega_{(k)}$ -algebra $A_{(k)}$. Then the equality (7.2.3) is true for automorphism $r = (r_{(1)}, \dots, r_{(n)})$. Let j be index such that $j = (k)$. Let $a'_j = r_j(a_j)$. Since r_j is automorphism then $a_j = r_j^{-1}(a'_j)$ and, for any i, j , in case that there exists representation f_{ij} , we can write (7.2.3) in the form

$$(7.3.1) \quad h_j(f_{ij}(h_i^{-1}(a'_i))(h_j^{-1}(a'_j))) = g_{ij}(a'_i)(a'_j)$$

Similarly, from the equality (7.3.1) it follows that

$$(7.3.2) \quad f_{ij}(h_i^{-1}(a'_i)(h_j^{-1}(a'_j))) = h_j^{-1}(g_{ij}(a'_i)(a'_j))$$

The equality (7.3.2) corresponds to the equality (7.2.3) for the map r^{-1} . Therefore, map r^{-1} is automorphism of the diagram of representations (f, A) . \square

Basis of Diagram of Representations of Universal Algebra

8.1. Generating Set of Diagram of Representations

We construct the basis of the diagram of representations in a similar way that we constructed the basis of representation in the section 6.2.

DEFINITION 8.1.1. *Let (f, A) be diagram of representations. The tuple of sets*

$$N = (N_{(1)} \subset A_{(1)}, \dots, N_{(n)} \subset A_{(n)}) = (N_1 \subset A_1, \dots, N_n \subset A_n)$$

*is called **tuple of stable sets of diagram of representations** (f, A) , if*

$$f_{ij}(a_i)(a_j) \in N_j \quad i, j = 1, \dots, n$$

for every $a_1 \in N_1, \dots, a_n \in N_n$, in case that there exists the representation f_{ij} . We also will say that tuple of sets

$$N = (N_{(1)} \subset A_{(1)}, \dots, N_{(n)} \subset A_{(n)}) = (N_1 \subset A_1, \dots, N_n \subset A_n)$$

is stable relative to diagram of representations (f, A) . □

THEOREM 8.1.2. *Let (f, A) be diagram of representations. Let set $N_{(i)} \subset A_{(i)}$ be subalgebra of Ω_i -algebra $A_{(i)}$, $(i) = (1), \dots, (n)$. Let tuple of sets*

$$N = (N_{(1)} \subset A_{(1)}, \dots, N_{(n)} \subset A_{(n)}) = (N_1 \subset A_1, \dots, N_n \subset A_n)$$

be stable relative to diagram of representations (f, A) . Then there exists diagram of representations

$$(8.1.1) \quad (N, f_N = (f_{Nij}))$$

such that

$$f_{Nij}(a_i) = f_{ij}(a_i)|_{N_j} \quad i = 1, \dots, n \quad j = 1, \dots, n$$

*The diagram of representations (8.1.1) is called **subrepresentation** of diagram of representations (f, A) .*

PROOF. Let ω be m -ary operation of Ω_i -algebra A_i , $i = 1, \dots, n$. Then for any $a_{i,1}, \dots, a_{i,m} \in N_i$ and any $a_j \in N_j$

$$\begin{aligned} (f_{Nij}(a_{i,1}) \dots f_{Nij}(a_{i,m})\omega)(a_j) &= (f_{ij}(a_{i,1}) \dots f_{ij}(a_{i,m})\omega)(a_j) \\ &= f_{ij}(a_{i,1} \dots a_{i,m}\omega)(a_j) \\ &= f_{Nij}(a_{i,1} \dots a_{i,m}\omega)(a_i) \end{aligned}$$

Let ω be m -ary operation of Ω_j -algebra A_j , $j = 1, \dots, n$. Then for any $a_{j,1}, \dots, a_{j,m} \in N_j$ and any $a_i \in N_i$

$$\begin{aligned} f_{N_{ij}}(a_i)(a_{j,1}) \dots f_{N_{ij}}(a_i)(a_{j,m})\omega &= f_{ij}(a_i)(a_{j,1}) \dots f_{ij}(a_i)(a_{j,m})\omega \\ &= f_{ij}(a_i)(a_{j,1} \dots a_{j,m}\omega) \\ &= f_{N_{ij}}(a_i)(a_{j,1} \dots a_{j,m}\omega) \end{aligned}$$

We proved the statement of theorem. \square

From theorem 8.1.2, it follows that if diagram of representations (8.1.1) is diagram of subrepresentations of diagram of representations (f, A) , then map

$$(id_{(1)} : N_{(1)} \rightarrow A_{(1)}, \dots, id_{(n)} : N_{(n)} \rightarrow A_{(n)})$$

is morphism of diagrams of representations.

THEOREM 8.1.3. *The set^{8.1} $\mathcal{B}[f, A]$ of all diagrams of subrepresentations of diagram of representations (f, A) generates a closure system on diagram of representations (f, A) and therefore is a complete lattice.*

PROOF. Let for given $\lambda \in \Lambda$,

$$K_\lambda = (K_{\lambda,(1)} \subset A_{(1)}, \dots, K_{\lambda,(n)} \subset A_{(n)})$$

be tuple of sets stable relative to diagram of representations (f, A) . We determine the operation of intersection on the set $\mathcal{B}[f, A]$ according to rule

$$\bigcap f_{K_{\lambda ij}} = f_{\bigcap K_{\lambda ij}} \quad i, j = 1, \dots, n$$

$$\bigcap K_\lambda = \left(K_{(1)} = \bigcap K_{\lambda,(1)}, \dots, K_{(n)} = \bigcap K_{\lambda,(n)} \right)$$

$\bigcap K_{\lambda,(i)}$ is subalgebra of $\Omega_{(i)}$ -algebra $A_{(i)}$. Let

$$a_j \in \bigcap K_{\lambda,j} = \bigcap K_{\lambda,(j)}$$

For any $\lambda \in \Lambda$ and for any $a_i \in K_i = K_{(i)}$

$$f_{ij}(a_i)(a_j) \in K_{\lambda,j} = K_{\lambda,(j)}$$

Therefore,

$$f_{ij}(a_i)(a_j) \in K_j = K_{(j)}$$

Therefore, we determined the operation of intersection of diagrams of subrepresentations properly. \square

We denote the corresponding closure operator by $J[f]$. If

$$X = (X_{(1)} \subset A_{(1)}, \dots, X_{(n)} \subset A_{(n)}) = (X_1 \subset A_1, \dots, X_n \subset A_n)$$

is the tuple of sets, then

$$J[f, X] = (J_{(1)}[f, X], \dots, J_{(n)}[f, X]) = (J_1[f, X], \dots, J_n[f, X])$$

is the intersection of all tuples

$$K = (K_{(1)} \subset A_{(1)}, \dots, K_{(n)} \subset A_{(n)}) = (K_1 \subset A_1, \dots, K_n \subset A_n)$$

stable with respect to diagram of representations (f, A) and such that for $(i) = (1), \dots, (n)$, $K_{(i)}$ is subalgebra of $\Omega_{(i)}$ -algebra $A_{(i)}$ containing $X_{(i)}$.

^{8.1}This theorem is similar to definition of the lattice of subalgebras ([14], p. 79, 80)

THEOREM 8.1.4. Let^{8.2} (f, A) be the diagram of representations. Let

$$X = (X_{(1)} \subset A_{(1)}, \dots, X_{(n)} \subset A_{(n)}) = (X_1 \subset A_1, \dots, X_n \subset A_n)$$

For every value of (i) , $(i) = (1), \dots, (n)$, we define a subsets $X_{(i)k} \subset A_{(i)}$ by induction on k .

$$8.1.4.1: X_{(i)0} = X_{(i)}$$

$$8.1.4.2: x \in X_{(i)k} \Rightarrow x \in X_{(i)k+1}$$

$$8.1.4.3: x_1 \in X_{(i)k}, \dots, x_p \in X_{(i)k}, \omega \in \Omega_{(i)}(p) \Rightarrow x_1 \dots x_p \omega \in X_{(i)k+1}$$

$$8.1.4.4: x_i \in X_{ik} = X_{(i)k}, x_j \in X_{jk} = X_{(j)k} \Rightarrow f_{ji}(x_j)(x_i) \in X_{(i)k+1}$$

For each value of (i) , we assume

$$Y_{(i)} = \bigcup_{m=0}^{\infty} X_{(i)m}$$

Then

$$J_{(i)}[f, X] = Y_{(i)} \quad (i) = (1), \dots, (n)$$

PROOF. For each value of (i) the proof of the theorem coincides with the proof of theorem 6.1.4. \square

$J[f, X]$ is called **subrepresentation** of diagram of representations (f, A) generated by tuple of sets X and X is a **generating set** of diagram of representations $J[f, X]$. In particular, a generating set of diagram of representations (f, A) is a tuple

$$X = (X_{(1)} \subset A_{(1)}, \dots, X_{(n)} \subset A_{(n)}) = (X_1 \subset A_1, \dots, X_n \subset A_n)$$

such that $J[f, X] = A$.

From theorem 8.1.4, it follows next definition.

DEFINITION 8.1.5. Let

$$X = (X_{(1)} \subset A_{(1)}, \dots, X_{(n)} \subset A_{(n)}) = (X_1 \subset A_1, \dots, X_n \subset A_n)$$

be tuple of sets. For each tuple of A -numbers $a \in J[f, X]$

$$a = (a_{(1)} \dots a_{(n)}) = (a_1 \dots a_n)$$

there exists **tuple of Ω -words**

$$\begin{aligned} w[f, X, a] &= (w_{(1)}[f, X, a_{(1)}], \dots, w_{(n)}[f, X, a_{(n)}]) \\ &= (w_1[f, X, a_1], \dots, w_n[f, X, a_n]) \end{aligned}$$

defined according to following rule.

8.1.5.1: If $a_{(i)} \in X_{(i)}$, $(i) = (1), \dots, (n)$, then $a_{(i)}$ is $\Omega_{(i)}$ -word

$$w_{(i)}[f, X, a_{(i)}] = a_{(i)}$$

8.1.5.2: If $a_{(i)1}, \dots, a_{(i)p}$ are $\Omega_{(i)}$ -words, $(i) = (1), \dots, (n)$, and $\omega \in \Omega_{(i)}(p)$, then $a_{(i)1} \dots a_{(i)p} \omega$ is $\Omega_{(i)}$ -word.

8.1.5.3: Let $a_i = a_{(i)}$ be $\Omega_{(i)}$ -word, $a_j = a_{(j)}$ be $\Omega_{(j)}$ -word. Let there exist the representation f_{ij} . Then $f_{ij}(a_i)(a_j)$ is $\Omega_{(j)}$ -word.

Denote $w[f, X]$ the set of tuples of Ω -words of diagram of representations $J[f, X]$. \square

^{8.2} The statement of theorem is similar to the statement of theorem 5.1, [14], p. 79.

We consider tuple of A -numbers in the definition 8.1.5 because we need an algorithm of generation of tuple of Ω -words. However, to solve specific problem we need only some subset of tuples of A -numbers. For instance, in affine space we can consider or a set of points, either a set of vectors.

Choice of $\Omega_{(i)}$ -word relative generating set X is ambiguous. Therefore, if $\Omega_{(i)}$ -number has different $\Omega_{(i)}$ -words, then we will use indexes to distinguish them: $w_{(i)}[f, X, m]$, $w_{(i)1}[f, X, m]$, $w_{(i)2}[f, X, m]$.

DEFINITION 8.1.6. *Generating set X of diagram of representations (f, A) generates tuple of equivalences*

$$\begin{aligned}\rho[f, X] &= (\rho_{(1)}[f, X], \dots, \rho_{(n)}[f, X]) \\ \rho_{(i)}[f, X] &= \{(w_{(i)}[f, X, m_{(i)}], w_{(i)1}[f, X, m_{(i)}]) : m_{(i)} \in A_{(i)}\}\end{aligned}$$

on the set of tuples of Ω -words. \square

According to the definition 8.1.6, two $\Omega_{(i)}$ -words with respect to the generating set X of diagram of representations (f, A) are equivalent iff they correspond to the same $A_{(i)}$ -number. When we write equality of two $\Omega_{(i)}$ -words with respect to the generating set X of diagram of representations (f, A) , we will keep in mind that this equality is true up to equivalence $\rho_{(i)}[f, X]$.

We will use notation

$$r(a) = (r_{(1)}(a_{(1)}), \dots, r_{(n)}(a_{(n)}))$$

for image of tuple of elements $a = (a_{(1)}, \dots, a_{(n)})$ under the morphism of diagram of representations.

THEOREM 8.1.7. *Let X be the generating set of diagram of representations (f, A) . Let Y be the generating set of diagram of representations (g, B) . Morphism r of diagram of representations (f, A) forms the map of Ω -words*

$$\begin{aligned}w[f \rightarrow g, X, Y, r] : w[f, X] &\rightarrow w[g, Y] \\ X_{(i)} \subset A_{(i)} \quad Y_{(i)} = r_{(i)}(X_{(i)}) \quad (i) &= (1), \dots, (n)\end{aligned}$$

such that for any (i) , $(i) = (1), \dots, (n)$,

8.1.7.1: *If $a_{(i)} \in X_{(i)}$, $a'_{(i)} = r_{(i)}(a_{(i)})$, then*

$$w_{(i)}[f \rightarrow g, X, Y, r](a_{(i)}) = a'_{(i)}$$

8.1.7.2: *If*

$$\begin{aligned}a_{(i)1}, \dots, a_{(i)p} &\in w_{(i)}[f, X] \\ a'_{(i)1} = w_{(i)}[f \rightarrow g, X, Y, r](a_{(i)1}) \quad \dots \quad a'_{(i)p} &= w_{(i)}[f \rightarrow g, X, Y, r](a_{(i)p}) \\ \text{then for operation } \omega \in \Omega_{(i)}(p) &\text{ holds}\end{aligned}$$

$$w_{(i)}[f \rightarrow g, X, Y, r](a_{(i),1} \dots a_{(i),p} \omega) = a'_{(i),1} \dots a'_{(i),p} \omega$$

8.1.7.3: *If*

$$\begin{aligned}a_i = a_{(i)} \in w_{(i)}[f, X] \quad a'_{(i)} &= w_{(i)}[f \rightarrow g, X, Y, r](a_{(i)}) \\ a_j = a_{(j)} \in w_{(j)}[f, X] \quad a'_j &= a'_{(j)} = w_{(j)}[f, X, r](a_{(j)})\end{aligned}$$

then

$$w_{(i)}[f \rightarrow g, X, Y, r](f_{ji}(a_j)(a_i)) = g_{ji}(a'_j)(a'_i)$$

PROOF. Statements 8.1.7.1, 8.1.7.2 are true by definition of the morphism r . The statement 8.1.7.3 follows from the equality (7.2.3). \square

REMARK 8.1.8. Let r be morphism of diagram of representations (f, A) into diagram of representations (g, B) . Let

$$a \in J[f, X] \quad a' = r(a) \quad Y = r(X)$$

The theorem 8.1.7 states that $a' \in J[g, Y]$. The theorem 8.1.7 also states that the tuple of Ω -words representing a relative X and the tuple of Ω -words representing a' relative Y are generated according to the same algorithm. This allows considering of the tuple of Ω -words $w[g, Y, a']$ as tuple of maps

$$(8.1.2) \quad W[f, X, a] = (W_{(1)}[f, X, a], \dots, W_{(n)}[f, X, a]) = (W_1[f, X, a], \dots, W_n[f, X, a])$$

$$W_{(k)}[f, X, a] : (g, X') \rightarrow (g, X') \circ W_{(k)}[f, X, a] = w_{(k)}[g, X', a']$$

If $f = g$, then, instead of the map (8.1.2), we consider the map

$$W_{(k)}[f, X, a] : Y \rightarrow Y \circ W_{(k)}[f, X, a] = w_{(k)}[f, Y, a']$$

$$W_{(k)}[f, X, a](Y) = Y \circ W_{(k)}[f, X, a]$$

such that, if for certain morphism r

$$Y = r(X) \quad a' = r(a)$$

then

$$W_{(k)}[f, X, a](Y) = Y \circ W_{(k)}[f, X, a] = w_{(k)}[f, Y, a'] = a'$$

The map $W_{(k)}[f, X, a]$ is called **coordinates of $A_{(k)}$ -number $a_{(k)}$** relative to the tuples of sets X . Similarly, we consider coordinates of a set $B \subset J_{(k)}[f, X]$ relative to the set X

$$W_{(k)}[f, X, B] = \{W_{(k)}[f, X, a] : a \in B\} = (W_{(k)}[f, X, a], a \in B)$$

Denote

$$W[f, X] = (W_{(1)}[f, X], \dots, W_{(n)}[f, X]) = (W_1[f, X], \dots, W_n[f, X])$$

$$W_{(k)}[f, X] = \{W_{(k)}[f, X, a] : a \in J_{(k)}[f, X]\} = (W_{(k)}[f, X, a], a \in J_{(k)}[f, X])$$

the set of coordinates of representation $J[f, X]$. \square

THEOREM 8.1.9. There is a structure of $\Omega_{(k)}$ -algebra on the set of coordinates $W_{(k)}[f, X]$.

PROOF. Let $\omega \in \Omega_{(k)}(n)$. Then for any $m_1, \dots, m_n \in J_{(k)}[f, X]$, we assume

$$(8.1.3) \quad W_{(k)}(f, X, m_1) \dots W_{(k)}(f, X, m_n) \omega = W_{(k)}(f, X, m_1 \dots m_n \omega)$$

According to the remark 8.1.8,

$$(8.1.4) \quad X \circ (W_{(k)}[f, X, m_1] \dots W_{(k)}[f, X, m_n] \omega) = X \circ W_{(k)}[f, X, m_1 \dots m_n \omega]$$

$$= w_{(k)}[f, X, m_1 \dots m_n \omega]$$

follows from the equality (8.1.3). According to rule 8.1.5.2, from the equality (8.1.4), it follows that

$$\begin{aligned}
 & X \circ (W_{(k)}[f, X, m_1] \dots W_{(k)}[f, X, m_n] \omega) \\
 (8.1.5) \quad & = w_{(k)}[f, X, m_1] \dots w_{(k)}[f, X, m_n] \omega \\
 & = (X \circ W_{(k)}[f, X, m_1]) \dots (X \circ W_{(k)}[f, X, m_n]) \omega
 \end{aligned}$$

From the equality (8.1.5), it follows that the operation ω defined by the equality (8.1.3) on the set of coordinates $W_{(k)}[f, X]$ is defined properly. \square

THEOREM 8.1.10. *If there exists the representation f_{jk} of Ω_j -algebra A_j in Ω_k -algebra A_k , then there exists the representation F_{jk} of Ω_j -algebra $W_j[f, X]$ in Ω_k -algebra $W_k[f, X]$.*

PROOF. Let $a_j \in J_j[f, X]$. Then for any $a_k \in J_k[f, X]$, we assume

$$(8.1.6) \quad F_{jk}(W_j[f, X, a_j])(W_k[f, X, a_k]) = W_k[f, X, f_{jk}(a_j)(a_k)]$$

According to the remark 8.1.8,

$$\begin{aligned}
 (8.1.7) \quad & X \circ (F_{jk}(W_j[f, X, a_j])(W_k[f, X, a_k])) = X \circ W_k[f, X, f_{jk}(a_j)(a_k)] \\
 & = w_k[f, X, f_{jk}(a_j)(a_k)]
 \end{aligned}$$

follows from the equality (8.1.6). According to rule 8.1.5.3, from the equality (8.1.7), it follows that

$$\begin{aligned}
 & X \circ (F_{jk}(W_j[f, X, a_j])(W_k[f, X, a_k])) \\
 (8.1.8) \quad & = f_{jk}(w_j[f, X, a_j])(w_k[f, X, a_k]) \\
 & = f_{jk}(X \circ W_j(f, X, a_j))(X \circ W_k(f, X, a_k))
 \end{aligned}$$

From the equality (8.1.8), it follows that the representation (8.1.6) of Ω_{k-1} -algebra $W_{k-1}[f, X]$ in Ω_k -algebra $W_k[f, X]$ is defined properly. \square

COROLLARY 8.1.11. *Tuple of Ω -algebras*

$$W[f, X] = (W_{(1)}[f, X], \dots, W_{(n)}[f, X])$$

and the set of representations F forms the diagram of representations $(F, W[f, X])$. \square

THEOREM 8.1.12. *Let (f, A) , (g, B) be diagrams of representations. For given sets $X_{(k)} \subset A_{(k)}$, $Y_{(k)} \subset B_{(k)}$, $(k) = (1), \dots, (n)$, consider tuple of maps*

$$R = (R_{(1)}, \dots, R_{(n)})$$

such that for any (k) , $(k) = (1), \dots, (n)$, the map

$$R_{(k)} : X_{(k)} \rightarrow Y_{(k)}$$

agree with the structure of diagram of representations, i. e.

$$(8.1.9) \quad \begin{cases} \omega \in \Omega_{(k)}(p), x_{(k)1}, \dots, x_{(k)p}, x_{(k)1} \dots x_{(k)p} \omega \in X_{(k)}, \\ R_{(k)}(x_{(k)1} \dots x_{(k)p} \omega) \in Y_{(k)} \\ \Rightarrow R_{(k)}(x_{(k)1} \dots x_{(k)p} \omega) = R_{(k)}(x_{(k)1}) \dots R_{(k)}(x_{(k)p} \omega) \end{cases}$$

$$(8.1.10) \quad \begin{cases} a_j \in X_j, a_k \in X_k, R_k(f_{jk}(a_j)(a_k)) \in Y_k \\ \Rightarrow R_k(f_{jk}(a_j)(a_k)) = g_{jk}(R_j(a_j))(R_k(a_k)) \end{cases}$$

Consider the tuple of maps of Ω -words

$$w_{(k)}[f \rightarrow g, \bar{e}, Y, R] : w_{(k)}[f, \bar{e}] \rightarrow w_{(k)}[g, Y]$$

that satisfies conditions 8.1.7.1, 8.1.7.2, 8.1.7.3 and such that

$$e_{(k)i} \in \bar{e}_{(k)} \Rightarrow w_{(k)}[f \rightarrow g, \bar{e}, Y, R](e_{(k)i}) = R_{(k)}(e_{(k)i})$$

For each (k) , (k) , $(k) = (1), \dots, (n)$, there exists homomorphism of $\Omega_{(k)}$ -algebra

$$r_{(k)} : A_{(k)} \rightarrow B_{(k)}$$

defined by rule

$$(8.1.11) \quad r_{(k)}(a_{(k)}) = w_{(k)}[f \rightarrow g, X, Y, R](w_{(k)}[f, X, a_{(k)}])$$

Tuple of homomorphisms

$$r = (r_{(1)} \dots r_{(n)}) = (r_1 \dots r_n)$$

is morphism of diagrams of representations $J[f, X]$ and $J[g, Y]$.

PROOF. For any (k) , $(k) = (1), \dots, (n)$, consider the map

$$r_{(k)} : A_{(k)} \rightarrow B_{(k)}$$

LEMMA 8.1.13. For any (k) , $(k) = (1), \dots, (n)$, maps $r_{(k)}$ and $R_{(k)}$ coincide on the set $X_{(k)}$, and the map $r_{(k)}$ agrees with structure of $\Omega_{(k)}$ -algebra.

PROOF. If

$$(8.1.12) \quad w_{(k)}[f, X, a_{(k)}] = a_{(k)}$$

then $a_{(k)} \in X_{(k)}$. According to condition 8.1.7.1, the equality

$$(8.1.13) \quad \begin{aligned} r_{(k)}(a_{(k)}) &= w_{(k)}[f \rightarrow g, X, Y, R](w_{(k)}[f, X, a_{(k)}]) = w_{(k)}[f \rightarrow g, X, Y, R](a_{(k)}) \\ &= R_{(k)}(a_{(k)}) \end{aligned}$$

follows from equalities (8.1.11), (8.1.12). The lemma follows from the equality (8.1.13). \odot

LEMMA 8.1.14. Let $\omega \in \Omega_{(k)}(p)$.

$$(8.1.14) \quad r_{(k)}(x_{(k)1} \dots x_{(k)p} \omega) = r_{(k)}(x_{(k)1}) \dots r_{(k)}(x_{(k)p}) \omega$$

PROOF. We prove the lemma by induction over complexity of $\Omega_{(k)}$ -word.

If

$$x_{(k)1}, \dots, x_{(k)p}, x_{(k)1} \dots x_{(k)p} \omega \in X_{(k)}$$

then the equality (8.1.14) follows from the statement (8.1.9).

Let the statement of induction be true for

$$a_{(k)1}, \dots, a_{(k)p} \in J_{(k)}[f, X]$$

Let

$$(8.1.15) \quad w_{(k)1} = w_{(k)}[f, X, a_{(k)1}] \quad \dots \quad w_{(k)p} = w_{(k)}[f, X, a_{(k)p}]$$

According to the statement of induction, the equality

$$(8.1.16) \quad \begin{aligned} r_{(k)}(a_{(k)1}) &= w_{(k)}[f \rightarrow g, X, Y, R](w_{(k)1}) \\ &\dots = \dots \\ r_{(k)}(a_{(k)p}) &= w_{(k)}[f \rightarrow g, X, Y, R](w_{(k)p}) \end{aligned}$$

follows from equalities (8.1.11), (8.1.15). If

$$(8.1.17) \quad a_{(k)} = a_{(k)1} \dots a_{(k)p} \omega$$

then according to condition 8.1.5.2,

$$w_{(k)}[f, X, a_{(k)}] = w_{(k)1} \dots w_{(k)p} \omega$$

According to condition 8.1.7.2, the equality

$$(8.1.18) \quad \begin{aligned} r_{(k)}(a_{(k)}) &= w_{(k)}[f \rightarrow g, X, Y, R](w_{(k)}[f, X, a_{(k)}]) \\ &= w_{(k)}[f \rightarrow g, X, Y, R](w_{(k)1} \dots w_{(k)p} \omega) \\ &= w_{(k)}[f \rightarrow g, X, Y, R](w_{(k)1}) \dots w_{(k)}[f \rightarrow g, X, Y, R](w_{(k)p}) \omega \\ &= (r_{(k)}(a_{(k)1})) \dots (r_{(k)}(a_{(k)p})) \omega \end{aligned}$$

follows from equalities (8.1.11), (8.1.17), (8.1.16). The equality (8.1.14) follows from the equality (8.1.13). \odot

According to the lemma 8.1.13, maps $r_{(k)}$ and $R_{(k)}$ coincide on the set $X_{(k)}$. According to the lemma 8.1.14, the map $r_{(k)}$ is homomorphism of $\Omega_{(k)}$ -algebra $A_{(k)}$ into $\Omega_{(k)}$ -algebra $B_{(k)}$. To prove the theorem, it suffices to show that existence of the representation

$$f_{ji} : A_j \longrightarrow A_i$$

implies that the tuple of maps $(r_j \ r_i)$ is morphism of representations from f_{ji} into g_{ji} (the definition 7.2.1).

We prove the theorem by induction over complexity of Ω_i -word.

If $a_i \in X_i, a_j \in X_j$, then the statement of induction follows from the statement (8.1.10)

Let the statement of induction be true for

$$\begin{aligned} a_j \in J_j[f, X] \quad w_j[f, X, a_j] &= m_j \\ a_i \in J_i[f, X] \quad w_i[f, X, a_i] &= m_i \end{aligned}$$

According to condition 8.1.5.3,

$$(8.1.19) \quad w_i(f, X, f_{ji}(a_j)(a_i)) = f_{ji}(m_j)(m_i)$$

According to condition 8.1.7.3, the equality

$$(8.1.20) \quad \begin{aligned} r_i(f_{ji}(a_j)(a_i)) &= w_i[f \rightarrow g, X, Y, R](w_i[f, X, f_{ji}(a_j)(a_i)]) \\ &= w_i[f \rightarrow g, X, Y, R](f_{ji}(m_j)(m_i)) \\ &= g_{ji}(w_j[g, Y, r_j(a_j)])(w_i[g, Y, r_i(a_i)]) \\ &= g_{ji}(r_j(a_j))(r_i(a_i)) \end{aligned}$$

follows from equalities (8.1.11), (8.1.19). From equalities (7.2.3), (8.1.20), it follows that the map r is morphism of the diagram of representations (f, A) . \square

REMARK 8.1.15. *The theorem 8.1.12 is the theorem of extension of map. The only statement we know about the tuple of sets X is the statement that X is the tuple of generating sets of the diagram of representations (f, A) . However, between the elements of the set $X_{(k)}$, $(k) = (1), \dots, (n)$, there may be relationships generated by either operations of $\Omega_{(k)}$ -algebra $A_{(k)}$, or by transformation of representation f_{jk} . Therefore, any map of tuple of sets X , in general, cannot be extended to an*

endomorphism of diagram of representations (f, A) .^{8.3} However, if for any (k) , $(k) = (1), \dots, (n)$, the map $R_{(k)}$ is coordinated with the structure of diagram of representations, then we can construct an extension of this map and this extension is morphism of diagram of representations (f, A) . \square

DEFINITION 8.1.16. Let X be the tuple of generating sets of diagram of representations (f, A) . Let Y be the tuple of generating sets of diagram of representations (g, B) . Let r be the morphism of the diagram of representations (f, A) into the diagram of representations (g, B) . The set of coordinates $W[g, Y, r(X)]$ is called **coordinates of morphism of diagram of representations**. \square

DEFINITION 8.1.17. Let X be the tuple of generating sets of diagram of representations (f, A) . Let Y be the tuple of generating sets of diagram of representations (g, B) . Let r be the morphism of the diagram of representations (f, A) into the diagram of representations (g, B) . Let for $(k) = (1), \dots, (n)$, $a_{(k)} \in A_{(k)}$. We define **superposition of coordinates of morphism r of the diagram of representations and $A_{(k)}$ -number $a_{(k)}$** as coordinates defined according to rule

$$(8.1.21) \quad W_{(k)}[g, Y, r_{(k)}(X_{(k)})] \circ W_{(k)}[f, X, a_{(k)}] = W_{(k)}[g, Y, r_{(k)}(a_{(k)})]$$

Let $Y_{(k)} \subset A_{(k)}$. We define superposition of coordinates of morphism r of the diagram of representations and the set $Y_{(k)}$ according to rule

$$(8.1.22) \quad \begin{aligned} & W_{(k)}[g, Y, r_{(k)}(X_{(k)})] \circ W_{(k)}[f, X, Y_{(k)}] \\ &= (W_{(k)}[g, Y, r_{(k)}(X_{(k)})] \circ W_{(k)}[f, X, a_{(k)}], a_{(k)} \in Y_{(k)} \end{aligned}$$

\square

THEOREM 8.1.18. Morphism r of diagram of representations (f, A) into diagram of representations (g, B) generates the map of coordinates of diagram of representations

$$(8.1.23) \quad W_{(k)}[f \rightarrow g, X, Y, r] : W_{(k)}[f, X] \rightarrow W_{(k)}[g, Y]$$

$(k) = (1), \dots, (n)$, such that

$$(8.1.24) \quad \begin{aligned} & W_{(k)}[f, X, a] \rightarrow W_{(k)}[f \rightarrow g, X, Y, r] \circ W_{(k)}[f, X, a_{(k)}] \\ &= W_{(k)}[g, Y, r_{(k)}(a_{(k)})] \end{aligned}$$

$$(8.1.25) \quad \begin{aligned} & W_{(k)}[f \rightarrow g, X, Y, r] \circ W_{(k)}[f, X, a_{(k)}] \\ &= W_{(k)}[g, Y, r_{(k)}(X_{(k)})] \circ W_{(k)}[f, X, a_{(k)}] \end{aligned}$$

PROOF. According to the remark 8.1.8, we consider equalities (8.1.21), (8.1.23) relative to given tuple of generating sets X . The tuple of words

$$(8.1.26) \quad X \circ W_{(k)}[f, X, a_{(k)}] = w_{(k)}[f, X, a_{(k)}]$$

corresponds to coordinates $W_{(k)}[f, X, a_{(k)}]$; the tuple of words

$$(8.1.27) \quad Y \circ W_{(k)}[g, Y, r_{(k)}(a_{(k)})] = w_{(k)}[g, Y, r_{(k)}(a_{(k)})]$$

corresponds to coordinates $W_{(k)}[g, Y, r_{(k)}(a_{(k)})]$. Therefore, in order to prove the theorem, it is sufficient to show that the map $W_{(k)}[f \rightarrow g, X, Y, r]$ corresponds to map $w_{(k)}[f \rightarrow g, X, Y, r]$.

^{8.3} In the theorem 8.2.9, requirements to tuple of generating sets are more stringent. Therefore, the theorem 8.2.9 says about extension of arbitrary map. A more detailed analysis is given in the remark 8.2.11.

We prove the theorem by induction over complexity of $\Omega_{(k)}$ -word.

If $a_{(k)} \in X_{(k)}$, $a'_{(k)} = r_{(k)}(a_{(k)})$, then, according to equalities (8.1.26), (8.1.27), maps $W_{(k)}[f \rightarrow g, X, Y, r]$ and $w_{(k)}[f \rightarrow g, X, Y, r]$ are coordinated.

Let for $a_{(k)1}, \dots, a_{(k)p} \in X_{(k)}$ maps $W_{(k)}[f \rightarrow g, X, Y, r]$ and $w_{(k)}[f \rightarrow g, X, Y, r]$ are coordinated. Let $\omega \in \Omega_{(k)}(p)$. According to the theorem 6.1.12

$$(8.1.28) \quad W_{(k)}[f, X, a_{(k)1} \dots a_{(k)p} \omega] = W_{(k)}[f, X, a_{(k)1}] \dots W_{(k)}[f, X, a_{(k)p}] \omega$$

Because the map

$$r_{(k)} : A_{(k)} \rightarrow B_{(k)}$$

is homomorphism of $\Omega_{(k)}$ -algebra, then from the equality (8.1.28) it follows that

$$(8.1.29) \quad \begin{aligned} & W_{(k)}[g, Y, r_{(k)}(a_{(k)1} \dots a_{(k)p} \omega)] \\ &= W_{(k)}[g, Y, (r_{(k)}(a_{(k)1}) \dots (r_{(k)}(a_{(k)p})) \omega] \\ &= W_{(k)}[g, Y, r_{(k)}(a_{(k)1})] \dots W_{(k)}[g, Y, r_{(k)}(a_{(k)p})] \omega \end{aligned}$$

From equalities (8.1.28), (8.1.29) and the statement of induction, it follows that the maps $W_{(k)}[f \rightarrow g, X, Y, r]$ and $w_{(k)}[f \rightarrow g, X, Y, r]$ are coordinated for $a_{(k)} = a_{(k)1} \dots a_{(k)p} \omega$.

Let for $a_{j1} \in A_j$ maps $W_j[f \rightarrow g, X, Y, r]$ and $w_j[f \rightarrow g, X, Y, r]$ are coordinated. Let for $a_{i1} \in A_i$ maps $W_i[f \rightarrow g, X, Y, r]$ and $w_i[f \rightarrow g, X, Y, r]$ are coordinated. According to the theorem 8.1.10

$$(8.1.30) \quad W_i(f, X, f_{ji}(a_j)(a_i)) = F_{ji}(W_j(f, X, a_j))(W_i(f, X, a_i))$$

Because the map (r_j, r_i) is morphism of representations f_{ji} into representation F_{ji} , then from the equality (8.1.30) it follows that

$$(8.1.31) \quad \begin{aligned} W_i[g, Y, r_i(f_{ji}(a_j)(a_i))] &= W_i[g, Y, g_{ji}(r_j(a_j))(r_i(a_i))] \\ &= G_{ji}(W_j[g, Y, r_j(a_j)])(W_i[g, Y, r_i(a_i)]) \end{aligned}$$

From equalities (8.1.30), (8.1.31) and the statement of induction, it follows that maps $W_i[f \rightarrow g, X, Y, r]$ and $w_i[f \rightarrow g, X, Y, r]$ are coordinated for $b_i = f_{ji}(a_j)(a_i)$. \square

COROLLARY 8.1.19. *Let X be the tuple of generating sets of the diagram of representations (f, A) . Let Y be the tuple of generating sets of the diagram of representations (g, B) . Let r be the morphism of the diagram of representations (f, A) into the diagram of representations (g, B) . The map*

$$W[f \rightarrow g, X, Y, r] = (W_{(1)}[f \rightarrow g, X, Y, r], \dots, W_{(n)}[f \rightarrow g, X, Y, r])$$

is morphism of diagram of representations $(F, W[f, X])$ into diagram of representations $(G, W[g, Y])$. \square

Hereinafter we will identify the map $W[f \rightarrow g, X, Y, r]$ and the set of coordinates $W[g, Y, r(X)]$.

THEOREM 8.1.20. *Let X be the tuple of generating sets of the diagram of representations (f, A) . Let Y be the tuple of generating sets of the diagram of representations (g, B) . Let r be the morphism of the diagram of representations (f, A) into the diagram of representations (g, B) . Let $Y \subset A$. Then*

$$(8.1.32) \quad W[g, Y, r(X)] \circ W[f, X, X'] = W[g, Y, r(X')]$$

$$(8.1.33) \quad W[f \rightarrow g, X, Y, r] \circ W[f, X, X'] = W[g, Y, r(X')]$$

PROOF. The equality (8.1.32) follows from the equality

$$r(X') = (r(a), a \in X')$$

as well from equalities (8.1.21), (8.1.22). The equality (8.1.33) is corollary of equalities (8.1.32), (8.1.24). \square

THEOREM 8.1.21. *Let X be the tuple of generating sets of the diagram of representations (f, A) . Let Y be the tuple of generating sets of the diagram of representations (g, B) . Let Z be the tuple of generating sets of the diagram of representations (h, C) . Let r be the morphism of the diagram of representations (f, A) into the diagram of representations (g, B) . Let s be the morphism of the diagram of representations (g, B) into the diagram of representations (h, C) . Then*

$$(8.1.34) \quad W[h, Z, s(Y)] \circ W[g, Y, r(X)] = W[h, Z, (s \circ r)(X)]$$

$$(8.1.35) \quad W[g \rightarrow h, Y, Z, s] \circ W[f \rightarrow g, X, Y, r] = W[f \rightarrow h, X, Z, s \circ r]$$

PROOF. The equality

$$(8.1.36) \quad W[h, Z, s(Y')] \circ W[g, Y, Y'] = W[h, z, s(Y')]$$

follows from the equality (8.1.32). The equality (8.1.34) follows from the equality (8.1.36), if we assume $Y' = r(X)$. The equality (8.1.35) follows from the equality (8.1.34). \square

DEFINITION 8.1.22. *We can generalize the definition of the superposition of coordinates and assume that one of the factors is a tuple of sets of Ω -words. Accordingly, the definition of the superposition of coordinates has the form*

$$W[g, Y, r(X)] \circ w[f, X, X'] = w[g, Y, r(X)] \circ W[f, X, X'] = w[g, Y, r(X')]$$

\square

The following forms of writing an image of a tuple of sets X' under morphism r of diagram of representations are equivalent

$$(8.1.37) \quad \begin{aligned} r(X') &= r(X) \circ W[f, X, X'] \\ &= (Y \circ W[g, Y, r(X)]) \circ W[f, X, X'] \end{aligned}$$

From equalities (8.1.32), (8.1.37), it follows that

$$(8.1.38) \quad \begin{aligned} &Y \circ (W[g, Y, r(X)] \circ W[f, X, X']) \\ &= (Y \circ W[g, Y, r(X)]) \circ W[f, X, X'] \end{aligned}$$

The equality (8.1.38) is associative law for composition and allows us to write expression

$$Y \circ W[g, Y, r(X)] \circ W[f, X, X']$$

without brackets.

DEFINITION 8.1.23. *Let*

$$X = (X_{(1)} \subset A_{(1)}, \dots, X_{(n)} \subset A_{(n)}) = (X_1 \subset A_1, \dots, X_n \subset A_n)$$

be generating set of diagram of representations (f, A) . Let map r be endomorphism of diagram of representations (f, A) . Let the tuple of sets $Y = r(X)$ be image of tuple of sets X under the map r . Endomorphism r of diagram of representations (f, A) is called regular on the tuple of generating set X , if the tuple of sets Y is tuple

of generating sets of diagram of representations (f, A) . Otherwise, endomorphism r is called *singular* on the tuple of generating sets X . \square

DEFINITION 8.1.24. Endomorphism r of diagram of representations (f, A) is called **regular**, if it is regular on any tuple of generating sets. Otherwise, endomorphism r is called **singular**. \square

THEOREM 8.1.25. Automorphism r of diagram of representations (f, A) is regular endomorphism.

PROOF. Let X be tuple of generating sets of diagram of representations (f, A) . Let $Y = r(X)$. According to theorem 8.1.18 endomorphism r forms the map of Ω -words $w[f \rightarrow g, X, Y, r]$. Let $a' \in A$. Since r is automorphism, then there exists $a \in A$, $r(a) = a'$. According to definition 8.1.5, $w[f, X, a]$ is tuple of Ω -words representing a relative to tuple of generating sets X . According to theorem 8.1.18, $w[f, X', a']$ is tuple of Ω -words representing a' relative to tuple of sets Y

$$w[f, Y, a'] = w[f \rightarrow g, X, Y, r](w[f, X, a])$$

Therefore, Y is generating set of diagram of representations (f, A) . According to definition 8.1.24, automorphism r is regular. \square

8.2. Basis of Diagram of Representations

DEFINITION 8.2.1. Let (f, A) be diagram of representations and

$$\text{Gen}[f, A] = \{X = (X_{(1)}, \dots, X_{(n)}) : X_{(k)} \subseteq A_{(k)}, J_{(k)}[f, X] = A_{(k)}\}$$

If, for the tuple of sets $X \subset A_2$, it is true that $X \in \text{Gen}[f, A]$, then for any tuple of sets Y , $X_{(k)} \subset Y_{(k)} \subset A_{(k)}$, $(k) = (1), \dots, (n)$ also it is true that $Y \in \text{Gen}[f, A]$. If there exists minimal tuple of sets $X \in \text{Gen}[f, A]$, then the tuple of sets X is called **quasibasis of diagram of representations** (f, A) . \square

THEOREM 8.2.2. If the tuple of sets X is the quasibasis of diagram of representations (f, A) , then for any (k) , $(k) = (1), \dots, (n)$, and for any $m \in X_{(k)}$ the tuple of sets

$$X' = (X_{(1)}, \dots, X'_{(k)} = X_{(k)} \setminus \{m\}, \dots, X_{(n)})$$

is not generating set of diagram of representations (f, A) .

PROOF. Let X be quasibasis of diagram of representations (f, A) . Assume that for some $m \in X_{(k)}$ there exist $\Omega_{(k)}$ -word

$$w = w_{(k)}[f, X', m]$$

Consider $A_{(k)}$ -number m' such that it has $\Omega_{(k)}$ -word $w' = w_{(k)}[f, X, m']$ that depends on m . According to the definition 8.1.5, any occurrence of $A_{(k)}$ -number m into $\Omega_{(k)}$ -word w' can be substituted by the $\Omega_{(k)}$ -word w . Therefore, the $\Omega_{(k)}$ -word w' does not depend on m , and the tuple of sets X' is generating set of diagram of representations (f, A) . Therefore, X is not quasibasis of diagram of representations (f, A) . \square

REMARK 8.2.3. The proof of the theorem 8.2.2 gives us effective method for constructing the quasibasis of diagram of representations (f, A) . We define a quasibasis of diagram of representations by induction over diagram of representations. We start to build a quasibasis in Ω -algebras from the set $A_{[0]}$. When the quasibasis is constructed in Ω -algebras from the set $A_{[i]}$, we can proceed to the construction of quasibasis in Ω -algebras from the set $A_{[i+1]}$. \square

For each (k) , $(k) = (1), \dots, (n)$, we introduced $\Omega_{(k)}$ -word of $A_{(k)}$ -number x relative generating set X in the definition ^{8.4} 8.1.5. From the theorem 8.2.2, it follows that if the generating set X is not a quasibasis, then a choice of $\Omega_{(k)}$ -word relative generating set X is ambiguous. However, even if the generating set X is a quasibasis, then a representation of $m \in A_{(k)}$ in form of $\Omega_{(k)}$ -word is ambiguous.

REMARK 8.2.4. *There are three reasons of ambiguity in notation of $\Omega_{(k)}$ -word.*

8.2.4.1: *In $\Omega_{(k)}$ -algebra $A_{(k)}$, $(k) = (1), \dots, (n)$, equalities may be defined. For instance, if e is unit of multiplicative group $A_{(k)}$, then the equality*

$$ae = a$$

is true for any $a \in A_{(k)}$.

8.2.4.2: *Ambiguity of choice of $\Omega_{(k)}$ -word may be associated with properties of representation. For instance, let there exist representation f_{ik} of Ω_i -algebra A_i in Ω_k -algebra A_k . If m_1, \dots, m_n are Ω_k -words, $\omega \in \Omega_k(n)$ and a is Ω_i -word, then ^{8.5}*

$$(8.2.1) \quad f_{ik}(a)(m_1 \dots m_n \omega) = (f_{ik}(a)(m_1)) \dots (f_{ik}(a)(m_n)) \omega$$

At the same time, if ω is operation of Ω_i -algebra A_i and operation of Ω_k -algebra A_k , then we require that Ω_k -words $f(a_1 \dots a_n \omega)(x)$ and $(f(a_1)(x)) \dots (f(a_n)(x)) \omega$ describe the same element of Ω_k -algebra A_k . ^{8.6}

$$(8.2.2) \quad f(a_1 \dots a_n \omega)(x) = (f(a_1)(x)) \dots (f(a_n)(x)) \omega$$

8.2.4.3: *Equalities like (8.2.1), (8.2.2) persist under morphism of diagram of representations. Therefore we can ignore this form of ambiguity of $\Omega_{(k)}$ -word. However, a fundamentally different form of ambiguity is possible. We can see an example of such ambiguity in theorems 9.3.15, 9.3.16.*

So we see that we can define different equivalence relations on the set of $\Omega_{(k)}$ -words. ^{8.7} Our goal is to find a maximum equivalence on the set of $\Omega_{(k)}$ -words which persist under morphism of representation.

^{8.4} Naturally, arguments at the beginning of this section are the same as arguments at the beginning of the section 6.2 and I saved these arguments for the completeness of the text.

^{8.5} For instance, let $\{e_1, e_2\}$ be the basis of vector space over field k . The equation (8.2.1) has the form of distributive law

$$a(b^1 e_1 + b^2 e_2) = (ab^1) e_1 + (ab^2) e_2$$

^{8.6} For vector space, this requirement has the form of distributive law

$$(a + b) e_1 = a e_1 + b e_1$$

^{8.7} Evidently each of the equalities (8.2.1), (8.2.2) generates some equivalence relation.

A similar remark concerns the map $W[f, X, m]$ defined in the remark 8.1.8.^{8.8}

□

THEOREM 8.2.5. *Let X be quasibasis of the diagram of representations (f, A) . Consider tuple of equivalences*

$$\lambda[f, X] = (\lambda_{(1)}[f, X], \dots, \lambda_{(n)}[f, X])$$

$$\lambda_{(k)}[f, X] \subseteq w_{(k)}[f, X] \times w_{(k)}[f, X]$$

which is generated exclusively by the following statements.

8.2.5.1: *If in $\Omega_{(k)}$ -algebra $A_{(k)}$ there is an equality*

$$w_{(k)1}[f, X, m] = w_{(k)2}[f, X, m]$$

defining structure of $\Omega_{(k)}$ -algebra, then

$$(w_{(k)1}[f, X, m], w_{(k)2}[f, X, m]) \in \lambda_{(k)}[f, X]$$

8.2.5.2: *If there exists representation f_{ik} and in Ω_i -algebra A_i there is an equality*

$$w_{i1}[f, X, m] = w_{i2}[f, X, m]$$

defining structure of Ω_i -algebra, then

$$(f_{ik}(w_{i1})(w_k[f, X, m]), f_{ik}(w_{i2})(w_k[f, X, m])) \in \lambda_k[f, X]$$

8.2.5.3: *If there exists representation f_{ik} , then for any operation $\omega \in \Omega_i(n)$,*

$$(f_{ik}(a_{i1} \dots a_{in} \omega)(a_2), (f_{ik}(a_{i1}) \dots f_{ik}(a_{in}) \omega)(a_2)) \in \lambda_k[f, X]$$

8.2.5.4: *If there exists representation f_{ik} , then for any operation $\omega \in \Omega_k(n)$,*

$$(f_{ik}(a_i)(a_{k1} \dots a_{kn} \omega), f_{ik}(a_i)(a_{k1}) \dots f_{ik}(a_i)(a_{kn}) \omega) \in \lambda_k[f, X]$$

^{8.8}If vector space has finite basis, then we represent the basis as matrix

$$\bar{e} = \begin{pmatrix} e_1 & \dots & e_n \end{pmatrix}$$

We present the map $W[f, \bar{e}](v)$ as matrix

$$W[f, \bar{e}, v] = \begin{pmatrix} v^1 \\ \dots \\ v^n \end{pmatrix}$$

Then

$$W[f, \bar{e}, v](\bar{e}') = W[f, \bar{e}, v] \begin{pmatrix} e'_1 & \dots & e'_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v^1 \\ \dots \\ v^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e'_1 & \dots & e'_n \end{pmatrix}$$

has form of matrix product.

8.2.5.5: If there exists representation f_{ik} , $\omega \in \Omega_i(n) \cap \Omega_k(n)$ and the representation f_{ik} satisfies equality 8.9

$$f(a_{i1} \dots a_{in} \omega)(a_k) = (f(a_{i1})(a_k)) \dots (f(a_{in})(a_k)) \omega$$

then we can assume that the following equality is true

$$(f(a_{i1} \dots a_{in} \omega)(a_k), (f(a_{i1})(a_k)) \dots (f(a_{in})(a_k)) \omega) \in \lambda_k[f, X]$$

PROOF. The theorem is true because considered equalities are preserved under homomorphisms of universal algebras $A_{(k)}$. \square

DEFINITION 8.2.6. Quasibasis \bar{e} of the diagram of representations (f, A) such that

$$\rho[f, \bar{e}] = \lambda[f, \bar{e}]$$

is called **basis of diagram of representations** (f, A) . \square

REMARK 8.2.7. We write a basis also in following form

$$\bar{e} = (\bar{e}_{(1)}, \dots, \bar{e}_{(n)})$$

$$\bar{e}_{(k)} = (e_{(k)l}, e_{(k)l} \in \bar{e}_{(k)}) \quad (k) = (1), \dots, (n)$$

If basis is finite, then we also use notation

$$\bar{e}_{(k)} = (e_{(k)i}, i \in I_{(k)}) = (e_{(k)1}, \dots, e_{(k)p_{(k)}}) \quad (k) = (1), \dots, (n)$$

\square

THEOREM 8.2.8. Automorphism of the diagram of representations (f, A) maps a basis of the diagram of representations (f, A) into basis.

PROOF. Let the map r be automorphism of the diagram of representations (f, A) . Let the tuple of sets \bar{e} be a basis of the diagram of representations (f, A) . Let 8.10 $\bar{e}' = r \circ \bar{e}$. Assume that the tuple of sets \bar{e}' is not basis. According to the theorem 8.2.2, there exist (k) , $(k) = (1), \dots, (n)$, and $e'_{(k)i} \in \bar{e}'_{(k)}$ such that the tuple of sets

$$Z = (\bar{e}'_{(1)}, \dots, Z_{(k)} = \bar{e}'_{(k)} \setminus \{e'_{(k)i}\}, \dots, \bar{e}'_{(n)})$$

is generating set of the diagram of representations (f, A) . According to the theorem 7.3.3 the map r^{-1} is automorphism of the diagram of representations (f, A) . According to the theorem 8.1.25 and definition 8.1.24, the tuple of sets

$$X = (\bar{e}_{(1)}, \dots, X_{(k)} = \bar{e}_{(k)} \setminus \{r_{(k)}^{-1}(e'_{(k)i})\}, \dots, \bar{e}_{(n)})$$

is generating set of the diagram of representations (f, A) . The contradiction completes the proof of the theorem. \square

^{8.9} Consider a representation of commutative ring D in D -algebra A . We will use notation

$$f(a)(v) = av$$

The operations of addition and multiplication are defined in both algebras. However the equality

$$f(a+b)(v) = f(a)(v) + f(b)(v)$$

is true, and the equality

$$f(ab)(v) = f(a)(v)f(b)(v)$$

is wrong.

^{8.10} According to definitions 5.1.3, 8.3.1, we will use notation $r(\bar{e}) = r \circ \bar{e}$.

THEOREM 8.2.9. Let \bar{e} be the basis of the diagram of representations (f, A) . Let (g, B) be diagram of representations. Let

$$R : \bar{e} \rightarrow Y$$

be arbitrary map of the tuple of sets \bar{e} , $Y_{(k)} \subseteq B_{(k)}$, $(k) = (1), \dots, (n)$. Consider the tuple of maps

$$w_{(k)}[f \rightarrow g, \bar{e}, Y, R] : w_{(k)}[f, \bar{e}] \rightarrow w_{(k)}[g, Y]$$

that satisfy conditions 8.1.7.1, 8.1.7.2, 8.1.7.3 and such that

$$e_{(k)i} \in \bar{e}_{(k)} \Rightarrow w_{(k)}[f \rightarrow g, \bar{e}, Y, R](e_{(k)i}) = R_{(k)}(e_{(k)i})$$

There exists unique morphism of diagram of representations^{8.11}

$$r : A \rightarrow B$$

defined by rule

$$r(a) = w[f \rightarrow g, \bar{e}, Y, R](w[f, \bar{e}, a])$$

PROOF. The statement of theorem is corollary theorems 6.1.10, 6.1.14. \square

COROLLARY 8.2.10. Let \bar{e}, \bar{e}' be bases of the representation (f, A) . Let r be the automorphism of the representation (f, A) such that $\bar{e}' = r \circ \bar{e}$. Automorphism r is uniquely defined. \square

REMARK 8.2.11. The theorem 8.2.9, as well as the theorem 8.1.12, is the theorem of extension of map. However in this theorem, \bar{e} is not arbitrary generating set of the diagram of representations, but basis. According to the remark 8.2.3, we cannot determine coordinates of any element of basis through the remaining elements of the same basis. Therefore, we do not need to coordinate the map of the basis with representation. \square

THEOREM 8.2.12. The set of coordinates $W[f, \bar{e}, \bar{e}]$ corresponds to identity transformation

$$W[f, \bar{e}, E] = W[f, \bar{e}, \bar{e}]$$

PROOF. The statement of the theorem follows from the equality

$$a = \bar{e} \circ W[f, \bar{e}, a] = \bar{e} \circ W[f, \bar{e}, \bar{e}] \circ W[f, \bar{e}, a]$$

\square

THEOREM 8.2.13. Let $W[f, \bar{e}, r \circ \bar{e}]$ be the set of coordinates of automorphism r . There exists set of coordinates $W[f, r \circ \bar{e}, \bar{e}]$, corresponding to automorphism r^{-1} . The set of coordinates $W[f, r \circ \bar{e}, \bar{e}]$ satisfy to equalities^{8.12}

$$(8.2.3) \quad \begin{aligned} W[f, \bar{e}, r \circ \bar{e}] \circ W[f, r \circ \bar{e}, \bar{e}] &= W[f, \bar{e}, \bar{e}] \\ W[f \rightarrow f, \bar{e}, \bar{e}, r^{-1}] &= W[f \rightarrow f, \bar{e}, \bar{e}, r]^{-1} = W[f, r \circ \bar{e}, \bar{e}] \end{aligned}$$

^{8.11} This statement is similar to the theorem [2]-4.1, p. 135.

^{8.12} See also remark 6.2.15.

PROOF. Since R is automorphism of the diagram of representations (f, A) , then, according to the theorem 8.2.8, the set $r \circ \bar{e}$ is a basis of the diagram of representations (f, A) . Therefore, there exists the set of coordinates $W[f, r \circ \bar{e}, \bar{e}]$. The equality (8.2.3) follows from the chain of equalities

$$\begin{aligned} W[f, \bar{e}, r \circ \bar{e}] \circ W[f, r \circ \bar{e}, \bar{e}] &= W[f, \bar{e}, r \circ \bar{e}] \circ W[f, \bar{e}, r^{-1} \circ \bar{e}] \\ &= W[f, \bar{e}, r \circ r^{-1} \circ \bar{e}] = W[f, \bar{e}, \bar{e}] \end{aligned}$$

□

THEOREM 8.2.14. *The group of automorphisms $GA(f)$ of the diagram of effective representations (f, A) generates effective left-side representation in the diagram of representations (f, A) .*

PROOF. From the corollary 8.2.10, it follows that if automorphism r maps a basis \bar{e} into a basis \bar{e}' , then the set of coordinates $W[f, \bar{e}, \bar{e}']$ uniquely determines an automorphism r . From the theorem 8.1.18, it follows that the set of coordinates $W[f, \bar{e}, \bar{e}']$ determines the map of coordinates relative to the basis \bar{e} under automorphism of the diagram of representations (f, A) . From the equality (8.1.37), it follows that automorphism r acts from the left on elements of $\Omega_{(k)}$ -algebra $A_{(k)}$, $(k) = (1), \dots, (n)$. From the equality (8.1.34), it follows that the representation of group is left-side representation. According to the theorem 8.2.12 the set of coordinates $W[f, \bar{e}, \bar{e}]$ corresponds to identity transformation. From the theorem 8.2.13, it follows that the set of coordinates $W[f, r \circ \bar{e}, \bar{e}]$ corresponds to transformation, inverse to transformation $W[f, \bar{e}, r \circ \bar{e}]$. □

8.3. Basis Manifold of Diagram of Representations

The set $\mathcal{B}[f]$ of bases of diagram of representations (f, A) is called **basis manifold** of diagram of representations (f, A) .

DEFINITION 8.3.1. *According to the theorem 8.2.8 and to the definition 8.1.22, automorphism r of the diagram of representations (f, A) generates transformation*

$$(8.3.1) \quad \begin{aligned} r : \bar{h} &\rightarrow r \circ \bar{h} \\ r \circ \bar{h} &= W[f, \bar{e}, r \circ \bar{e}] \circ \bar{h} \end{aligned}$$

*of the basis manifold of diagram of representations. This transformation is called **active**. According to the theorem 7.3.3, we defined left-side representation*

$$A(f) : GA(f) \longrightarrow \mathcal{B}[f]$$

*of group $GA(f)$ in basis manifold $\mathcal{B}[f]$. Representation $A(f)$ is called **active representation**. According to the corollary 8.2.10, this representation is single transitive.* □

REMARK 8.3.2. *According to remark 8.2.3, it is possible that there exist bases of diagram of representations (f, A) such that there is no active transformation between them. Then we consider the orbit of selected basis as basis manifold. Therefore, it is possible that the diagram of representations (f, A) has different basis manifolds. We will assume that we have chosen a basis manifold.*

THEOREM 8.3.3. *There exists single transitive right-side representation*

$$P(f) : GA(f) \xrightarrow{*} \mathcal{B}[f]$$

of group $GA(f)$ in basis manifold $\mathcal{B}[f]$. Representation $P(f)$ is called **passive representation**.

PROOF. Since $A(f)$ is single transitive left-side representation of group $GA(f)$, then single transitive right-side representation $P(f)$ is uniquely defined according to the theorem 5.5.9. \square

THEOREM 8.3.4. *Transformation of representation $P(f)$ is called **passive transformation of the basis manifold** of diagram of representations. We also use notation*

$$s(\bar{e}) = \bar{e} \circ s$$

to denote the image of basis \bar{e} under passive transformation s . Passive transformation of basis has form

$$(8.3.2) \quad \begin{aligned} s : \bar{h} &\rightarrow \bar{h} \circ s \\ \bar{h} \circ s &= \bar{h} \circ W[f, \bar{e}, \bar{e} \circ s] \end{aligned}$$

PROOF. According to the equality (8.3.1), active transformation acts from left on coordinates of basis. The equality (8.3.2) follows from theorems 5.5.8, 5.5.9, 5.5.11; according to these theorems, passive transformation acts from right on coordinates of basis. \square

THEOREM 8.3.5. *Passive transformation of the basis manifold is automorphism of representation $A(f)$.*

PROOF. The theorem follows from the theorem 5.5.11. \square

THEOREM 8.3.6. *Let s be passive transformation of the basis manifold of the diagram of representations (f, A) . Let \bar{e}_1 be the basis of the diagram of representations (f, A) , $\bar{e}_2 = \bar{e}_1 \circ s$. For basis \bar{e}_3 , let there exists an active transformation r such that $\bar{e}_3 = r \circ \bar{e}_1$. Let $\bar{e}_4 = r \circ \bar{e}_2$. Then $\bar{e}_4 = \bar{e}_3 \circ s$.*

PROOF. According to the equality (8.3.1), active transformation of coordinates of basis \bar{e}_3 has form

$$(8.3.3) \quad \bar{e}_4 = W[f, \bar{e}_1, \bar{e}_3] \circ \bar{e}_2 = W[f, \bar{e}_1, \bar{e}_3] \circ \bar{e}_1 \circ W[f, \bar{e}_1, \bar{e}_2]$$

Let $\bar{e}_5 = \bar{e}_3 \circ s$. From the equality (8.3.2), it follows that

$$(8.3.4) \quad \bar{e}_5 = \bar{e}_3 \circ W[f, \bar{e}_1, \bar{e}_2] = W[f, \bar{e}_1, \bar{e}_3] \circ \bar{e}_1 \circ W[f, \bar{e}_1, \bar{e}_2]$$

From match of expressions in equalities (8.3.3), (8.3.4), it follows that $\bar{e}_4 = \bar{e}_5$. Therefore, the diagram

$$\begin{array}{ccc} \bar{e}_1 \in \mathcal{B}[f] & \xrightarrow{r} & \bar{e}_3 \in \mathcal{B}[f] \\ \downarrow s & & \downarrow s \\ \bar{e}_2 \in \mathcal{B}[f] & \xrightarrow{r} & \bar{e}_4 \in \mathcal{B}[f] \end{array}$$

is commutative. \square

8.4. Geometric Object of Diagram of Representations

An active transformation changes a basis of the diagram of representations and tuple of Ω -numbers uniformly and coordinates of Ω_2 -number relative basis do not change. A passive transformation changes only the basis and it leads to change of coordinates of tuple of Ω -numbers relative to the basis.

THEOREM 8.4.1. *Let passive transformation $s \in GA(f)$ maps basis $\bar{e}_1 \in \mathcal{B}[f]$ into basis $\bar{e}_2 \in \mathcal{B}[f]$*

$$(8.4.1) \quad \bar{e}_2 = \bar{e}_1 \circ s = \bar{e}_1 \circ W[f, \bar{e}_1, \bar{e}_1 \circ s]$$

Let tuple of A -numbers a has tuple of Ω -words

$$(8.4.2) \quad a = \bar{e}_1 \circ W[f, \bar{e}_1, a]$$

relative to basis \bar{e}_1 and has tuple of Ω -words

$$(8.4.3) \quad a = \bar{e}_2 \circ W[f, \bar{e}_2, a]$$

relative to basis \bar{e}_2 . Coordinate transformation

$$(8.4.4) \quad W[f, \bar{e}_2, a] = W[f, \bar{e}_1 \circ s, \bar{e}_1] \circ W[f, \bar{e}_1, a]$$

does not depend on tuple of A -numbers a or basis \bar{e}_1 , but is defined only by coordinates of tuple of A -numbers a relative to basis \bar{e}_1 .

PROOF. From (8.4.1) and (8.4.3), it follows that

$$(8.4.5) \quad \begin{aligned} \bar{e}_1 \circ W[f, \bar{e}_1, a] &= \bar{e}_2 \circ W[f, \bar{e}_2, a] = \bar{e}_1 \circ W[f, \bar{e}_1, \bar{e}_2] \circ W[f, \bar{e}_2, a] \\ &= \bar{e}_1 \circ W[f, \bar{e}_1, \bar{e}_1 \circ s] \circ W[f, \bar{e}_2, a] \end{aligned}$$

Comparing (8.4.2) and (8.4.5) we get

$$(8.4.6) \quad W[f, \bar{e}_1, a] = W[f, \bar{e}_1, \bar{e}_1 \circ s] \circ W[f, \bar{e}_2, a]$$

Since s is automorphism, then the equality (8.4.4) follows from (8.4.6) and the theorem 8.2.13. \square

THEOREM 8.4.2. *Coordinate transformations (8.4.4) form effective left-side representation of group $GA(f)$ which is called **coordinate representation** in tuple of Ω -algebras.*

PROOF. According to corollary 8.1.19, the transformation (8.4.4) is the endomorphism of diagram of representations^{8.13} $(F, W[f, \bar{e}_1])$.

Suppose we have two consecutive passive transformations s and t . Coordinate transformation

$$(8.4.7) \quad W[f, \bar{e}_2, a] = W[f, \bar{e}_1 \circ s, \bar{e}_1] \circ W[f, \bar{e}_1, a]$$

corresponds to passive transformation s . Coordinate transformation

$$(8.4.8) \quad W[f, \bar{e}_2, a] = W[f, \bar{e}_1 \circ t, \bar{e}_1] \circ W[f, \bar{e}_1, a]$$

^{8.13}This transformation does not generate an endomorphism of the diagram of representations (f, A) . Coordinates change because basis relative which we determinate coordinates changes. However, tuple of A -numbers, coordinates of which we are considering, does not change.

corresponds to passive transformation t . According to the theorem 8.3.3, product of coordinate transformations (8.4.7) and (8.4.8) has form

$$\begin{aligned} W[f, \bar{e}_3, a] &= W[f, \bar{e}_1 \circ t, \bar{e}_1] \circ W[f, \bar{e}_1 \circ s, \bar{e}_1] \circ W[f, \bar{e}_1, a] \\ &= W[f, \bar{e}_1 \circ t \circ s, \bar{e}_1] \circ W[f, \bar{e}_1, a] \end{aligned}$$

and is coordinate transformation corresponding to passive transformation $t \circ s$. It proves that coordinate transformations form left-side representation of group $GA(f)$.

Suppose coordinate transformation does not change coordinates of selected basis. Then unit of group $GA(f)$ corresponds to it because representation is single transitive. Therefore, coordinate representation is effective. \square

Let $(f, A), (g, B)$ be diagrams of representations. Passive representation $P(g)$ is coordinated with passive representation $P(f)$, if there exists homomorphism h of group $GA(f)$ into group $GA(g)$. Consider diagram

$$\begin{array}{ccc} \text{End}(B[f]) & \xrightarrow{H} & \text{End}(B[g]) \\ P(f) \uparrow & \nearrow f' & \uparrow P(g) \\ GA(f) & \xrightarrow{h} & GA(g) \end{array}$$

Since maps $P(f), P(g)$ are isomorphisms of group, then map H is homomorphism of groups. Therefore, map f' is representation of group $GA(f)$ in basis manifold $\mathcal{B}(g)$. According to design, passive transformation $H(s)$ of basis manifold $\mathcal{B}(g)$ corresponds to passive transformation s of basis manifold $\mathcal{B}(f)$

$$(8.4.9) \quad \bar{e}_{g1} = \bar{e}_g \circ H(s)$$

Then coordinate transformation in diagram of representations (B, g) gets form

$$(8.4.10) \quad W[g, \bar{e}_{g1}, a] = W[g, \bar{e}_g \circ H(s), \bar{e}_g] \circ W[g, \bar{e}_g, a]$$

DEFINITION 8.4.3. *Orbit*

$$\begin{aligned} \mathcal{O}(f, g, \bar{e}_g, a) &= H(GA(f)) \circ W[g, \bar{e}_g, a] \\ &= (W[g, \bar{e}_g \circ H(s), \bar{e}_g] \circ W[g, \bar{e}_g, a], \bar{e}_f \circ s, s \in GA(f)) \end{aligned}$$

is called **geometric object in coordinate representation** defined in the diagram of representations (f, A) . For any basis $\bar{e}_{f1} = \bar{e}_f \circ s$ corresponding point (8.4.10) of orbit defines **coordinates of geometric object** relative basis \bar{e}_{f1} . \square

DEFINITION 8.4.4. *Orbit*

$$\mathcal{O}(f, g, a) = (W[g, \bar{e}_g \circ H(s), \bar{e}_g] \circ W[g, \bar{e}_g, a], \bar{e}_g \circ H(s), \bar{e}_f \circ s, s \in GA(f))$$

is called **geometric object** defined in the diagram of representations (f, A) . We also say that a is a **geometric object of type H** . For any basis $\bar{e}_{f1} = \bar{e}_f \circ s$ corresponding point (8.4.10) of orbit defines tuple of A -numbers

$$a = \bar{e}_g \circ W[g, \bar{e}_g, a]$$

called **representative of geometric object** in the diagram of representations (f, A) . \square

Since a geometric object is an orbit of representation, we see that according to the theorem 5.3.7 the definition of the geometric object is a proper definition.

Definition 8.4.3 introduces a geometric object in coordinate space. We assume in definition 8.4.4 that we selected a basis of representation g . This allows using a representative of the geometric object instead of its coordinates.

THEOREM 8.4.5 (invariance principle). *Representative of geometric object does not depend on selection of basis \bar{e}_f .*

PROOF. To define representative of geometric object, we need to select basis \bar{e}_f of diagram of representations (f, A) , basis \bar{e}_g of diagram of representations (B, g) and coordinates of geometric object $W[g, \bar{e}_g, b]$. Corresponding representative of geometric object has form

$$b = \bar{e}_g \circ W[g, \bar{e}_g, b]$$

Suppose we map basis \bar{e}_f to basis \bar{e}_{f1} by passive transformation

$$\bar{e}_{f1} = \bar{e}_f \circ s$$

According building this forms passive transformation (8.4.9) and coordinate transformation (8.4.10). Corresponding representative of geometric object has form

$$\begin{aligned} b' &= \bar{e}_{g1} \circ W[g, \bar{e}_{g1}, b'] \\ &= \bar{e}_g \circ W[g, \bar{e}_g, \bar{e}_g \circ H(s)] \circ W[g, \bar{e}_g \circ H(s), \bar{e}_g] \circ W[g, \bar{e}_g, b] \\ &= \bar{e}_g \circ W[g, \bar{e}_g, b] = b \end{aligned}$$

Therefore representative of geometric object is invariant relative selection of basis.

□

Examples of Diagram of Representations: Module

9.1. About this Chapter

Representation of universal algebra is very important tool which I have been using for many years to study algebra, geometry, calculus. The main goal of this and following chapters is to show how representation of universal algebra works in different fields of mathematics.

Examples in this chapter are related to different structures associated with module over ring.

Abelian group is first example. Module is effective representation of ring in Abelian group. So there is some similarity between Abelian group and module. I consider this similarity in the section 9.2.

Module over commutative ring is relatively simple theory. On the other hand, definitions of representation theory (basis of representation, morphism of representation, free representation) are based on similar definitions in module. So I dedicated the section 9.3 to thorough consideration of module over commutative ring.

I consider algebra over commutative ring in the section 9.4 and left module over D -algebra in the section 9.5. We can consider module over non commutative ring the same way as we considered module over commutative ring. However, we encounter serious problems when studying linear map.

Consideration a non commutative ring as algebra over center of the ring significantly changes the picture. Analysis of diagram of representations describing module V over D -algebra A , allows us to consider different groups of maps which preserve the structure of algebra. Among these maps, we distinguish linear maps of A -module V (reduced morphism of D -module V) and homomorphisms of A -module V (reduced morphism of diagram of representations). Such definition of linear map allows us to consider polylinear map of module over D -algebra A .

If D -algebra A is Banach algebra, then we get the tool to study multivariable calculus. Unfortunately, the structure of linear map of noncommutative algebra is outside the scope of this chapter. The reader can study more on this topic in the book [12].

9.2. Abelian Group

DEFINITION 9.2.1. *The action of ring of rational integers Z in Abelian group G is defined using following rules*

$$(9.2.1) \quad 0g = 0$$

$$(9.2.2) \quad (n + 1)g = ng + g$$

$$(9.2.3) \quad (n - 1)g = ng - g$$

□

THEOREM 9.2.2. *The action of ring of rational integers Z in Abelian group G defined in the definition 9.2.1 is representation. The following equalities are true*

$$(9.2.4) \quad 1a = a$$

$$(9.2.5) \quad (nm)a = n(ma)$$

$$(9.2.6) \quad (m+n)a = ma + na$$

$$(9.2.7) \quad (m-n)a = ma - na$$

$$(9.2.8) \quad n(a+b) = na + nb$$

PROOF. The equality (9.2.4) follows from the equality (9.2.1) and from the equality (9.2.2) when $n = 0$.

From the equality (9.2.1), it follows that the equality (9.2.6) is true when $n = 0$.

- Let the equality (9.2.6) is true when $n = k \geq 0$. Then

$$(m+k)a = ma + ka$$

The equality

$$\begin{aligned} (m+(k+1))a &= ((m+k)+1)a = (m+k)a + a = ma + ka + a \\ &= ma + (k+1)a \end{aligned}$$

follows from the equality (9.2.2). Therefore, the equality (9.2.6) is true when $n = k+1$. According to mathematical induction, the equality (9.2.6) is true for any $n \geq 0$.

- Let the equality (9.2.6) is true when $n = k \leq 0$. Then

$$(m+k)a = ma + ka$$

The equality

$$\begin{aligned} (m+(k-1))a &= ((m+k)-1)a = (m+k)a - a = ma + ka - a \\ &= ma + (k-1)a \end{aligned}$$

follows from the equality (9.2.3). Therefore, the equality (9.2.6) is true when $n = k-1$. According to mathematical induction, the equality (9.2.6) is true for any $n \leq 0$.

- Therefore, the equality (9.2.6) is true for any $n \in Z$.

The equality

$$(9.2.9) \quad (k+n)a - na = ka$$

follows from the equality (9.2.6). The equality (9.2.7) follows from the equality (9.2.9), if we assume $m = k+n$, $k = m-n$.

From the equality (9.2.1), it follows that the equality (9.2.5) is true when $n = 0$.

- Let the equality (9.2.5) is true when $n = k \geq 0$. Then

$$(km)a = k(ma)$$

The equality

$$\begin{aligned} ((k+1)m)a &= (km+m)a = (km)a + ma = k(ma) + ma \\ &= (k+1)(ma) \end{aligned}$$

follows from equalities (9.2.2), (9.2.6). Therefore, the equality (9.2.5) is true when $n = k + 1$. According to mathematical induction, the equality (9.2.5) is true for any $n \geq 0$.

- Let the equality (9.2.6) is true when $n = k \leq 0$. Then

$$(km)a = k(ma)$$

The equality

$$\begin{aligned} ((k-1)m)a &= (km - m)a = (km)a - ma = k(ma) - ma \\ &= (k-1)(ma) \end{aligned}$$

follows from equalities (9.2.3), (9.2.7). Therefore, the equality (9.2.5) is true when $n = k - 1$. According to mathematical induction, the equality (9.2.5) is true for any $n \leq 0$.

- Therefore, the equality (9.2.5) is true for any $n \in Z$.

From the equality (9.2.1), it follows that the equality (9.2.8) is true when $n = 0$.

- Let the equality (9.2.8) is true when $n = k \geq 0$. Then

$$k(a+b) = ka + kb$$

The equality

$$\begin{aligned} (k+1)(a+b) &= k(a+b) + a + b = ka + kb + a + b \\ &= ka + a + kb + b \\ &= (k+1)a + (k+1)b \end{aligned}$$

follows from the equality (9.2.2). Therefore, the equality (9.2.8) is true when $n = k + 1$. According to mathematical induction, the equality (9.2.8) is true for any $n \geq 0$.

- Let the equality (9.2.6) is true when $n = k \leq 0$. Then

$$k(a+b) = ka + kb$$

The equality

$$\begin{aligned} (k-1)(a+b) &= k(a+b) - (a+b) = ka + kb - a - b \\ &= ka - a + kb - b \\ &= (k-1)a + (k-1)b \end{aligned}$$

follows from the equality (9.2.3). Therefore, the equality (9.2.8) is true when $n = k - 1$. According to mathematical induction, the equality (9.2.8) is true for any $n \leq 0$.

- Therefore, the equality (9.2.8) is true for any $n \in Z$.

From the equality (9.2.8), it follows that the map

$$\varphi(n) : a \in G \rightarrow na \in G$$

is an endomorphism of Abelian group G . From equalities (9.2.6), (9.2.5), it follows that the map

$$\varphi : Z \rightarrow \text{End}(Ab, G)$$

is a homomorphism of the ring Z . According to the definition 3.1.1, the map φ is representation of ring of rational integers Z in Abelian group G . \square

THEOREM 9.2.3. *Let G be Abelian group. The set of G -numbers generated by the set $S = \{s_i : i \in I\}$ has form*

$$(9.2.10) \quad J(S) = \left\{ g : g = \sum_{i \in I} g^i s_i, g^i \in Z \right\}$$

where the set $\{i \in I : g^i \neq 0\}$ is finite.

PROOF. We prove the theorem by induction based on the theorems [14]-5.1, page 79 and 6.1.4.

For any $s_k \in S$, let $g^i = \delta_k^i$. Then

$$(9.2.11) \quad s_k = \sum_{i \in I} g^i s_i$$

$s_k \in J(S)$ follows from (9.2.10), (9.2.11).

Let $g_1, g_2 \in X_k \subseteq J(S)$. Since G is Abelian group, then, according to the statement 6.1.4.3, $g_1 + g_2 \in J(S)$. According to the equality (9.2.10), there exist Z -numbers $g_1^i, g_2^i, i \in I$, such that

$$(9.2.12) \quad g_1 = \sum_{i \in I} g_1^i v_i \quad g_2 = \sum_{i \in I} g_2^i v_i$$

where sets

$$(9.2.13) \quad H_1 = \{i \in I : g_1^i \neq 0\} \quad H_2 = \{i \in I : g_2^i \neq 0\}$$

are finite. From the equality (9.2.12), it follows that

$$(9.2.14) \quad g_1 + g_2 = \sum_{i \in I} g_1^i v_i + \sum_{i \in I} g_2^i v_i = \sum_{i \in I} (g_1^i v_i + g_2^i v_i)$$

The equality

$$(9.2.15) \quad g_1 + g_2 = \sum_{i \in I} (g_1^i + g_2^i) v_i$$

follows from equalities (9.2.6), (9.2.14). From the equality (9.2.13), it follows that the set

$$\{i \in I : g_1^i + g_2^i \neq 0\} \subseteq H_1 \cup H_2$$

is finite. From the equality (9.2.15), it follows that $g_1 + g_2 \in J(S)$. \square

9.3. Vector Space

9.3.1. Module over Commutative Ring.

DEFINITION 9.3.1. *Effective representation of commutative ring D in an Abelian group V*

$$(9.3.1) \quad f : D \xrightarrow{*} V \quad f(d) : v \rightarrow dv$$

is called **module over ring D** or **D -module**. V -number is called **vector**. \square

THEOREM 9.3.2. *The following diagram of representations describes D -module V*

$$(9.3.2) \quad \begin{array}{ccc} D & \xrightarrow{g_2} & V \\ & & \uparrow *g_1 \\ & & Z \end{array}$$

The diagram of representations (9.3.2) holds **commutativity of representations** of ring of rational integers Z and commutative ring D in Abelian group V

$$(9.3.3) \quad a(nv) = n(av)$$

PROOF. The diagram of representations (9.3.2) follows from the definition 9.3.1 and from the theorem 9.2.2. Since transformation $g_2(a)$ is endomorphism of Z -module V , we obtain the equality (9.3.3). \square

THEOREM 9.3.3. Let V be D -module. For any vector $v \in V$, vector generated by the diagram of representations (9.3.2) has the following form

$$(9.3.4) \quad (a + n)v = av + nv \quad a \in D \quad n \in Z$$

9.3.3.1: The set of maps

$$(9.3.5) \quad a + n : v \in V \rightarrow (a + n)v \in V$$

generates^{9.1} ring $D_{(1)}$ where the sum is defined by the equality

$$(9.3.6) \quad (a + n) + (b + m) = (a + b) + (n + m)$$

and the product is defined by the equality

$$(9.3.7) \quad (a + n)(b + m) = (ab + ma + nb) + (nm)$$

The ring $D_{(1)}$ is called **unital extension** of the ring D .

If ring D has unit, then	$Z \subseteq D$	$D_{(1)} = D$
If ring D is ideal of Z , then	$D \subseteq Z$	$D_{(1)} = Z$
Otherwise	$D_{(1)} = D \oplus Z$	

9.3.3.2: The ring D is ideal of ring $D_{(1)}$.

9.3.3.3: The set of transformations (9.3.4) is representation of ring $D_{(1)}$ in Abelian group V .

We use the notation $D_{(1)}v$ for the set of vectors generated by vector v .

THEOREM 9.3.4. Following conditions hold for D -module V :

9.3.4.1: **associative law**

$$(9.3.8) \quad (pq)v = p(qv)$$

9.3.4.2: **distributive law**

$$(9.3.9) \quad p(v + w) = pv + pw$$

$$(9.3.10) \quad (p + q)v = pv + qv$$

9.3.4.3: **unitarity law**

$$(9.3.11) \quad 1v = v$$

for any $p, q \in D_{(1)}$, $v, w \in V$.

PROOF OF THEOREMS 9.3.3, 9.3.4. Let $v \in V$.

LEMMA 9.3.5. Let $n \in Z$, $a \in D$. The map (9.3.5) is endomorphism of Abelian group V .

^{9.1} See the definition of unital extension also on the pages [6]-52, [7]-64.

PROOF. Statements $nv \in V$, $av \in V$ follow from the theorems 6.1.4, 9.3.2. Since V is Abelian group, then

$$nv + av \in V \quad n \in Z \quad a \in D$$

Therefore, for any Z -number n and for any D -number a , we defined the map (9.3.5). Since transformation $g_1(n)$ and transformation $g_2(a)$ are endomorphisms of Abelian group V , then the map (9.3.5) is endomorphism of Abelian group V . \odot

Let $D_{(1)}$ be the set of maps (9.3.5). The equality (9.3.9) follows from the lemma 9.3.5.

Let $p = a + n \in D_{(1)}$, $q = b + m \in D_{(1)}$. According to the statement 9.3.3.3, we define the sum of $D_{(1)}$ -numbers p and q by the equality (9.3.10). The equality

$$(9.3.12) \quad ((a + n) + (b + m))v = (a + n)v + (b + m)v$$

follows from the equality (9.3.10). Since representation g_1 is homomorphism of the additive group of ring Z , we obtain the equality

$$(9.3.13) \quad (n + m)v = nv + mv$$

Since representation g_2 is homomorphism of the additive group of ring D , we obtain the equality

$$(9.3.14) \quad (a + b)v = av + bv$$

Since V is Abelian group, then the equality

$$(9.3.15) \quad \begin{aligned} ((a + n) + (b + m))v &= av + nv + bv + mv = av + bv + nv + mv \\ &= (a + b)v + (n + m)v = ((a + b) + (n + m))v \end{aligned}$$

follows from equalities (9.3.12), (9.3.13), (9.3.14). From the equality (9.3.15), it follows that the definition (9.3.6) of sum on the set $D_{(1)}$ does not depend on vector v .

Equalities (9.3.8), (9.3.11) follow from the statement 9.3.3.3. Let $p = a + n \in D_{(1)}$, $q = b + m \in D_{(1)}$. Since representation g_1 is representation of the multiplicative group of ring Z , we obtain the equality

$$(9.3.16) \quad (mn)v = m(nv)$$

Since representation g_2 is representation of the multiplicative group of ring D , we obtain the equality

$$(9.3.17) \quad (ab)v = a(bv)$$

Since the ring D is Abelian group, we obtain the equality

$$(9.3.18) \quad (md)v = m(dv)$$

The equality

$$(9.3.19) \quad \begin{aligned} ((a + n)(b + m))v &= (a + n)((b + m)v) = (a + n)(bv + mv) \\ &= a(bv + mv) + n(bv + mv) \\ &= a(bv) + a(mv) + n(bv) + n(mv) \\ &= (ab)v + m(av) + n(bv) + (nm)v \\ &= (ab)v + (ma)v + (nb)v + (nm)v \\ &= ((ab + ma + nb) + nm)v \end{aligned}$$

follows from equalities (9.3.3), (9.3.4), (9.3.8), (9.3.16), (9.3.17), (9.3.18). The equality (9.3.7) follows from the equality (9.3.19).

The statement 9.3.3.2 follows from the equality (9.3.7). \square

THEOREM 9.3.6. *Let V be D -module. The set of vectors generated by the set of vectors $v = (v_i \in V, i \in I)$ has form^{9.2}*

$$(9.3.20) \quad J(v) = \left\{ w : w = \sum_{i \in I} c^i v_i, c^i \in D_{(1)}, |\{i : c^i \neq 0\}| < \infty \right\}$$

PROOF. We prove the theorem by induction based on the theorem 6.1.4, According to the theorem 6.1.4, we need to prove following statements:

$$9.3.6.1: v_k \in X_0 \subseteq J(v)$$

$$9.3.6.2: c^k v_k \in J(v), c^k \in D_{(1)}, k \in I$$

$$9.3.6.3: \sum_{k \in I} c^k v_k \in J(v), c^k \in D_{(1)}, |\{i : c^i \neq 0\}| < \infty$$

$$9.3.6.4: v, w \in J(v) \Rightarrow v + w \in J(v)$$

$$9.3.6.5: a \in D, v \in J(v) \Rightarrow av \in J(v)$$

- For any $v_k \in v$, let $c^i = \delta_k^i \in D_{(1)}$. Then

$$(9.3.21) \quad v_k = \sum_{i \in I} c^i v_i$$

The statement 9.3.6.1 follows from (9.3.20), (9.3.21).

- The statement 9.3.6.2 follow from the theorems 6.1.4, 9.3.3 and from the statement 9.3.6.1.
- Since V is Abelian group, then the statement 9.3.6.3 follows from the statement 9.3.6.2 and from theorems 6.1.4, 9.2.3.
- Let $w_1, w_2 \in X_k \subseteq J(v)$. Since V is Abelian group, then, according to the statement 6.1.4.3,

$$(9.3.22) \quad w_1 + w_2 \in X_{k+1}$$

According to the equality (9.3.20), there exist $D_{(1)}$ -numbers $w_1^i, w_2^i, i \in I$, such that

$$(9.3.23) \quad w_1 = \sum_{i \in I} w_1^i v_i \quad w_2 = \sum_{i \in I} w_2^i v_i$$

where sets

$$(9.3.24) \quad H_1 = \{i \in I : w_1^i \neq 0\} \quad H_2 = \{i \in I : w_2^i \neq 0\}$$

are finite. Since V is Abelian group, then from the equality (9.3.23) it follows that

$$(9.3.25) \quad w_1 + w_2 = \sum_{i \in I} w_1^i v_i + \sum_{i \in I} w_2^i v_i = \sum_{i \in I} (w_1^i v_i + w_2^i v_i)$$

The equality

$$(9.3.26) \quad w_1 + w_2 = \sum_{i \in I} (w_1^i + w_2^i) v_i$$

^{9.2} For a set A , we denote by $|A|$ the cardinal number of the set A . The notation $|A| < \infty$ means that the set A is finite.

follows from equalities (9.3.10), (9.3.25). From the equality (9.3.24), it follows that the set

$$\{\mathbf{i} \in \mathbf{I} : w_1^{\mathbf{i}} + w_2^{\mathbf{i}} \neq 0\} \subseteq H_1 \cup H_2$$

is finite.

- Let $w \in X_k \subseteq J(v)$. According to the statement 6.1.4.4, for any $D_{(1)}$ -number a ,

$$(9.3.27) \quad aw \in X_{k+1}$$

According to the equality (9.3.20), there exist $D_{(1)}$ -numbers $w^{\mathbf{i}}$, $\mathbf{i} \in \mathbf{I}$, such that

$$(9.3.28) \quad w = \sum_{\mathbf{i} \in \mathbf{I}} w^{\mathbf{i}} v_{\mathbf{i}}$$

where

$$(9.3.29) \quad |\{\mathbf{i} \in \mathbf{I} : w^{\mathbf{i}} \neq 0\}| < \infty$$

From the equality (9.3.28) it follows that

$$(9.3.30) \quad aw = a \sum_{\mathbf{i} \in \mathbf{I}} w^{\mathbf{i}} v_{\mathbf{i}} = \sum_{\mathbf{i} \in \mathbf{I}} a(w^{\mathbf{i}} v_{\mathbf{i}}) = \sum_{\mathbf{i} \in \mathbf{I}} (aw^{\mathbf{i}}) v_{\mathbf{i}}$$

From the statement (9.3.29), it follows that the set $\{\mathbf{i} \in \mathbf{I} : aw^{\mathbf{i}} \neq 0\}$ is finite.

From equalities (9.3.22), (9.3.26), (9.3.27), (9.3.30), it follows that $X_{k+1} \subseteq J(v)$. \square

DEFINITION 9.3.7. Let $v = (v_{\mathbf{i}} \in V, \mathbf{i} \in \mathbf{I})$ be set of vectors. The expression $w^{\mathbf{i}} v_{\mathbf{i}}$ is called **linear combination** of vectors $v_{\mathbf{i}}$. A vector $\bar{w} = w^{\mathbf{i}} v_{\mathbf{i}}$ is called **linearly dependent** on vectors $v_{\mathbf{i}}$. \square

We represent the set of $D_{(1)}$ -numbers $w^{\mathbf{i}}$, $\mathbf{i} \in \mathbf{I}$, as matrix

$$w = \begin{pmatrix} w^{\mathbf{1}} \\ \dots \\ w^{\mathbf{n}} \end{pmatrix}$$

We represent the set of vectors $v_{\mathbf{i}}$, $\mathbf{i} \in \mathbf{I}$, as matrix

$$v = \begin{pmatrix} v_{\mathbf{1}} & \dots & v_{\mathbf{n}} \end{pmatrix}$$

Then we can represent linear combination of vectors $\bar{w} = w^{\mathbf{i}} v_{\mathbf{i}}$ as

$$\bar{w} = w^* v$$

THEOREM 9.3.8. Let D be field. Since the equation

$$w^{\mathbf{i}} v_{\mathbf{i}} = 0$$

implies existence of index $\mathbf{i} = \mathbf{j}$ such that $w^{\mathbf{j}} \neq 0$, then the vector $v_{\mathbf{j}}$ linearly depends on rest of vectors v .

PROOF. The theorem follows from the equality

$$v_j = \sum_{i \in I \setminus \{j\}} \frac{w^i}{w^j} v_i$$

and from the definition 9.3.7. □

It is evident that for any set of vectors v_i

$$w^i = 0 \Rightarrow w^* v = 0$$

DEFINITION 9.3.9. The set of vectors^{9.3} $v_i, i \in I$, of D -module V is **linearly independent** if $w = 0$ follows from the equation

$$w^i v_i = 0$$

Otherwise the set of vectors $v_i, i \in I$, is **linearly dependent**. □

The following definition follows from the theorems 9.3.6, 6.1.4 and from the definition 6.1.5.

DEFINITION 9.3.10. $J(v)$ is called **submodule generated by set v** , and v is a **generating set** of submodule $J(v)$. In particular, a **generating set** of D -module V is a subset $X \subset V$ such that $J(X) = V$. □

The following definition follows from the theorems 9.3.6, 6.1.4 and from the definition 6.2.6.

DEFINITION 9.3.11. If the set $X \subset V$ is generating set of D -module V , then any set $Y, X \subset Y \subset V$ also is generating set of D -module V . If there exists minimal set X generating the D -module V , then the set X is called **basis** of D -module V . □

THEOREM 9.3.12. The set of vectors $\bar{e} = (e_i, i \in I)$ is basis of D -module V , if following statements are true.

9.3.12.1: Arbitrary vector $v \in V$ is linear combination of vectors of the set \bar{e} .

9.3.12.2: Vector e_i cannot be represented as a linear combination of the remaining vectors of the set \bar{e} .

PROOF. According to the statement 9.3.12.1, the theorem 9.3.6 and the definition 9.3.7, the set \bar{e} generates D -module V (the definition 9.3.10). According to the statement 9.3.12.2, the set \bar{e} is minimal set generating D -module V . According to the definitions 9.3.11, the set \bar{e} is a basis of D -module V . □

THEOREM 9.3.13. Let D be field. The set of vectors $\bar{e} = (e_i, i \in I)$ is a **basis of D -vector space V** if vectors e_i are linearly independent and any vector $v \in V$ linearly depends on vectors e_i .

PROOF. Let the set of vectors $e_i, i \in I$, be linear dependent. Then the equation

$$w^i e_i = 0$$

implies existence of index $i = j$ such that $w^j \neq 0$. According to the theorem 9.3.8, the vector e_j linearly depends on rest of vectors of the set \bar{e} . According to the definition 9.3.11, the set of vectors $e_i, i \in I$, is not a basis for D -vector space V .

^{9.3} I follow to the definition in [2], page 130.

Therefore, if the set of vectors $e_i, i \in I$, is a basis, then these vectors are linearly independent. Since an arbitrary vector $v \in V$ is linear combination of vectors $e_i, i \in I$, then the set of vectors $v, e_i, i \in I$, is not linearly independent. \square

DEFINITION 9.3.14. Let \bar{e} be the basis of D -module V and vector $\bar{v} \in V$ has expansion

$$\bar{v} = v^* *_i e = v^i e_i$$

with respect to the basis \bar{e} . $D_{(1)}$ -numbers v^i are called **coordinates** of vector \bar{v} with respect to the basis \bar{e} . Matrix of $D_{(1)}$ -numbers $v = (v^i, i \in I)$ is called **coordinate matrix of vector \bar{v}** in basis \bar{e} . \square

THEOREM 9.3.15. Let D be ring. Let \bar{e} be basis of D -module V . Let

$$(9.3.31) \quad w^i e_i = 0$$

be linear dependence of vectors of the basis \bar{e} . Then

9.3.15.1: $D_{(1)}$ -number $w^i, i \in I$, does not have inverse element in ring $D_{(1)}$.

9.3.15.2: The set D' of matrices $w = (w^i, i \in I)$ generates D -module.

PROOF. Let there exist matrix $w = (w^i, i \in I)$ such that the equality (9.3.31) is true and there exist index $i = j$ such that $w^j \neq 0$. If we assume that $D_{(1)}$ -number c^j has inverse one, then the equality

$$e_j = \sum_{i \in I \setminus \{j\}} \frac{w^i}{w^j} e_i$$

follows from the equality (9.3.31). Therefore, the vector e_j is linear combination of other vectors of the set \bar{e} and the set \bar{e} is not basis. Therefore, our assumption is false, and $D_{(1)}$ -number c^j does not have inverse.

Let matrices $b = (b^i, i \in I) \in D'$, $c = (c^i, i \in I) \in D'$. From equalities

$$b^i e_i = 0$$

$$c^i e_i = 0$$

it follows that

$$(b^i + c^i) e_i = 0$$

Therefore, the set D' is Abelian group.

Let matrix $c = (c^i, i \in I) \in D'$ and $a \in D$. From the equality

$$w^i e_i = 0$$

it follows that

$$(ac^i) e_i = 0$$

Therefore, Abelian group D' is D -module. \square

THEOREM 9.3.16. Let D -module V have the basis \bar{e} such that in the equality

$$(9.3.32) \quad w^i e_i = 0$$

there exists index $i = j$ such that $w^j \neq 0$. Then

9.3.16.1: The matrix $w = (w^i, i \in I)$ determines coordinates of vector $0 \in V$ with respect to basis \bar{e} .

9.3.16.2: Coordinates of vector \bar{v} with respect to basis \bar{e} are uniquely determined up to a choice of coordinates of vector $0 \in V$.

PROOF. The statement 9.3.16.1 follows from the equality (9.3.32) and from the definition 9.3.14.

Let vector \bar{v} have expansion

$$(9.3.33) \quad \bar{v} = v^* *_e = v^i e_i$$

with respect to basis \bar{e} . The equality

$$(9.3.34) \quad \bar{v} = \bar{v} + 0 = v^i e_i + c^i e_i = (v^i + c^i) e_i$$

follows from equalities (9.3.32), (9.3.33). The statement 9.3.16.2 follows from equalities (9.3.33), (9.3.34) and from the definition 9.3.14. \square

DEFINITION 9.3.17. The D -module V is **free D -module**,^{9.4} if D -module V has basis and vectors of the basis are linearly independent. \square

THEOREM 9.3.18. Coordinates of vector $v \in V$ relative to basis \bar{e} of free D -module V are uniquely defined.

PROOF. The theorem follows from the theorem 9.3.16 and from definitions 9.3.9, 9.3.17. \square

EXAMPLE 9.3.19. From the theorem 9.2.2 and the definition 9.3.1, it follows that Abelian group G is module over ring of integers Z . \square

9.3.2. Linear Map.

DEFINITION 9.3.20. Morphism of representations

$$\left(h : D_1 \rightarrow D_2 \quad f : V_1 \rightarrow V_2 \right)$$

of D_1 -module A_1 into D_2 -module A_2 is called **linear map** of D_1 -module A_1 into D_2 -module A_2 . Let us denote $\mathcal{L}(D_1 \rightarrow D_2; A_1 \rightarrow A_2)$ set of linear maps of D_1 -module A_1 into D_2 -module A_2 . \square

If the map

$$f : A_1 \rightarrow A_2$$

is linear map of D -algebra A_1 into D -algebra A_2 , then I use notation

$$f \circ a = f(a)$$

for image of the map f .

THEOREM 9.3.21. Linear map

$$\left(h : D_1 \rightarrow D_2 \quad f : A_1 \rightarrow A_2 \right)$$

of D_1 -module A_1 into D_2 -module A_2 satisfies to equations^{9.5}

$$(9.3.35) \quad h(d_1 + d_2) = h(d_1) + h(d_2)$$

$$(9.3.36) \quad h(d_1 d_2) = h(d_1) h(d_2)$$

$$(9.3.37) \quad f \circ (a + b) = f \circ a + f \circ b$$

$$(9.3.38) \quad f \circ (da) = h(d)(f \circ a)$$

$$a, b \in A_1 \quad d, d_1, d_2 \in D_1$$

^{9.4} I follow to the definition in [2], page 135.

^{9.5} In some books (for instance, on page [2]-119) the theorem 9.3.21 is considered as a definition.

PROOF. From definitions 3.2.2, 9.3.20, it follows that the map h is a homomorphism of the ring D_1 into the ring D_2 (the equalities (9.3.35), (9.3.36)) and the map f is a homomorphism of the Abelian group A_1 into the Abelian group A_2 (the equality (9.3.37)). The equality (9.3.38) follows from the equality (3.2.3). \square

THEOREM 9.3.22. *Let*

$$\bar{e}_1 = (e_{1,i}, i \in I)$$

be a basis of D_1 -module A_1 . *Let*

$$\bar{e}_2 = (e_{2,j}, j \in J)$$

be a basis of D_2 -module A_2 . *Then linear map*

$$\left(h : D_1 \rightarrow D_2 \quad \bar{f} : A_1 \rightarrow A_2 \right)$$

has presentation

$$(9.3.39) \quad b = h(a) *_* f$$

relative to selected bases. Here

- a is coordinate matrix of A_1 -number \bar{a} relative the basis \bar{e}_1

$$(9.3.40) \quad \bar{a} = a *_* e_1$$

- $h(a) = (h(a_i), i \in I)$ is a matrix of D_2 -numbers.
- b is coordinate matrix of vector

$$(9.3.41) \quad \bar{b} = \bar{f} \circ \bar{a}$$

relative the basis \bar{e}_2

$$(9.3.42) \quad \bar{b} = b *_* e_2$$

- f is coordinate matrix of set of vectors $(\bar{f} \circ e_{1,i}, i \in I)$ relative the basis \bar{e}_2 . The matrix f is called **matrix of linear map \bar{f}** relative bases \bar{e}_1 and \bar{e}_2 .

PROOF. Since

$$\left(h : D_1 \rightarrow D_2 \quad \bar{f} : A_1 \rightarrow A_2 \right)$$

is a linear map, then the equality

$$(9.3.43) \quad \bar{b} = \bar{f} \circ \bar{a} = \bar{f} \circ (a *_* e_1) = h(a) *_* (\bar{f} \circ e_1)$$

follows from equalities (9.3.38), (9.3.40), (9.3.41). A_2 -number $\bar{f} \circ e_{1,i}$ has expansion

$$(9.3.44) \quad \bar{f} \circ e_{1,i} = f_i *_* e_2 = f_i^j e_{2,j}$$

relative to basis \bar{e}_2 . Combining (9.3.43) and (9.3.44), we get

$$(9.3.45) \quad \bar{b} = h(a) *_* f *_* e_2$$

(9.3.39) follows from comparison of (9.3.42) and (9.3.45) and theorem 9.3.18. \square

DEFINITION 9.3.23. *Reduced morphism of representations*

$$f : A_1 \rightarrow A_2$$

of D -module A_1 into D -module A_2 is called **linear map** of D -module A_1 into D -module A_2 . Let us denote $\mathcal{L}(D; A_1 \rightarrow A_2)$ set of linear maps of D -module A_1 into D -module A_2 . \square

THEOREM 9.3.24. *Linear map*

$$f : A_1 \rightarrow A_2$$

of D -module A_1 into D -module A_2 satisfies to equations^{9.6}

$$(9.3.46) \quad f \circ (a + b) = f \circ a + f \circ b$$

$$(9.3.47) \quad f \circ (da) = d(f \circ a)$$

$$a, b \in A_1 \quad d \in D$$

PROOF. From definitions 3.4.2, 9.3.23, it follows that the map f is a homomorphism of the Abelian group A_1 into the Abelian group A_2 (the equality (9.3.46)). The equality (9.3.47) follows from the equality (3.4.4). \square

THEOREM 9.3.25. *Let*

$$\bar{e}_1 = (e_{1 \cdot i}, i \in I)$$

be a basis of D -module A_1 . Let

$$\bar{e}_2 = (e_{2 \cdot j}, j \in J)$$

be a basis of D -module A_2 . Then linear map

$$\bar{f} : A_1 \rightarrow A_2$$

has presentation

$$(9.3.48) \quad b = a *_f$$

relative to selected bases. Here

- a is coordinate matrix of A_1 -number \bar{a} relative the basis \bar{e}_1

$$(9.3.49) \quad \bar{a} = a *_f e_1$$

- b is coordinate matrix of vector

$$(9.3.50) \quad \bar{b} = \bar{f} \circ \bar{a}$$

relative the basis \bar{e}_2

$$(9.3.51) \quad \bar{b} = b *_f e_2$$

- f is coordinate matrix of set of vectors $(\bar{f} \circ e_{1 \cdot i}, i \in I)$ relative the basis \bar{e}_2 . The matrix f is called **matrix of linear map \bar{f}** relative bases \bar{e}_1 and \bar{e}_2 .

PROOF. Since

$$\bar{f} : A_1 \rightarrow A_2$$

is a linear map, then the equality

$$(9.3.52) \quad \bar{b} = \bar{f} \circ \bar{a} = \bar{f} \circ (a *_f e_1) = a *_f (\bar{f} \circ e_1)$$

follows from equalities (9.3.47), (9.3.49), (9.3.50). A_2 -number $\bar{f} \circ e_{1 \cdot i}$ has expansion

$$(9.3.53) \quad \bar{f} \circ e_{1 \cdot i} = f_i *_f e_2 = f_i^j e_{2 \cdot j}$$

relative to basis \bar{e}_2 . Combining (9.3.52) and (9.3.53), we get

$$(9.3.54) \quad \bar{b} = a *_f f^*_f e_2$$

(9.3.48) follows from comparison of (9.3.51) and (9.3.54) and theorem 9.3.18. \square

^{9.6} In some books (for instance, on page [2]-119) the theorem 9.3.24 is considered as a definition.

9.3.3. Polylinear Map.

DEFINITION 9.3.26. Let D be the commutative ring. Reduced polymorphism of D -modules A_1, \dots, A_n into D -module S

$$f : A_1 \times \dots \times A_n \rightarrow S$$

is called **polylinear map** of D -modules A_1, \dots, A_n into D -module S . We denote $\mathcal{L}(D; A_1 \times \dots \times A_n \rightarrow S)$ the set of polylinear maps of D -modules A_1, \dots, A_n into D -module S . Let us denote $\mathcal{L}(D; A^n \rightarrow S)$ set of n -linear maps of D -module A ($A_1 = \dots = A_n = A$) into D -module S . \square

THEOREM 9.3.27. Let D be the commutative ring. The polylinear map of D -modules A_1, \dots, A_n into D -module S

$$f : A_1 \times \dots \times A_n \rightarrow S$$

satisfies to equalities

$$\begin{aligned} f \circ (a_1, \dots, a_i + b_i, \dots, a_n) &= f \circ (a_1, \dots, a_i, \dots, a_n) + f \circ (a_1, \dots, b_i, \dots, a_n) \\ f \circ (a_1, \dots, pa_i, \dots, a_n) &= pf \circ (a_1, \dots, a_i, \dots, a_n) \\ f \circ (a_1, \dots, a_i + b_i, \dots, a_n) &= f \circ (a_1, \dots, a_i, \dots, a_n) + f \circ (a_1, \dots, b_i, \dots, a_n) \\ f \circ (a_1, \dots, pa_i, \dots, a_n) &= pf \circ (a_1, \dots, a_i, \dots, a_n) \\ 1 \leq i \leq n \quad a_i, b_i \in A_i \quad p \in D \end{aligned}$$

PROOF. The theorem follows from definitions 4.4.4, 9.3.23, 9.3.26 and from the theorem 9.3.24. \square

THEOREM 9.3.28. Let D be the commutative ring. Let A_1, \dots, A_n, S be D -modules. The map

$$(9.3.55) \quad f + g : A_1 \times \dots \times A_n \rightarrow S \quad f, g \in \mathcal{L}(D; A_1 \times \dots \times A_n \rightarrow S)$$

defined by the equality

$$(9.3.56) \quad (f + g) \circ (a_1, \dots, a_n) = f \circ (a_1, \dots, a_n) + g \circ (a_1, \dots, a_n)$$

is called **sum of polylinear maps** f and g and is polylinear map. The set $\mathcal{L}(D; A_1 \times \dots \times A_n \rightarrow S)$ is an Abelian group relative sum of maps.

PROOF. According to the theorem 9.3.27

$$(9.3.57) \quad f \circ (a_1, \dots, a_i + b_i, \dots, a_n) = f \circ (a_1, \dots, a_i, \dots, a_n) + f \circ (a_1, \dots, b_i, \dots, a_n)$$

$$(9.3.58) \quad f \circ (a_1, \dots, pa_i, \dots, a_n) = pf \circ (a_1, \dots, a_i, \dots, a_n)$$

$$(9.3.59) \quad g \circ (a_1, \dots, a_i + b_i, \dots, a_n) = g \circ (a_1, \dots, a_i, \dots, a_n) + g \circ (a_1, \dots, b_i, \dots, a_n)$$

$$(9.3.60) \quad g \circ (a_1, \dots, pa_i, \dots, a_n) = pg \circ (a_1, \dots, a_i, \dots, a_n)$$

The equality

$$\begin{aligned} & (f + g) \circ (x_1, \dots, x_i + y_i, \dots, x_n) \\ &= f \circ (x_1, \dots, x_i + y_i, \dots, x_n) + g \circ (x_1, \dots, x_i + y_i, \dots, x_n) \\ (9.3.61) \quad &= f \circ (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) + f \circ (x_1, \dots, y_i, \dots, x_n) \\ &+ g \circ (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) + g \circ (x_1, \dots, y_i, \dots, x_n) \\ &= (f + g) \circ (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) + (f + g) \circ (x_1, \dots, y_i, \dots, x_n) \end{aligned}$$

follows from the equalities (9.3.56), (9.3.57), (9.3.59). The equality

$$\begin{aligned}
 & (f + g) \circ (x_1, \dots, px_i, \dots, x_n) \\
 &= f \circ (x_1, \dots, px_i, \dots, x_n) + g \circ (x_1, \dots, px_i, \dots, x_n) \\
 (9.3.62) \quad &= pf \circ (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) + pg \circ (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) \\
 &= p(f \circ (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) + g \circ (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)) \\
 &= p(f + g) \circ (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)
 \end{aligned}$$

follows from the equalities (9.3.56), (9.3.58), (9.3.60). From equalities (9.3.61), (9.3.62) and from the theorem 9.3.27, it follows that the map (9.3.55) is linear map of D -modules.

Let $f, g, h \in \mathcal{L}(D; A_1 \times \dots \times A_n \rightarrow S)$. For any $a = (a_1, \dots, a_n)$, $a_1 \in A_1, \dots, a_n \in A_n$,

$$\begin{aligned}
 (f + g) \circ a &= f \circ a + g \circ a = g \circ a + f \circ a \\
 &= (g + f) \circ a \\
 ((f + g) + h) \circ a &= (f + g) \circ a + h \circ a = (f \circ a + g \circ a) + h \circ a \\
 &= f \circ a + (g \circ a + h \circ a) = f \circ a + (g + h) \circ a \\
 &= (f + (g + h)) \circ a
 \end{aligned}$$

Therefore, sum of polylinear maps is commutative and associative.

From the equality (9.3.56), it follows that the map

$$0 : v \in A_1 \times \dots \times A_n \rightarrow 0 \in S$$

is zero of addition

$$(0 + f) \circ (a_1, \dots, a_n) = 0 \circ (a_1, \dots, a_n) + f \circ (a_1, \dots, a_n) = f \circ (a_1, \dots, a_n)$$

From the equality (9.3.56), it follows that the map

$$-f : (a_1, \dots, a_n) \in A_1 \times \dots \times A_n \rightarrow -(f \circ (a_1, \dots, a_n)) \in S$$

is map inversed to map f

$$f + (-f) = 0$$

because

$$\begin{aligned}
 (f + (-f)) \circ (a_1, \dots, a_n) &= f \circ (a_1, \dots, a_n) + (-f) \circ (a_1, \dots, a_n) \\
 &= f \circ (a_1, \dots, a_n) - f \circ (a_1, \dots, a_n) \\
 &= 0 = 0 \circ (a_1, \dots, a_n)
 \end{aligned}$$

From the equality

$$\begin{aligned}
 (f + g) \circ (a_1, \dots, a_n) &= f \circ (a_1, \dots, a_n) + g \circ (a_1, \dots, a_n) \\
 &= g \circ (a_1, \dots, a_n) + f \circ (a_1, \dots, a_n) \\
 &= (g + f) \circ (a_1, \dots, a_n)
 \end{aligned}$$

it follows that sum of maps is commutative. Therefore, the set $\mathcal{L}(D; A_1 \times \dots \times A_n \rightarrow S)$ is an Abelian group. \square

COROLLARY 9.3.29. *Let A_1, A_2 be D -modules. The map*

$$(9.3.63) \quad f + g : A_1 \rightarrow A_2 \quad f, g \in \mathcal{L}(D; A_1 \rightarrow A_2)$$

defined by equation

$$(9.3.64) \quad (f + g) \circ x = f \circ x + g \circ x$$

is called **sum of maps** f and g and is linear map. The set $\mathcal{L}(D; A_1; A_2)$ is an Abelian group relative sum of maps. \square

THEOREM 9.3.30. Let D be the commutative ring. Let A_1, \dots, A_n, S be D -modules. The map

$$(9.3.65) \quad df : A_1 \times \dots \times A_n \rightarrow S \quad d \in D \quad f \in \mathcal{L}(D; A_1 \times \dots \times A_n \rightarrow S)$$

defined by equality

$$(9.3.66) \quad (df) \circ (a_1, \dots, a_n) = d(f \circ (a_1, \dots, a_n))$$

is polylinear map and is called **product of map f over scalar d** . The representation

$$(9.3.67) \quad a : f \in \mathcal{L}(D; A_1 \times \dots \times A_n \rightarrow S) \rightarrow af \in \mathcal{L}(D; A_1 \times \dots \times A_n \rightarrow S)$$

of ring D in Abelian group $\mathcal{L}(D; A_1 \times \dots \times A_n \rightarrow S)$ generates structure of D -module.

PROOF. According to the theorem 9.3.27

$$(9.3.68) \quad f \circ (a_1, \dots, a_i + b_i, \dots, a_n) = f \circ (a_1, \dots, a_i, \dots, a_n) + f \circ (a_1, \dots, b_i, \dots, a_n)$$

$$(9.3.69) \quad f \circ (a_1, \dots, pa_i, \dots, a_n) = pf \circ (a_1, \dots, a_i, \dots, a_n)$$

The equality

$$(9.3.70) \quad \begin{aligned} & (pf) \circ (x_1, \dots, x_i + y_i, \dots, x_n) \\ &= p f \circ (x_1, \dots, x_i + y_i, \dots, x_n) \\ &= p (f \circ (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) + f \circ (x_1, \dots, y_i, \dots, x_n)) \\ &= p(f \circ (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)) + p(f \circ (x_1, \dots, y_i, \dots, x_n)) \\ &= (pf) \circ (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) + (pf) \circ (x_1, \dots, y_i, \dots, x_n) \end{aligned}$$

follows from equalities (9.3.66), (9.3.68). The equality

$$(9.3.71) \quad \begin{aligned} & (pf) \circ (x_1, \dots, qx_i, \dots, x_n) \\ &= p(f \circ (x_1, \dots, qx_i, \dots, x_n)) = pq(f \circ (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)) \\ &= qp(f \circ (x_1, \dots, x_n)) = q(pf) \circ (x_1, \dots, x_n) \end{aligned}$$

follows from equalities (9.3.66), (9.3.69). From equalities (9.3.70), (9.3.71) and from the theorem 9.3.27, it follows that the map (9.3.65) is polylinear map of D -modules.

The equality

$$(9.3.72) \quad (p + q)f = pf + qf$$

follows from the equality

$$\begin{aligned} ((p + q)f) \circ (x_1, \dots, x_n) &= (p + q)(f \circ (x_1, \dots, x_n)) \\ &= p(f \circ (x_1, \dots, x_n)) + q(f \circ (x_1, \dots, x_n)) \\ &= (pf) \circ (x_1, \dots, x_n) + (qf) \circ (x_1, \dots, x_n) \end{aligned}$$

The equality

$$(9.3.73) \quad p(qf) = (pq)f$$

follows from the equality

$$\begin{aligned} (p(qf)) \circ (x_1, \dots, x_n) &= p(qf) \circ (x_1, \dots, x_n) = p(q \circ f \circ (x_1, \dots, x_n)) \\ &= (pq) \circ f \circ (x_1, \dots, x_n) = ((pq)f) \circ (x_1, \dots, x_n) \end{aligned}$$

From equalities (9.3.72) (9.3.73) it follows that the map (9.3.67) is representation of ring D in Abelian group $\mathcal{L}(D; A_1 \times \dots \times A_n \rightarrow S)$. Since specified representation is effective, then, according to the definition 9.3.1 and the theorem 9.3.28, Abelian group $\mathcal{L}(D; A_1 \rightarrow A_2)$ is D -module. \square

COROLLARY 9.3.31. *Let A_1, A_2 be D -modules. The map*

$$(9.3.74) \quad df : A_1 \rightarrow A_2 \quad d \in D \quad f \in \mathcal{L}(D; A_1 \rightarrow A_2)$$

defined by equality

$$(9.3.75) \quad (df) \circ x = d(f \circ x)$$

*is linear map and is called **product of map f over scalar d** . The representation*

$$(9.3.76) \quad a : f \in \mathcal{L}(D; A_1 \rightarrow A_2) \rightarrow af \in \mathcal{L}(D; A_1 \rightarrow A_2)$$

of ring D in Abelian group $\mathcal{L}(D; A_1 \rightarrow A_2)$ generates structure of D -module. \square

9.4. Algebra over Commutative Ring

DEFINITION 9.4.1. *Let D be commutative ring. D -module A is called **algebra over ring D** or **D -algebra**, if we defined product^{9.7} in A*

$$(9.4.1) \quad vw = C \circ (v, w)$$

where C is bilinear map

$$C : A \times A \rightarrow A$$

*If A is free D -module, then A is called **free algebra over ring D** . \square*

THEOREM 9.4.2. *Let D be commutative ring and A be Abelian group. The diagram of representations*

$$\begin{array}{ccc} D & \xrightarrow{g_{12}} & A & \xrightarrow{g_{23}} & A & & g_{12}(d) : v \rightarrow dv \\ & & & & \uparrow g_{12} & & g_{23}(v) : w \rightarrow C \circ (v, w) \\ & & & & D & & C \in \mathcal{L}(D; A^2 \rightarrow A) \end{array}$$

generates the structure of D -algebra A .

PROOF. The structure of D -module A is generated by effective representation

$$g_{12} : D \xrightarrow{*} A$$

of ring D in Abelian group A .

^{9.7} I follow the definition given in [20], page 1, [13], page 4. The statement which is true for any D -module, is true also for D -algebra.

LEMMA 9.4.3. *Let the structure of D -algebra A defined in D -module A , be generated by product*

$$v w = C \circ (v, w)$$

Left shift of D -module A defined by equation

$$(9.4.2) \quad l \circ v : w \in A \rightarrow v w \in A$$

generates the representation

$$A \xrightarrow{g_{23}} A \quad \begin{array}{l} g_{23} : v \rightarrow l \circ v \\ g_{23} \circ v : w \rightarrow (l \circ v) \circ w \end{array}$$

of D -module A in D -module A

PROOF. According to definitions 9.4.1 and 9.3.26, left shift of D -module A is linear map. According to the definition 9.3.23, the map $l(v)$ is endomorphism of D -module A . The equation

$$(9.4.3) \quad (l \circ (v_1 + v_2)) \circ w = (v_1 + v_2)w = v_1w + v_2w = (l \circ v_1) \circ w + (l \circ v_2) \circ w$$

follows from the definition 9.3.26 and from the equation (9.4.2). According to the corollary 9.3.29, the equation

$$(9.4.4) \quad l \circ (v_1 + v_2) = l \circ v_1 + l \circ v_2$$

follows from equation (9.4.3). The equation

$$(9.4.5) \quad (l \circ (dv)) \circ w = (dv)w = d(vw) = d((l \circ v) \circ w)$$

follows from the definition 9.3.26 and from the equation (9.4.2). 9.3.29, the equation

$$(9.4.6) \quad l \circ (dv) = d(l \circ v)$$

follows from equation (9.4.5). The lemma follows from equalities (9.4.4), (9.4.6). \odot

LEMMA 9.4.4. *The representation*

$$A \xrightarrow{g_{23}} A \quad \begin{array}{l} g_{23} : v \rightarrow l \circ v \\ g_{23} \circ v : w \rightarrow (l \circ v) \circ w \end{array}$$

of D -module A in D -module A determines the product in D -module A according to rule

$$ab = (g_{23} \circ a) \circ b$$

PROOF. Since map $g_{23} \circ v$ is endomorphism of D -module A , then

$$(9.4.7) \quad \begin{aligned} (g_{23} \circ v)(w_1 + w_2) &= (g_{23} \circ v) \circ w_1 + (g_{23} \circ v) \circ w_2 \\ (g_{23} \circ v) \circ (dw) &= d((g_{23} \circ v) \circ w) \end{aligned}$$

Since the map g_{23} is linear map

$$g_{23} : A \rightarrow \mathcal{L}(D; A \rightarrow A)$$

then, according to corollaries 9.3.29, 9.3.31,

$$(9.4.8) \quad (g_{23} \circ (v_1 + v_2)) \circ w = (g_{23} \circ v_1 + g_{23} \circ v_2)(w) = (g_{23} \circ v_1) \circ w + (g_{23} \circ v_2) \circ w$$

$$(9.4.9) \quad (g_{23} \circ (dv)) \circ w = (d(g_{23} \circ v)) \circ w = d((g_{23} \circ v) \circ w)$$

From equations (9.4.7), (9.4.8), (9.4.9) and the definition 9.3.26, it follows that the map g_{23} is bilinear map. Therefore, the map g_{23} determines the product in D -module A according to rule

$$ab = (g_{23} \circ a) \circ b$$

◊

The theorem follows from lemmas 9.4.3, 9.4.4. □

Usually, when we consider the D -algebra A , we choose a basis \bar{e} of corresponding D -module A . This choice is convenient because if D -module A is free D -module A , then expansion of the vector is unique relative to basis of D -module A . This, in particular, allows us to define product by specifying structural constants of algebra relative to given basis.

In general, the basis of R -module A may appear a generating set. For instance, if in vector space H , where we consider quaternion algebra over real field, we consider the basis

$$(9.4.10) \quad e_0 = 1 \quad e_1 = i \quad e_2 = j \quad e_3 = k$$

then in the algebra H the following equation is true

$$(9.4.11) \quad \begin{aligned} e_0 &= -e_1e_1 = -e_2e_2 \\ e_3 &= e_1e_2 \end{aligned}$$

Therefore, the set (e_1, e_2) is a basis of algebra H . Ambiguity of representation of quaternion relative to the given basis is consequence of the equation (9.4.11). Namely, we can present a quaternion $a \in H$ as

$$a = (a^0 - a^4)e_1e_1 + a^4e_2e_2 + a^1e_1 + a^2e_2 + a^3e_1e_2$$

where a^4 is arbitrary.

9.5. Left Module over Algebra

DEFINITION 9.5.1. *Effective left-side representation*

$$(9.5.1) \quad f : A \dashrightarrow V \quad f(a) : v \in V \rightarrow av \in V \quad a \in A$$

of associative D -algebra A in D -module V is called **left module** over D -algebra A . We will also say that D -module V is **left A -module** or **A^* -module**. V -number is called **vector**. □

DEFINITION 9.5.2. *Let A be division algebra. Effective left-side representation*

$$f : A \dashrightarrow V \quad f(a) : v \in V \rightarrow av \in V \quad a \in A$$

of Abelian group A in D -module V is called **left vector space** over D -algebra A . We will also say that D -module V is **left A -vector space** or **A^* -vector space**. V -number is called **vector**. □

THEOREM 9.5.3. *The following diagram of representations describes left A -module V*

$$(9.5.2) \quad \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{g_{23}} & A & \xrightarrow{g_{3,4}} & V \\ & \swarrow g_{12} & \uparrow g_{12} & \nearrow g_{1,4} & \\ & & D & & \end{array} \quad \begin{array}{l} g_{12}(d) : a \rightarrow da \\ g_{23}(v) : w \rightarrow C(w, v) \\ C \in \mathcal{L}(A^2 \rightarrow A) \\ g_{3,4}(a) : v \rightarrow va \\ g_{1,4}(d) : v \rightarrow dv \end{array}$$

The diagram of representations (9.5.2) holds **commutativity of representations** of commutative ring D and D -algebra A in Abelian group V

$$(9.5.3) \quad a(dv) = d(av)$$

PROOF. The diagram of representations (9.5.2) follows from the definition 9.5.1 and the theorem 9.4.2. Since left-side transformation $g_{3,4}(a)$ is endomorphism of D -module V , we obtain the equality (9.5.3). \square

THEOREM 9.5.4. *Let g be effective left-side representation of D -algebra A in D -module V . Then D -algebra A is associative.*

PROOF. Let $a, b, c \in A, v \in V$. Since left-side representation g is left-side representation of the multiplicative group of D -algebra A , we obtain the equality

$$(9.5.4) \quad (ab)v = a(bv)$$

The equality

$$(9.5.5) \quad a(b(cv)) = a((bc)v) = (a(bc))v$$

follows from the equality (9.5.4). Since $cv \in A$, the equality

$$(9.5.6) \quad a(b(cv)) = (ab)(cv) = ((ab)c)v$$

follows from the equality (9.5.4). The equality

$$(9.5.7) \quad (a(bc))v = ((ab)c)v$$

follows from equalities (9.5.5), (9.5.7). Since v is any vector of A -module V , the equality

$$(9.5.8) \quad a(bc) = (ab)c$$

follows from the equality (9.5.7). Therefore, D -algebra A is associative. \square

THEOREM 9.5.5. *Let V be left A -module. For any vector $v \in V$, vector generated by the diagram of representations (9.5.2) has the following form*

$$(9.5.9) \quad (a+n)v = av + nv \quad a \in A \quad n \in D$$

9.5.5.1: *The set of maps*

$$(9.5.10) \quad a+n : v \in V \rightarrow (a+n)v \in V$$

generates^{9.8} D -algebra $A_{(1)}$ where the sum is defined by the equality

$$(9.5.11) \quad (a+n) + (b+m) = (a+b) + (n+m)$$

^{9.8} See the definition of unital extension also on the pages [6]-52, [7]-64.

and the product is defined by the equality

$$(9.5.12) \quad (a + n)(b + m) = (ab + ma + nb) + (nm)$$

The D -algebra $A_{(1)}$ is called **unital extension** of the D -algebra A .

If D -algebra A has unit, then	$D \subseteq A$	$A_{(1)} = A$
If D -algebra A is ideal of D , then	$A \subseteq D$	$A_{(1)} = D$
Otherwise	$A_{(1)} = A \oplus D$	

9.5.5.2: The D -algebra A is left ideal of D -algebra $A_{(1)}$.

9.5.5.3: The set of transformations (9.5.9) is left-side representation of D -algebra $A_{(1)}$ in Abelian group V .

We use the notation $A_{(1)}v$ for the set of vectors generated by vector v .

THEOREM 9.5.6. Following conditions hold for left A -module V :

9.5.6.1: **associative law**

$$(9.5.13) \quad (pq)v = p(qv)$$

9.5.6.2: **distributive law**

$$(9.5.14) \quad p(v + w) = pv + pw$$

$$(9.5.15) \quad (p + q)v = pv + qv$$

9.5.6.3: **unitarity law**

$$(9.5.16) \quad 1v = v$$

for any $p, q \in A_{(1)}$, $v, w \in V$.

PROOF OF THEOREMS 9.5.5, 9.5.6. Let $v \in V$.

LEMMA 9.5.7. Let $d \in D$, $a \in A$. The map (9.5.10) is endomorphism of Abelian group V .

PROOF. Statements $dv \in V$, $av \in V$ follow from the theorems 6.1.4, 9.5.3. Since V is Abelian group, then

$$dv + av \in V \quad d \in D \quad a \in A$$

Therefore, for any D -number d and for any A -number a , we defined the map (9.5.10). Since transformation $g_{1,4}(d)$ and left-side transformation $g_{3,4}(a)$ are endomorphisms of Abelian group V , then the map (9.5.10) is endomorphism of Abelian group V . \odot

Let $A_{(1)}$ be the set of maps (9.5.10). The equality (9.5.14) follows from the lemma 9.5.7.

Let $p = a + n \in A_{(1)}$, $q = b + m \in A_{(1)}$. According to the statement 9.3.3.3, we define the sum of $A_{(1)}$ -numbers p and q by the equality (9.5.15). The equality

$$(9.5.17) \quad ((a + n) + (b + m))v = (a + n)v + (b + m)v$$

follows from the equality (9.5.15). Since representation $g_{1,4}$ is homomorphism of the additive group of ring D , we obtain the equality

$$(9.5.18) \quad (n + m)v = cn + dm$$

Since left-side representation $g_{3,4}$ is homomorphism of the additive group of D -algebra A , we obtain the equality

$$(9.5.19) \quad (a + b)v = av + bv$$

Since V is Abelian group, then the equality

$$(9.5.20) \quad \begin{aligned} ((a + n) + (b + m))v &= av + nv + bv + mv = av + bv + nv + mv \\ &= (a + b)v + (n + m)v = ((a + b) + (n + m))v \end{aligned}$$

follows from equalities (9.5.17), (9.5.18), (9.5.19). From the equality (9.5.20), it follows that the definition (9.5.11) of sum on the set $A_{(1)}$ does not depend on vector v .

Equalities (9.5.13), (9.5.16) follow from the statement 9.5.5.3. Let $p = a + n \in A_{(1)}$, $q = b + m \in A_{(1)}$. Since the product in D -algebra A can be non associative, then, based on the theorem 9.5.6, we consider product of $A_{(1)}$ -numbers p and q as bilinear map

$$f : A_{(1)} \times A_{(1)} \rightarrow A_{(1)}$$

such that following equalities are true

$$(9.5.21) \quad f(a, b) = ab \quad a, b \in A$$

$$(9.5.22) \quad f(1, p) = f(p, 1) = p \quad p \in A_{(1)} \quad 1 \in D_{(1)}$$

The equality

$$(9.5.23) \quad \begin{aligned} (a + n)(b + m) &= f(a + n, b + m) \\ &= f(a, b) + f(a, m) + f(n, b) + f(n, m) \\ &= f(a, b) + mf(a, 1) + nf(1, b) + nf(1, m) \\ &= ab + ma + nb + nm \end{aligned}$$

follows from equalities (9.5.21), (9.5.22). The equality (9.5.12) follows from the equality (9.5.23).

The statement 9.5.5.2 follows from the equality (9.5.12). \square

Bilinear map

$$(a, v) \in A \times V \rightarrow av \in V$$

generated by left-side representation $g_{2,3}$ is called **left-side product** of vector over scalar.

THEOREM 9.5.8. *Let V be left A -module. The set of vectors generated by the set of vectors $v = (v_i \in V, i \in I)$ has form^{9.9}*

$$(9.5.24) \quad J(v) = \left\{ w : w = \sum_{i \in I} c^i v_i, c^i \in A_{(1)}, |\{i : c^i \neq 0\}| < \infty \right\}$$

PROOF. We prove the theorem by induction based on the theorem 6.1.4, According to the theorem 6.1.4, we need to prove following statements:

$$9.5.8.1: v_k \in X_0 \subseteq J(v)$$

$$9.5.8.2: c^k v_k \in J(v), c^k \in A_{(1)}, k \in I$$

$$9.5.8.3: \sum_{k \in I} c^k v_k \in J(v), c^k \in A_{(1)}, |\{i : c^i \neq 0\}| < \infty$$

^{9.9} For a set A , we denote by $|A|$ the cardinal number of the set A . The notation $|A| < \infty$ means that the set A is finite.

9.5.8.4: $v, w \in J(v) \Rightarrow v + w \in J(v)$

9.5.8.5: $a \in A, v \in J(v) \Rightarrow av \in J(v)$

- For any $v_k \in v$, let $c^i = \delta_k^i \in A_{(1)}$. Then

$$(9.5.25) \quad v_k = \sum_{i \in I} c^i v_i$$

The statement 9.5.8.1 follows from (9.5.24), (9.5.25).

- The statement 9.5.8.2 follow from the theorems 6.1.4, 9.5.5 and from the statement 9.5.8.1.
- Since V is Abelian group, then the statement 9.5.8.3 follows from the statement 9.5.8.2 and from theorems 6.1.4, 9.2.3.
- Let $w_1, w_2 \in X_k \subseteq J(v)$. Since V is Abelian group, then, according to the statement 6.1.4.3,

$$(9.5.26) \quad w_1 + w_2 \in X_{k+1}$$

According to the equality (9.5.24), there exist $A_{(1)}$ -numbers $w_1^i, w_2^i, i \in I$, such that

$$(9.5.27) \quad w_1 = \sum_{i \in I} w_1^i v_i \quad w_2 = \sum_{i \in I} w_2^i v_i$$

where sets

$$(9.5.28) \quad H_1 = \{i \in I : w_1^i \neq 0\} \quad H_2 = \{i \in I : w_2^i \neq 0\}$$

are finite. Since V is Abelian group, then from the equality (9.5.27) it follows that

$$(9.5.29) \quad w_1 + w_2 = \sum_{i \in I} w_1^i v_i + \sum_{i \in I} w_2^i v_i = \sum_{i \in I} (w_1^i v_i + w_2^i v_i)$$

The equality

$$(9.5.30) \quad w_1 + w_2 = \sum_{i \in I} (w_1^i + w_2^i) v_i$$

follows from equalities (9.5.15), (9.5.29). From the equality (9.5.28), it follows that the set

$$\{i \in I : w_1^i + w_2^i \neq 0\} \subseteq H_1 \cup H_2$$

is finite.

- Let $w \in X_k \subseteq J(v)$. According to the statement 6.1.4.4, for any $A_{(1)}$ -number a ,

$$(9.5.31) \quad aw \in X_{k+1}$$

According to the equality (9.5.24), there exist $A_{(1)}$ -numbers $w^i, i \in I$, such that

$$(9.5.32) \quad w = \sum_{i \in I} w^i v_i$$

where

$$(9.5.33) \quad |\{i \in I : w^i \neq 0\}| < \infty$$

From the equality (9.5.32) it follows that

$$(9.5.34) \quad aw = a \sum_{i \in I} w^i v_i = \sum_{i \in I} a(w^i v_i) = \sum_{i \in I} (aw^i) v_i$$

From the statement (9.5.33), it follows that the set $\{i \in I : aw^i \neq 0\}$ is finite.

From equalities (9.5.26), (9.5.30), (9.5.31), (9.5.34), it follows that $X_{k+1} \subseteq J(v)$. \square

DEFINITION 9.5.9. Let $v = (v_i \in V, i \in I)$ be set of vectors. The expression $w^i v_i$ is called **linear combination** of vectors v_i . A vector $\bar{w} = w^i v_i$ is called **linearly dependent** on vectors v_i . \square

We represent the set of $A_{(1)}$ -numbers $w^i, i \in I$, as matrix

$$w = \begin{pmatrix} w^1 \\ \dots \\ w^n \end{pmatrix}$$

We represent the set of vectors $v_i, i \in I$, as matrix

$$v = \begin{pmatrix} v_1 & \dots & v_n \end{pmatrix}$$

Then we can represent linear combination of vectors $\bar{w} = w^i v_i$ as

$$\bar{w} = w^* *_v v$$

THEOREM 9.5.10. Let A be associative division D -algebra. Since the equation

$$w^i v_i = 0$$

implies existence of index $i = j$ such that $w^j \neq 0$, then the vector v_j linearly depends on rest of vectors v .

PROOF. The theorem follows from the equality

$$v_j = \sum_{i \in I \setminus \{j\}} (w^j)^{-1} w^i v_i$$

and from the definition 9.5.9. \square

It is evident that for any set of vectors v_i

$$w^i = 0 \Rightarrow w^* *_v v = 0$$

DEFINITION 9.5.11. The set of vectors^{9.10} $v_i, i \in I$, of left A -module V is **linearly independent** if $w = 0$ follows from the equation

$$w^i v_i = 0$$

Otherwise the set of vectors $v_i, i \in I$, is **linearly dependent**. \square

The following definition follows from the theorems 9.5.8, 6.1.4 and from the definition 6.1.5.

DEFINITION 9.5.12. $J(v)$ is called **submodule generated by set v** , and v is a **generating set** of submodule $J(v)$. In particular, a **generating set** of left D -module V is a subset $X \subset V$ such that $J(X) = V$. \square

^{9.10} I follow to the definition in [2], page 130.

The following definition follows from the theorems 9.5.8, 6.1.4 and from the definition 6.2.6.

DEFINITION 9.5.13. *If the set $X \subset V$ is generating set of left D -module V , then any set Y , $X \subset Y \subset V$ also is generating set of left D -module V . If there exists minimal set X generating the left D -module V , then the set X is called **basis** of left D -module V . \square*

THEOREM 9.5.14. *The set of vectors $\bar{e} = (e_i, i \in I)$ is basis of left A -module V , if following statements are true.*

9.5.14.1: *Arbitrary vector $v \in V$ is linear combination of vectors of the set \bar{e} .*

9.5.14.2: *Vector e_i cannot be represented as a linear combination of the remaining vectors of the set \bar{e} .*

PROOF. According to the statement 9.5.14.1, the theorem 9.5.8 and the definition 9.5.9, the set \bar{e} generates left A -module V (the definition 9.5.12). According to the statement 9.5.14.2, the set \bar{e} is minimal set generating left A -module V . According to the definitions 9.5.13, the set \bar{e} is a basis of left A -module V . \square

THEOREM 9.5.15. *Let A be associative division D -algebra. The set of vectors $\bar{e} = (e_i, i \in I)$ is a **basis of left A -vector space V** if vectors e_i are linearly independent and any vector $v \in V$ linearly depends on vectors e_i .*

PROOF. Let the set of vectors $e_i, i \in I$, be linear dependent. Then the equation

$$w^i e_i = 0$$

implies existence of index $i = j$ such that $w^j \neq 0$. According to the theorem 9.5.10, the vector e_j linearly depends on rest of vectors of the set \bar{e} . According to the definition 9.5.13, the set of vectors $e_i, i \in I$, is not a basis for left A -vector space V .

Therefore, if the set of vectors $e_i, i \in I$, is a basis, then these vectors are linearly independent. Since an arbitrary vector $v \in V$ is linear combination of vectors $e_i, i \in I$, then the set of vectors $v, e_i, i \in I$, is not linearly independent. \square

DEFINITION 9.5.16. *Let \bar{e} be the basis of left A -module V and vector $\bar{v} \in V$ has expansion*

$$\bar{v} = v^* * e = v^i e_i$$

*with respect to the basis \bar{e} . $A_{(1)}$ -numbers v^i are called **coordinates** of vector \bar{v} with respect to the basis \bar{e} . Matrix of $A_{(1)}$ -numbers $v = (v^i, i \in I)$ is called **coordinate matrix of vector \bar{v} in basis \bar{e}** . \square*

THEOREM 9.5.17. *Let A be associative D -algebra. Let \bar{e} be basis of left A -module V . Let*

$$(9.5.35) \quad w^i e_i = 0$$

be linear dependence of vectors of the basis \bar{e} . Then

9.5.17.1: *$A_{(1)}$ -number $w^i, i \in I$, does not have inverse element in D -algebra $A_{(1)}$.*

9.5.17.2: *The set A' of matrices $w = (w^i, i \in I)$ generates left A -module.*

PROOF. Let there exist matrix $w = (w^i, i \in I)$ such that the equality (9.5.35) is true and there exist index $i = j$ such that $w^j \neq 0$. If we assume that $A_{(1)}$ -number c^j has inverse one, then the equality

$$e_j = \sum_{i \in I \setminus \{j\}} (w^j)^{-1} w^i e_i$$

follows from the equality (9.5.35). Therefore, the vector e_j is linear combination of other vectors of the set \bar{e} and the set \bar{e} is not basis. Therefore, our assumption is false, and $A_{(1)}$ -number c^j does not have inverse.

Let matrices $b = (b^i, i \in I) \in A'$, $c = (c^i, i \in I) \in A'$. From equalities

$$\begin{aligned} b^i e_i &= 0 \\ c^i e_i &= 0 \end{aligned}$$

it follows that

$$(b^i + c^i) e_i = 0$$

Therefore, the set A' is Abelian group.

Let matrix $c = (c^i, i \in I) \in A'$ and $a \in A$. From the equality

$$w^i e_i = 0$$

it follows that

$$(ac^i) e_i = 0$$

Therefore, Abelian group A' is left A -module. \square

THEOREM 9.5.18. *Let left A -module V have the basis \bar{e} such that in the equality*

$$(9.5.36) \quad w^i e_i = 0$$

there exists index $i = j$ such that $w^j \neq 0$. Then

9.5.18.1: *The matrix $w = (w^i, i \in I)$ determines coordinates of vector $0 \in V$ with respect to basis \bar{e} .*

9.5.18.2: *Coordinates of vector \bar{v} with respect to basis \bar{e} are uniquely determined up to a choice of coordinates of vector $0 \in V$.*

PROOF. The statement 9.5.18.1 follows from the equality (9.5.36) and from the definition 9.5.16.

Let vector \bar{v} have expansion

$$(9.5.37) \quad \bar{v} = v^* e = v^i e_i$$

with respect to basis \bar{e} . The equality

$$(9.5.38) \quad \bar{v} = \bar{v} + 0 = v^i e_i + c^i e_i = (v^i + c^i) e_i$$

follows from equalities (9.5.36), (9.5.37). The statement 9.5.18.2 follows from equalities (9.5.37), (9.5.38) and from the definition 9.5.16. \square

DEFINITION 9.5.19. *The left A -module V is **free left A -module**,^{9.11} if left A -module V has basis and vectors of the basis are linearly independent. \square*

THEOREM 9.5.20. *Coordinates of vector $v \in V$ relative to basis \bar{e} of free left A -module V are uniquely defined.*

PROOF. The theorem follows from the theorem 9.5.18 and from definitions 9.5.11, 9.5.19. \square

^{9.11} I follow to the definition in [2], page 135.

9.6. Right Module over Algebra

DEFINITION 9.6.1. *Effective right-side representation*

$$(9.6.1) \quad f : A \xrightarrow{*} V \quad f(a) : v \in V \rightarrow va \in V \quad a \in A$$

of associative D -algebra A in D -module V is called **right module** over D -algebra A . We will also say that D -module V is **right A -module** or **$*A$ -module**. V -number is called **vector**. \square

DEFINITION 9.6.2. *Let A be division algebra. Effective right-side representation*

$$f : A \xrightarrow{*} V \quad f(a) : v \in V \rightarrow va \in V \quad a \in A$$

of Abelian group A in D -module V is called **right vector space** over D -algebra A . We will also say that D -module V is **right A -vector space** or **$*A$ -vector space**. V -number is called **vector**. \square

THEOREM 9.6.3. *The following diagram of representations describes right A -module V*

$$(9.6.2) \quad \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{g_{23}} & A & \xrightarrow{g_{3,4}} & V \\ & \searrow^{g_{12}} & \uparrow^{g_{12}} & & \uparrow^{g_{1,4}} \\ & & D & & \end{array} \quad \begin{array}{l} g_{12}(d) : a \rightarrow da \\ g_{23}(v) : w \rightarrow C(w, v) \\ C \in \mathcal{L}(A^2 \rightarrow A) \\ g_{3,4}(a) : v \rightarrow va \\ g_{1,4}(d) : v \rightarrow vd \end{array}$$

The diagram of representations (9.6.2) holds **commutativity of representations** of commutative ring D and D -algebra A in Abelian group V

$$(9.6.3) \quad (vd)a = (va)d$$

PROOF. The diagram of representations (9.6.2) follows from the definition 9.6.1 and the theorem 9.4.2. Since right-side transformation $g_{3,4}(a)$ is endomorphism of D -module V , we obtain the equality (9.6.3). \square

THEOREM 9.6.4. *Let g be effective left-side representation of D -algebra A in D -module V . Then D -algebra A is associative.*

PROOF. Let $a, b, c \in A, v \in V$. Since right-side representation g is right-side representation of the multiplicative group of D -algebra A , we obtain the equality

$$(9.6.4) \quad v(ab) = (va)b$$

The equality

$$(9.6.5) \quad ((vc)b)a = (v(cb))a = v((cb)a)$$

follows from the equality (9.6.4). Since $vc \in A$, the equality

$$(9.6.6) \quad ((vc)b)a = (vc)(ba) = v(c(ba))$$

follows from the equality (9.6.4). The equality

$$(9.6.7) \quad v((cb)a) = v(c(ba))$$

follows from equalities (9.6.5), (9.6.7). Since v is any vector of A -module V , the equality

$$(9.6.8) \quad (cb)a = c(ba)$$

follows from the equality (9.6.7). Therefore, D -algebra A is associative. \square

THEOREM 9.6.5. *Let V be right A -module. For any vector $v \in V$, vector generated by the diagram of representations (9.6.2) has the following form*

$$(9.6.9) \quad v(a + n) = va + vn \quad a \in A \quad n \in D$$

9.6.5.1: *The set of maps*

$$(9.6.10) \quad a + n : v \in V \rightarrow v(a + n) \in V$$

generates^{9.12} D -algebra $A_{(1)}$ where the sum is defined by the equality

$$(9.6.11) \quad (a + n) + (b + m) = (a + b) + (n + m)$$

and the product is defined by the equality

$$(9.6.12) \quad (a + n)(b + m) = (ab + ma + nb) + (nm)$$

*The D -algebra $A_{(1)}$ is called **unital extension** of the D -algebra A .*

If D -algebra A has unit, then	$D \subseteq A$	$A_{(1)} = A$
If D -algebra A is ideal of D , then	$A \subseteq D$	$A_{(1)} = D$
Otherwise	$A_{(1)} = A \oplus D$	

9.6.5.2: *The D -algebra A is right ideal of D -algebra $A_{(1)}$.*

9.6.5.3: *The set of transformations (9.6.9) is right-side representation of D -algebra $A_{(1)}$ in Abelian group V .*

We use the notation $A_{(1)}v$ for the set of vectors generated by vector v .

THEOREM 9.6.6. *Following conditions hold for right A -module V :*

9.6.6.1: **associative law**

$$(9.6.13) \quad v(pq) = (vp)q$$

9.6.6.2: **distributive law**

$$(9.6.14) \quad (v + w)p = vp + wp$$

$$(9.6.15) \quad v(p + q) = vp + vq$$

9.6.6.3: **unitarity law**

$$(9.6.16) \quad v1 = v$$

for any $p, q \in A_{(1)}, v, w \in V$.

PROOF OF THEOREMS 9.6.5, 9.6.6. Let $v \in V$.

LEMMA 9.6.7. *Let $d \in D, a \in A$. The map (9.6.10) is endomorphism of Abelian group V .*

^{9.12} See the definition of unital extension also on the pages [6]-52, [7]-64.

PROOF. Statements $vd \in V$, $va \in V$ follow from the theorems 6.1.4, 9.6.3. Since V is Abelian group, then

$$vd + va \in V \quad d \in D \quad a \in A$$

Therefore, for any D -number d and for any A -number a , we defined the map (9.6.10). Since transformation $g_{1,4}(d)$ and right-side transformation $g_{3,4}(a)$ are endomorphisms of Abelian group V , then the map (9.6.10) is endomorphism of Abelian group V . \odot

Let $A_{(1)}$ be the set of maps (9.6.10). The equality (9.6.14) follows from the lemma 9.6.7.

Let $p = a + n \in A_{(1)}$, $q = b + m \in A_{(1)}$. According to the statement 9.3.3.3, we define the sum of $A_{(1)}$ -numbers p and q by the equality (9.6.15). The equality

$$(9.6.17) \quad v((a + n) + (b + m)) = v(a + n) + v(b + m)$$

follows from the equality (9.6.15). Since representation $g_{1,4}$ is homomorphism of the additive group of ring D , we obtain the equality

$$(9.6.18) \quad v(n + m) = vn + vm$$

Since right-side representation $g_{3,4}$ is homomorphism of the additive group of D -algebra A , we obtain the equality

$$(9.6.19) \quad v(a + b) = va + vb$$

Since V is Abelian group, then the equality

$$(9.6.20) \quad \begin{aligned} v((a + n) + (b + m)) &= va + vn + vb + vm = va + vb + vn + vm \\ &= v(a + b) + v(n + m) = v((a + b) + (n + m)) \end{aligned}$$

follows from equalities (9.6.17), (9.6.18), (9.6.19). From the equality (9.6.20), it follows that the definition (9.6.11) of sum on the set $A_{(1)}$ does not depend on vector v .

Equalities (9.6.13), (9.6.16) follow from the statement 9.6.5.3. Let $p = a + n \in A_{(1)}$, $q = b + m \in A_{(1)}$. Since the product in D -algebra A can be non associative, then, based on the theorem 9.6.6, we consider product of $A_{(1)}$ -numbers p and q as bilinear map

$$f : A_{(1)} \times A_{(1)} \rightarrow A_{(1)}$$

such that following equalities are true

$$(9.6.21) \quad f(a, b) = ab \quad a, b \in A$$

$$(9.6.22) \quad f(1, p) = f(p, 1) = p \quad p \in A_{(1)} \quad 1 \in D_{(1)}$$

The equality

$$(9.6.23) \quad \begin{aligned} (a + n)(b + m) &= f(a + n, b + m) \\ &= f(a, b) + f(a, m) + f(n, b) + f(n, m) \\ &= f(a, b) + mf(a, 1) + nf(1, b) + nf(1, m) \\ &= ab + ma + nb + nm \end{aligned}$$

follows from equalities (9.6.21), (9.6.22). The equality (9.6.12) follows from the equality (9.6.23).

The statement 9.6.5.2 follows from the equality (9.6.12). \square

Bilinear map

$$(v, a) \in V \times A \rightarrow va \in V$$

generated by right-side representation $g_{2,3}$ is called **right-side product** of vector over scalar.

THEOREM 9.6.8. *Let V be right A -module. The set of vectors generated by the set of vectors $v = (v_i \in V, i \in I)$ has form^{9.13}*

$$(9.6.24) \quad J(v) = \left\{ w : w = \sum_{i \in I} v_i c^i, c^i \in A_{(1)}, |\{i : c^i \neq 0\}| < \infty \right\}$$

PROOF. We prove the theorem by induction based on the theorem 6.1.4, According to the theorem 6.1.4, we need to prove following statements:

$$9.6.8.1: v_k \in X_0 \subseteq J(v)$$

$$9.6.8.2: v_k c^k \in J(v), c^k \in A_{(1)}, k \in I$$

$$9.6.8.3: \sum_{k \in I} v_k c^k \in J(v), c^k \in A_{(1)}, |\{i : c^i \neq 0\}| < \infty$$

$$9.6.8.4: v, w \in J(v) \Rightarrow v + w \in J(v)$$

$$9.6.8.5: a \in A, v \in J(v) \Rightarrow av \in J(v)$$

- For any $v_k \in v$, let $c^i = \delta_k^i \in A_{(1)}$. Then

$$(9.6.25) \quad v_k = \sum_{i \in I} v_i c^i$$

The statement 9.6.8.1 follows from (9.6.24), (9.6.25).

- The statement 9.6.8.2 follow from the theorems 6.1.4, 9.6.5 and from the statement 9.6.8.1.
- Since V is Abelian group, then the statement 9.6.8.3 follows from the statement 9.6.8.2 and from theorems 6.1.4, 9.2.3.
- Let $w_1, w_2 \in X_k \subseteq J(v)$. Since V is Abelian group, then, according to the statement 6.1.4.3,

$$(9.6.26) \quad w_1 + w_2 \in X_{k+1}$$

According to the equality (9.6.24), there exist $A_{(1)}$ -numbers $w_1^i, w_2^i, i \in I$, such that

$$(9.6.27) \quad w_1 = \sum_{i \in I} v_i w_1^i \quad w_2 = \sum_{i \in I} v_i w_2^i$$

where sets

$$(9.6.28) \quad H_1 = \{i \in I : w_1^i \neq 0\} \quad H_2 = \{i \in I : w_2^i \neq 0\}$$

are finite. Since V is Abelian group, then from the equality (9.6.27) it follows that

$$(9.6.29) \quad w_1 + w_2 = \sum_{i \in I} v_i w_1^i + \sum_{i \in I} v_i w_2^i = \sum_{i \in I} (v_i w_1^i + v_i w_2^i)$$

The equality

$$(9.6.30) \quad w_1 + w_2 = \sum_{i \in I} v_i (w_1^i + w_2^i)$$

^{9.13} For a set A , we denote by $|A|$ the cardinal number of the set A . The notation $|A| < \infty$ means that the set A is finite.

follows from equalities (9.6.15), (9.6.29). From the equality (9.6.28), it follows that the set

$$\{\mathbf{i} \in \mathbf{I} : w_1^{\mathbf{i}} + w_2^{\mathbf{i}} \neq 0\} \subseteq H_1 \cup H_2$$

is finite.

- Let $w \in X_k \subseteq J(v)$. According to the statement 6.1.4.4, for any $A_{(1)}$ -number a ,

$$(9.6.31) \quad wa \in X_{k+1}$$

According to the equality (9.6.24), there exist $A_{(1)}$ -numbers $w^{\mathbf{i}}$, $\mathbf{i} \in \mathbf{I}$, such that

$$(9.6.32) \quad w = \sum_{\mathbf{i} \in \mathbf{I}} v_{\mathbf{i}} w^{\mathbf{i}}$$

where

$$(9.6.33) \quad |\{\mathbf{i} \in \mathbf{I} : w^{\mathbf{i}} \neq 0\}| < \infty$$

From the equality (9.6.32) it follows that

$$(9.6.34) \quad wa = \left(\sum_{\mathbf{i} \in \mathbf{I}} v_{\mathbf{i}} w^{\mathbf{i}} \right) a = \sum_{\mathbf{i} \in \mathbf{I}} (v_{\mathbf{i}} w^{\mathbf{i}}) a = \sum_{\mathbf{i} \in \mathbf{I}} (v_{\mathbf{i}} w^{\mathbf{i}} a)$$

From the statement (9.6.33), it follows that the set $\{\mathbf{i} \in \mathbf{I} : w^{\mathbf{i}} a \neq 0\}$ is finite.

From equalities (9.6.26), (9.6.30), (9.6.31), (9.6.34), it follows that $X_{k+1} \subseteq J(v)$. \square

DEFINITION 9.6.9. Let $v = (v_{\mathbf{i}} \in V, \mathbf{i} \in \mathbf{I})$ be set of vectors. The expression $v_{\mathbf{i}} w^{\mathbf{i}}$ is called **linear combination** of vectors $v_{\mathbf{i}}$. A vector $\bar{w} = v_{\mathbf{i}} w^{\mathbf{i}}$ is called **linearly dependent** on vectors $v_{\mathbf{i}}$. \square

We represent the set of $A_{(1)}$ -numbers $w^{\mathbf{i}}$, $\mathbf{i} \in \mathbf{I}$, as matrix

$$w = \begin{pmatrix} w^{\mathbf{1}} \\ \dots \\ w^{\mathbf{n}} \end{pmatrix}$$

We represent the set of vectors $v_{\mathbf{i}}$, $\mathbf{i} \in \mathbf{I}$, as matrix

$$v = \begin{pmatrix} v_{\mathbf{1}} & \dots & v_{\mathbf{n}} \end{pmatrix}$$

Then we can represent linear combination of vectors $\bar{w} = v_{\mathbf{i}} w^{\mathbf{i}}$ as

$$\bar{w} = v_*^* w$$

THEOREM 9.6.10. Let A be associative division D -algebra. Since the equation

$$v_{\mathbf{i}} w^{\mathbf{i}} = 0$$

implies existence of index $\mathbf{i} = \mathbf{j}$ such that $w^{\mathbf{j}} \neq 0$, then the vector $v_{\mathbf{j}}$ linearly depends on rest of vectors v .

PROOF. The theorem follows from the equality

$$v_j = \sum_{i \in I \setminus \{j\}} v_i w^i (w^j)^{-1}$$

and from the definition 9.6.9. \square

It is evident that for any set of vectors v_i

$$w^i = 0 \Rightarrow v_* w^i = 0$$

DEFINITION 9.6.11. The set of vectors^{9.14} $v_i, i \in I$, of right A -module V is **linearly independent** if $w = 0$ follows from the equation

$$v_i w^i = 0$$

Otherwise the set of vectors $v_i, i \in I$, is **linearly dependent**. \square

The following definition follows from the theorems 9.6.8, 6.1.4 and from the definition 6.1.5.

DEFINITION 9.6.12. $J(v)$ is called **submodule generated by set v** , and v is a **generating set** of submodule $J(v)$. In particular, a **generating set** of right D -module V is a subset $X \subset V$ such that $J(X) = V$. \square

The following definition follows from the theorems 9.6.8, 6.1.4 and from the definition 6.2.6.

DEFINITION 9.6.13. If the set $X \subset V$ is generating set of right D -module V , then any set $Y, X \subset Y \subset V$ also is generating set of right D -module V . If there exists minimal set X generating the right D -module V , then the set X is called **basis** of right D -module V . \square

THEOREM 9.6.14. The set of vectors $\bar{e} = (e_i, i \in I)$ is basis of right A -module V , if following statements are true.

9.6.14.1: Arbitrary vector $v \in V$ is linear combination of vectors of the set \bar{e} .

9.6.14.2: Vector e_i cannot be represented as a linear combination of the remaining vectors of the set \bar{e} .

PROOF. According to the statement 9.6.14.1, the theorem 9.6.8 and the definition 9.6.9, the set \bar{e} generates right A -module V (the definition 9.6.12). According to the statement 9.6.14.2, the set \bar{e} is minimal set generating right A -module V . According to the definitions 9.6.13, the set \bar{e} is a basis of right A -module V . \square

THEOREM 9.6.15. Let A be associative division D -algebra. The set of vectors $\bar{e} = (e_i, i \in I)$ is a **basis of right A -vector space V** if vectors e_i are linearly independent and any vector $v \in V$ linearly depends on vectors e_i .

PROOF. Let the set of vectors $e_i, i \in I$, be linear dependent. Then the equation

$$e_i w^i = 0$$

implies existence of index $i = j$ such that $w^j \neq 0$. According to the theorem 9.6.10, the vector e_j linearly depends on rest of vectors of the set \bar{e} . According to the definition 9.6.13, the set of vectors $e_i, i \in I$, is not a basis for right A -vector space V .

^{9.14} I follow to the definition in [2], page 130.

Therefore, if the set of vectors $e_i, i \in I$, is a basis, then these vectors are linearly independent. Since an arbitrary vector $v \in V$ is linear combination of vectors $e_i, i \in I$, then the set of vectors $v, e_i, i \in I$, is not linearly independent. \square

DEFINITION 9.6.16. Let \bar{e} be the basis of right A -module V and vector $\bar{v} \in V$ has expansion

$$\bar{v} = e_*^* v = e_i v^i$$

with respect to the basis \bar{e} . $A_{(1)}$ -numbers v^i are called **coordinates** of vector \bar{v} with respect to the basis \bar{e} . Matrix of $A_{(1)}$ -numbers $v = (v^i, i \in I)$ is called **coordinate matrix of vector \bar{v} in basis \bar{e}** . \square

THEOREM 9.6.17. Let A be associative D -algebra. Let \bar{e} be basis of right A -module V . Let

$$(9.6.35) \quad e_i w^i = 0$$

be linear dependence of vectors of the basis \bar{e} . Then

9.6.17.1: $A_{(1)}$ -number $w^i, i \in I$, does not have inverse element in D -algebra $A_{(1)}$.

9.6.17.2: The set A' of matrices $w = (w^i, i \in I)$ generates right A -module.

PROOF. Let there exist matrix $w = (w^i, i \in I)$ such that the equality (9.6.35) is true and there exist index $i = j$ such that $w^j \neq 0$. If we assume that $A_{(1)}$ -number c^j has inverse one, then the equality

$$e_j = \sum_{i \in I \setminus \{j\}} e_i w^i (w^j)^{-1}$$

follows from the equality (9.6.35). Therefore, the vector e_j is linear combination of other vectors of the set \bar{e} and the set \bar{e} is not basis. Therefore, our assumption is false, and $A_{(1)}$ -number c^j does not have inverse.

Let matrices $b = (b^i, i \in I) \in A', c = (c^i, i \in I) \in A'$. From equalities

$$e_i b^i = 0$$

$$e_i c^i = 0$$

it follows that

$$e_i (b^i + c^i) = 0$$

Therefore, the set A' is Abelian group.

Let matrix $c = (c^i, i \in I) \in A'$ and $a \in A$. From the equality

$$e_i w^i = 0$$

it follows that

$$e_i (c^i a) = 0$$

Therefore, Abelian group A' is right A -module. \square

THEOREM 9.6.18. Let right A -module V have the basis \bar{e} such that in the equality

$$(9.6.36) \quad e_i w^i = 0$$

there exists index $i = j$ such that $w^j \neq 0$. Then

9.6.18.1: The matrix $w = (w^i, i \in I)$ determines coordinates of vector $0 \in V$ with respect to basis \bar{e} .

9.6.18.2: *Coordinates of vector \bar{v} with respect to basis \bar{e} are uniquely determined up to a choice of coordinates of vector $0 \in V$.*

PROOF. The statement 9.6.18.1 follows from the equality (9.6.36) and from the definition 9.6.16.

Let vector \bar{v} have expansion

$$(9.6.37) \quad \bar{v} = e_*^* v = e_i v^i$$

with respect to basis \bar{e} . The equality

$$(9.6.38) \quad \bar{v} = \bar{v} + 0 = e_i v^i + e_i c^i = e_i (v^i + c^i)$$

follows from equalities (9.6.36), (9.6.37). The statement 9.6.18.2 follows from equalities (9.6.37), (9.6.38) and from the definition 9.6.16. \square

DEFINITION 9.6.19. *The right A -module V is **free right A -module**,^{9.15} if right A -module V has basis and vectors of the basis are linearly independent. \square*

THEOREM 9.6.20. *Coordinates of vector $v \in V$ relative to basis \bar{e} of free right A -module V are uniquely defined.*

PROOF. The theorem follows from the theorem 9.6.18 and from definitions 9.6.11, 9.6.19. \square

9.7. Left Module over Nonassociative Algebra

Theorems 9.6.5, 9.6.6 consider the structure of module over associative D -algebra A . It is easy to see that, considering some corrections, these theorems remain true if A is non associative D -algebra. However, because the product in D -algebra A is non associative and product of transformations in module over D -algebra A is associative, then the map g_{34} cannot be a representation of non associative D -algebra A .

We have come to that verge where universal algebra representation theory is defined. In order to maintain the ability to use the tool considered in this book, we can agree that the map

$$g_{34} : A \times V \rightarrow V$$


is a representation when the map g_{34} is bilinear map. There are new questions that are beyond the scope of this book.

However, we may consider this problem from other point of view. If the map g_{34} does not conserve the operation of the product, then we assume that the map g_{34} is representation of D -algebra A , in which product is not defined. In other words, the map g_{34} is representation of D -module. Therefore, diagram of representations will have the following form

$$(9.7.1) \quad \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{g_{34}} & V \\ & \swarrow g_{12} & \nearrow g_{14} \\ & D & \end{array} \quad \begin{array}{l} g_{12}(d) : a \rightarrow da \\ g_{34}(a) : v \rightarrow av \\ g_{14}(d) : v \rightarrow dv \end{array}$$

^{9.15} I follow to the definition in [2], page 135.

However, we lost the structure of D -algebra A in diagram of representations (9.7.1). Therefore, proper diagram of representations will have the following form



Examples of Diagram of Representations: Affine Geometry

10.1. About this Chapter

In the chapter 9, we considered examples of diagram of representations associated with module over ring. If representation theory were reduced to studying of modules, it would hardly be an interesting theory.

In this chapter, I considered examples of diagram of representations associated with affine geometry. This simple algebraic construction turned out to be a rich source of inspiration for me. I met interesting ideas in this area of mathematics twice. At first during study of affine geometry, I discovered that I can describe affine geometry using tower of representations. Afterwards, during similar study of algebra over commutative ring, I began to study a diagram of representations.

However, the second discovery came to me by chance. When I was looking through the calculus textbook, I have met a definition familiar from childhood. This is sum of vectors. The definition is extremely simple. When we define manifold with affine connection, we have the sum of vectors in tangent plane. However, at this time I realized that I can define sum of vectors using parallelogram from geodesic lines. It gave me ability to build affine geometry on affine manifold.

One more step, and I switched from manifold with affine connection to metric-affine manifold. Since parallelogram from geodesic lines is not closed, then sum of vectors in metric affine manifold is not commutative. Without a doubt, this is research which is beyond the scope of this book; and I hope to return to this research in the future. However, I decided to write a sketch of this theory in the section 10.4 to show the reader the limits of theory presented in this book.

The representation theory is natural extension of universal algebra theory. We assume that binary operation on universal algebra A is defined for any two A -numbers. However, it is evident that sum of vectors in affine geometry On differentiable manifold is well defined only in enough small neighborhood.

I met similar problem in the paper [11] where I and Alexandre Laugier studied orthogonal transformations in Minkowski space. We discovered that the product of orthogonal transformations not always is orthogonal transformation; therefore, the set of orthogonal transformations is not a group.

10.2. Representation of Group on the Set

Let G be Abelian group, and M be a set. Consider effective representation of group G on the set M . For given $a \in G$, $A \in M$ we assume $A \rightarrow A + a$. We also use notation $a = \overrightarrow{AB}$ if

$$(10.2.1) \quad B = A + a$$

Then we can represent action of group as

$$(10.2.2) \quad B = A + \overrightarrow{AB}$$

Since the representation is effective, then from equalities (10.2.1), (10.2.2) and the equality

$$D = C + a$$

it folows that

$$(10.2.3) \quad \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$$

G -number a and corresponding transformation \overrightarrow{AB} are called vector. We interpret the equality (10.2.3) as the independence of the vector a from the choice of M -number A .

We can consider the set M as union of orbits of the representation of the group G . We can select for basis of the representation the set of points such that one and only one point belongs to each orbit. If X is the basis of representation, $A \in X$, $g \in G$, then Ω_2 -word has form $A+g$. Since there is no operations on the set M , then there is no Ω_2 -word containing different elements of the basis. If representation of group G is single transitive, then basis of representation consists of one point. Any point of the set M can be such point.


THEOREM 10.2.1. *Let the representation $A \rightarrow A + a$ of Abelian group G on the set M be single transitive. Then for any M -numbers A, B, C , we determine sum of vectors \overrightarrow{AB} and \overrightarrow{BC} and sum of vectors satisfies to the following equality*

$$(10.2.4) \quad \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

PROOF. Since the representation is single transitive, then, for any M -numbers A, B, C , there exist vectors $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}$ such that

$$(10.2.5) \quad B = A + \overrightarrow{AB}$$

$$(10.2.6) \quad C = B + \overrightarrow{BC}$$



The equality

$$(10.2.7) \quad C = (A + \overrightarrow{AB}) + \overrightarrow{BC} = A + (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC})$$

follows from equalities (10.2.5), (10.2.6) and from associativity of sum in Abelian group G . Since the representation is single transitive, then the equality (10.2.4) follows from the equality (10.2.7) and from the equality

$$C = A + \overrightarrow{AC}$$

This definition of sum is called the triangle law. □

REMARK 10.2.2. *Since G is Abelian group, then statements 10.2.2.1, 10.2.2.2, follow from the theorem 10.2.1.*

$$10.2.2.1: \overrightarrow{AA} = 0$$

$$10.2.2.2: \overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$$


10.2.2.3: Addition is commutative.

10.2.2.4: Addition is associative.

□

THEOREM 10.2.3. For given $a, b \in G$ and $A \in M$, we consider following set of M -numbers.


- $B = A + a$
- $C = B + b$
- $D = A + b$
- $E = D + a$



PROOF. The theorem follows from the statement 10.2.2.3.

□

THEOREM 10.2.4. If $\vec{AB} = \vec{CD}$, then $\vec{AC} = \vec{BD}$.



PROOF. Let $\vec{AB} = \vec{CD} = a$, $\vec{AC} = b$. According to the statement 10.2.2.2, $\vec{BA} = -a$. The theorem follows from the equality

$$\begin{aligned} D &= B + \vec{BD} = B + \vec{BA} + \vec{AD} = B + \vec{BA} + \vec{AC} + \vec{CD} \\ &= B - a + b + a = B + b \end{aligned}$$

□

10.3. Affine Space

DEFINITION 10.3.1. Let D be commutative ring and V be free D -module. A set of points $\overset{\circ}{V}$ is called **affine space** over D -module V , if the set of points $\overset{\circ}{V}$ satisfies to following axioms.^{10.1}

10.3.1.1: There exists at least one point

10.3.1.2: One and only one vector is in correspondence to any tuple of points (A, B) .

We denote this vector as \vec{AB} . The vector \vec{AB} has tail in the point A and head in the point B .

10.3.1.3: For any point A and any vector a there exists one and only one point B such, that $\vec{AB} = a$. We will use notation^{10.2}

$$(10.3.1) \quad B = A + a$$

10.3.1.4: (Axiom of parallelogram.) If $\vec{AB} = \vec{CD}$, then $\vec{AC} = \vec{BD}$.


A set V is called a set of free vectors. $\overset{\circ}{V}$ -number is called point of affine space $\overset{\circ}{V}$. □

DEFINITION 10.3.2. Let $A \in \overset{\circ}{V}$ be arbitrary point.


^{10.1}I wrote definitions and theorems in this section according to definition of affine space in [4], pp. 86 - 93.

^{10.2}[21], p. 9.

Let v be vector. According to the axiom **10.3.1.3**, there exists $B \in \overset{\circ}{V}$, $B = A + v$.




Let w be vector. According to the axiom **10.3.1.3**, there exists $C \in \overset{\circ}{V}$, $C = B + w$.



According to the axiom **10.3.1.2**, there exists vector \overrightarrow{AC} . Vector \overrightarrow{AC} is called sum of vectors v and w

$$(10.3.2) \quad v + w = \overrightarrow{AC}$$

This definition of sum is called the triangle law.



□

THEOREM 10.3.3. Vector \overrightarrow{AA} is zero with respect to addition and does not depend on point A . Vector \overrightarrow{AA} is called zero-vector and we assume $\overrightarrow{AA} = 0$.

PROOF. We can write rule of addition **(10.3.2)** in form of the equality

$$(10.3.3) \quad \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

If $B = C$, then from the equality **(10.3.3)** it follows that

$$(10.3.4) \quad \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BB} = \overrightarrow{AB}$$

From the equality **(10.3.4)**, it follows that the vector \overrightarrow{BB} is zero with respect to addition. If $C = A$, $B = D$, then from axiom **10.3.1.4**, it follows that $\overrightarrow{AA} = \overrightarrow{BB}$. Therefore, a zero-vector \overrightarrow{AA} does not depend on a point A . □

THEOREM 10.3.4. Let $a = \overrightarrow{AB}$. Then

$$(10.3.5) \quad \overrightarrow{BA} = -a$$

and this equality does not depend on point A .

PROOF. From the equality **(10.3.3)** and the theorem **10.3.3**, it follows that

$$(10.3.6) \quad \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = 0$$

The equality **(10.3.5)** follows from the equality **(10.3.6)**. Applying axiom **10.3.1.4** to the equality $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ we get $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$, or (this is equivalent)

$$(10.3.7) \quad \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AC}$$


From the equality **(10.3.7)** and the axiom **10.3.1.4**, it follows that $\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{DC}$. Therefore, the equality **(10.3.5)** does not depend on point A . □

THEOREM 10.3.5. *Sum of vectors v and w does not depend on point A .*

PROOF. Let

$$(10.3.8) \quad v = \vec{AB} = \vec{A'B'}$$

$$(10.3.9) \quad w = \vec{BC} = \vec{B'C'}$$



We define sum of vectors v and w according to the definition 10.3.2.

$$\begin{aligned} \vec{AB} + \vec{BC} &= \vec{AC} \\ \vec{A'B'} + \vec{B'C'} &= \vec{A'C'} \end{aligned}$$

According to axiom 10.3.1.4, from equalities (10.3.8), (10.3.9), it follows that

$$(10.3.10) \quad \vec{A'A} = \vec{B'B} = \vec{C'C}$$

Applying axiom 10.3.1.4 to outermost members of equality (10.3.10), we get

$$(10.3.11) \quad \vec{A'C'} = \vec{AC}$$

From the equality (10.3.11) the statement of theorem follows. □

THEOREM 10.3.6. *Sum of vectors is associative.*

PROOF. Let $v = \vec{AB}$, $w = \vec{BC}$, $u = \vec{CD}$. From the equality

$$\begin{aligned} v + w &= \vec{AC} \\ \vec{AB} + \vec{BC} &= \vec{AC} \end{aligned}$$

it follows that

$$(10.3.12) \quad \begin{aligned} (v + w) + u &= \vec{AD} \\ \vec{AC} + \vec{CD} &= \vec{AD} \end{aligned}$$

From the equality


$$\begin{aligned} w + u &= \vec{BD} \\ \vec{BC} + \vec{CD} &= \vec{BD} \end{aligned}$$

it follows that

$$(10.3.13) \quad \begin{aligned} v + (w + u) &= \vec{AD} \\ \vec{AB} + \vec{BD} &= \vec{AD} \end{aligned}$$

The theorem follows from comparison of equalities (10.3.12) and (10.3.13). □

THEOREM 10.3.7. *The structure of Abelian group is defined on the set V .*




PROOF. From theorems 10.3.3, 10.3.4, 10.3.5, 10.3.6 it follows that sum of vectors determines group.

Let $v = \vec{AB}$, $w = \vec{BC}$.

$$(10.3.14) \quad \begin{aligned} v + w &= \vec{AC} \\ \vec{AB} + \vec{BC} &= \vec{AC} \end{aligned}$$

According to axiom 10.3.1.3, there exists the point D such that

$$w = \vec{AD} = \vec{BC}$$



The parallelogram law.

According to axiom 10.3.1.4, $\vec{AB} = \vec{DC} = v$. According to definition of sum of vectors

$$(10.3.15) \quad \begin{aligned} \vec{AD} + \vec{DC} &= \vec{AC} \\ w + v &= \vec{AC} \end{aligned}$$

Commutativity of sum follows from equalities (10.3.14) and (10.3.15). □

THEOREM 10.3.8. *The map*

$$(10.3.16) \quad V \rightarrow \text{End}(\emptyset, \overset{\circ}{V})$$

defined by the equality (10.3.1), is a single transitive representation of Abelian group V .

PROOF. The axiom 10.3.1.3 determines the map (10.3.16). From theorem 10.3.5, it follows that the map (10.3.16) is a representation. Efficiency of the representation follows from theorem 10.3.3 and axiom 10.3.1.2. From the axiom 10.3.1.2, it also follows that representation is transitive. Effective and transitive representation is single transitive. □

If we compare the theorem 10.3.8 and statements of the section 10.2, then we see that a single transitive representation of Abelian group V on the set $\overset{\circ}{V}$ is equivalent to axioms of affine space. However, if we use the theorem 10.3.8 as a definition of affine space, we lose many important constructions in affine space. For instance, vector generates parallel translation in affine space. However, we do not have a tool to define rotation of affine space.

If we look carefully at the definition 10.3.1, then we will see that Abelian group V has additional structure since Abelian group V is D -module. Thus, we get the following theorem.

THEOREM 10.3.9. *Let D be commutative ring, V be Abelian group, and $\overset{\circ}{V}$ be any set. If $A \in \overset{\circ}{V}$ and $v \in V$, then we use an expression $A + v$ to denote the action of vector v at the point A . Affine space over D -module V is the diagram of representations*

$$\begin{array}{ccc} \overset{\circ}{V} : D & \xrightarrow{f_{12}} & V \xrightarrow{f_{23}} \overset{\circ}{V} & \begin{array}{l} f_{12}(d) : v \rightarrow d v \\ f_{23}(v) : A \rightarrow A + v \end{array} \end{array}$$

where f_{12} is effective representation of commutative ring D in Abelian group V and f_{23} is single transitive right-side representation of Abelian group V in the set $\overset{\circ}{V}$.

PROOF. We assume that the set $\overset{\circ}{V}$ is not empty; therefore the set $\overset{\circ}{V}$ satisfies the axiom 10.3.1.1. Since $v \in V$ generates the transformation of the set, then, for any $A \in M$, $B \in M$ is defined uniquely such that

$$B = A + v$$

This statement proves the axiom 10.3.1.3. Since the representation f_{23} is single transitive, then for any $A, B \in \overset{\circ}{V}$ there exists unique $v \in V$ such that

$$B = A + v$$

This statement allows us to introduce notation $\overrightarrow{AB} = a$, as well this statement proves the axiom 10.3.1.2. The axiom 10.3.1.4 follows from the statement of the theorem 10.2.4

The representation f_{12} assures that Abelian group V is D -module. \square

The Abelian group V acts single transitive on the set $\overset{\circ}{V}$. From construction in section 10.2, it follows that the basis of the set $\overset{\circ}{V}$ relative to representation of the Abelian group V consists of one point. This point is usually denoted by the letter O and is called **origin of coordinate system of affine space**. Therefore, an arbitrary point $A \in \overset{\circ}{V}$ can be represented using vector $\overrightarrow{OA} \in V$

Let \bar{e} be the basis of D -module V . Then the vector \overrightarrow{OA} has form

$$\overrightarrow{OA} = a^i e_i$$

The set $(a_i, i \in I)$ is called **coordinates of point A of affine space $\overset{\circ}{A}$ relative to basis (O, \bar{e})** .

10.4. Affine Space on Differentiable Manifold

In the section 10.3 we considered the definition of affine geometry. Below we consider a model of affine space in a metric-affine manifold. When we consider connection Γ_{ij}^k in Riemann space, we impose a constraint on connection, 10.3 that the torsion


$$(10.4.1) \quad T_{kl}^i = \Gamma_{lk}^i - \Gamma_{kl}^i$$

is 0 (symmetry of connection) and parallel transport does not change scalar product of vectors. If a metric tensor and an arbitrary connection are defined on a differentiable manifold, then this manifold is called **metric-affine manifold**. 10.4 In particular, connection in metric-affine manifold has torsion.

^{10.3} See the definition of affine connection in Riemann space on the page [4]-443.

^{10.4} See also the definition [9]-6.1.1.

In Riemann space, we use geodesics instead of straight lines. So we can represent the vector v using segment AB of geodesic L_v such that vector v is tangent to geodesic L_v at the point A and length of segment AB equals to length of the vector v .



For given vectors v and w in tangent plane at the point A , let ρ be the length of the vector v and σ be the length of the vector w . Let V be unit vector collinear to the vector v

$$(10.4.2) \quad V^k \rho = v^k$$

Let W be unit vector collinear to the vector w

$$(10.4.3) \quad W^k \sigma = w^k$$

We draw geodesic L_v through the point A using the vector v as a tangent vector to L_v in the point A . Let τ be the canonical parameter on L_v and


$$\frac{dx^k}{d\tau} = V^k$$

We transfer the vector w along the geodesic L_v from the point A into a point B that defined by any value of the parameter $\tau = \rho > 0$. We mark the result as w' .

We draw geodesic $L_{w'}$ through the point B using the vector W' as a tangent vector to $L_{w'}$ in the point B . Let φ' be the canonical parameter on $L_{w'}$ and

$$\frac{dx^k}{d\varphi'} = W'^k$$

We define a point C on the geodesic $L_{w'}$ by parameter value $\varphi' = \sigma$



I assume that length of vectors v and w is small. Then there exists unique geodesic L_u from point A to point C . I will identify segment AC of geodesic L_u and vector $v + w$.

The same way, I draw triangle ADE to find vector $w + v$.

We draw geodesic L_w through the point A using the vector w as a tangent vector to L_w in the point A . Let φ be the canonical parameter on L_w and


$$\frac{dx^k}{d\varphi} = W^k$$

We transfer the vector v along the geodesic L_w from the point A into a point D that defined by any value of the parameter $\varphi = \sigma > 0$. We mark the result as v' .


We draw geodesic $L_{v'}$ through the point D using the vector v' as a tangent vector to $L_{v'}$ in the point D . Let τ' be the canonical parameter on $L_{v'}$ and

$$\frac{dx^k}{d\tau'} = V'^k$$

We define a point E on the geodesic $L_{v'}$ by parameter value $\tau' = \rho$



Formally the lines AB and DE as well as the lines AD and BC are parallel lines. The lengths of AB and DE are the same, and the lengths of AD and BC are the same as well. We call this figure a **parallelogram** based on vectors v and w with the origin in the point A .



LEMMA 10.4.1. Let L_v be an geodesic through the point A and the vector v be a tangent vector to L_v in the point A . An increase of coordinate x^k along geodesic L_v is

$$(10.4.4) \quad \Delta x^k = \frac{dx^k}{d\tau} \tau - \frac{1}{2} \Gamma_{mn}^k \frac{dx^m}{d\tau} \frac{dx^n}{d\tau} \tau^2 + O(\tau^2)$$

where τ is canonical parameter and we take values of derivatives and components Γ_{mn}^k in the initial point.

PROOF. The system of differential equations of geodesic L_v has the following form

$$(10.4.5) \quad \frac{d^2 x^i}{d\tau^2} = -\Gamma_{kl}^i \frac{dx^k}{d\tau} \frac{dx^l}{d\tau}$$

We write Taylor expansion of solution of the system of differential equations (10.4.5) in the following form

$$(10.4.6) \quad \begin{aligned} \Delta x^k &= \frac{dx^k}{d\tau} \tau + \frac{1}{2} \frac{d^2 x^k}{d\tau^2} \tau^2 + O(\tau^2) = \\ &= \frac{dx^k}{d\tau} \tau - \frac{1}{2} \Gamma_{mn}^k \frac{dx^m}{d\tau} \frac{dx^n}{d\tau} \tau^2 + O(\tau^2) \end{aligned}$$

The equality (10.4.4) follows from the equality (10.4.6). □

THEOREM 10.4.2. Suppose $CBADE$ is a parallelogram with a origin in the point A ; then the resulting figure will not be closed [1]. The value of the difference

of coordinates of points C and E is equal to surface integral of the torsion over this parallelogram ^{10.5}

$$\Delta_{CE}x^k = \iint T_{mn}^k dx^m \wedge dx^n$$

PROOF. According to the lemma 10.4.1, an increase of coordinate x^k along the geodesic L_v has the following form

$$\Delta_{AB}x^k = V^k \rho - \frac{1}{2} \Gamma_{mn}^k(A) V^m V^n \rho^2 + O(\rho^2)$$

and an increase of coordinate x^k along the geodesic $L_{b'}$ has the following form

$$(10.4.7) \quad \Delta_{BC}x^k = W'^k \sigma - \frac{1}{2} \Gamma_{mn}^k(B) W'^m W'^n \sigma^2 + O(\sigma^2)$$

Here

$$(10.4.8) \quad \begin{aligned} W'^k &= W^k - \Gamma_{mn}^k(A) W^m \Delta_{AB}x^n + O(dx) \\ &= W^k - \Gamma_{mn}^k(A) W^m V^n \rho + O(\rho) \end{aligned}$$

is the result of parallel transport of the vector w from A to B and

$$(10.4.9) \quad \begin{aligned} \Gamma_{mn}^k(B) &= \Gamma_{mn}^k(A) + \partial_p \Gamma_{mn}^k(B) \Delta_{AB}x^p \\ &= \Gamma_{mn}^k(A) + \partial_p \Gamma_{mn}^k(B) V^p \rho \end{aligned}$$

with precision of small value of first level. Putting (10.4.8), (10.4.9) into (10.4.7) we will receive

$$\Delta_{BC}x^k = W^k \sigma - \Gamma_{mn}^k(A) W^m V^n \sigma \rho - \frac{1}{2} \Gamma_{mn}^k(A) W^m W^n \sigma^2 + O(\rho^2)$$

Total increase of coordinate x^K along the way ABC has form

$$(10.4.10) \quad \begin{aligned} \Delta_{ABC}x^k &= \Delta_{AB}x^k + \Delta_{BC}x^k \\ &= V^k \rho + W^k \sigma - \Gamma_{mn}^k(A) W^m V^n \sigma \rho - \\ &\quad - \frac{1}{2} \Gamma_{mn}^k(A) W^m W^n \sigma^2 - \frac{1}{2} \Gamma_{mn}^k(A) V^m V^n \rho^2 + O(dx^2) \end{aligned}$$

In a similar way, total increase of coordinate x^K along the way ADE has form

$$(10.4.11) \quad \begin{aligned} \Delta_{ADE}x^k &= \Delta_{AD}x^k + \Delta_{DE}x^k = \\ &= W^k \sigma + V^k \rho - \Gamma_{mn}^k(A) V^m W^n \rho \sigma - \\ &\quad - \frac{1}{2} \Gamma_{mn}^k(A) V^m V^n \rho^2 - \frac{1}{2} \Gamma_{mn}^k(A) W^m W^n \sigma^2 + O(dx^2) \end{aligned}$$

From (10.4.10) and (10.4.11), it follows that

$$\begin{aligned} \Delta_{ADE}x^k - \Delta_{ABC}x^k &= -\Gamma_{mn}^k(A) V^m W^n \rho \sigma \\ &\quad - \frac{1}{2} \Gamma_{mn}^k(A) V^m V^n \rho^2 - \frac{1}{2} \Gamma_{mn}^k(A) W^m W^n \sigma^2 \\ &\quad + \Gamma_{mn}^k(A) W^m V^n \sigma \rho \\ &\quad + \frac{1}{2} \Gamma_{mn}^k(A) W^m W^n \sigma^2 + \frac{1}{2} \Gamma_{mn}^k(A) V^m V^n \rho^2 \end{aligned}$$

^{10.5}Proof of this statement I found in [3]

and we get integral sum for expression


$$\Delta_{ADE}x^k - \Delta_{ABC}x^k = \iint_{\Sigma} (\Gamma_{nm}^k - \Gamma_{mn}^k) dx^m \wedge dx^n$$

□

THEOREM 10.4.3. *In Riemann space the parallelogram $ABCD$ is closed. At the point A , geodesic AC has a tangent vector u which is sum of vectors v and w*

$$(10.4.12) \quad u^k = v^k + w^k$$

Therefore, a sum of vectors in Riemann space is commutative.



PROOF. Let π be the length of the vector u . Let U be unit vector collinear to the vector u

$$(10.4.13) \quad U^k \pi = u^k$$

According to the lemma 10.4.1, an increase of coordinate x^k along the geodesic L_u has the following form

$$(10.4.14) \quad \Delta_{AC}x^k = U^k \pi - \frac{1}{2} \Gamma_{mn}^k(A) U^m U^n \pi^2 + O(\pi^2)$$

Equalities

$$(10.4.15) \quad U^k \pi = V^k \rho + W^k \sigma$$

$$(10.4.16) \quad \begin{aligned} & \Gamma_{mn}^k(A) U^m U^n \pi^2 \\ &= 2\Gamma_{mn}^k(A) W^m V^n \sigma \rho + \Gamma_{mn}^k(A) W^m W^n \sigma^2 + \Gamma_{mn}^k(A) V^m V^n \rho^2 \end{aligned}$$

follow from equalities (10.4.10), (10.4.14). The equality (10.4.12) follows from equalities (10.4.2), (10.4.3), (10.4.13), (10.4.15). The equality

$$(10.4.17) \quad \Gamma_{mn}^k(A) u^m u^n = 2\Gamma_{mn}^k(A) w^m v^n + \Gamma_{mn}^k(A) w^m w^n + \Gamma_{mn}^k(A) v^m v^n$$

follows from equalities (10.4.2), (10.4.3), (10.4.13), (10.4.16). The equality

$$(10.4.18) \quad \begin{aligned} \Gamma_{mn}^k(A) u^m u^n &= \Gamma_{mn}^k(A) (v^m + w^m)(v^n + w^n) \\ &= \Gamma_{mn}^k(A) (v^m v^n + v^m w^n + w^m v^n + w^m w^n) \end{aligned}$$

follows from the equality (10.4.12). The equality (10.4.17) follows from the equality (10.4.18) and from the symmetry of connection. Therefore, the geodesic AC is sum of geodesic AB and BC . □

If connection is not symmetric, then geodesic L_u does not contain points C and E . Therefore, sum of vectors in metric-affine manifold is noncommutative.

THEOREM 10.4.4. *There exists vector t such that*

$$(10.4.19) \quad (v + w)^k = v^k + w^k + t^k$$

$$(10.4.20) \quad (w + v)^k = v^k + w^k - t^k$$

Coordinates of the vector t satisfy system of equations

$$(10.4.21) \quad \Gamma_{mn}^k(A)t^m t^n + (\Gamma_{mn}^k(A) + \Gamma_{nm}^k(A))(v^m + w^m)t^n + 2T_{mn}^k(A)v^m w^n = 0$$

PROOF. We first consider the vector $v + w$. The equality

$$(10.4.22) \quad \begin{aligned} & v^k + w^k + t^k - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)(v^m + w^m + t^m)(v^n + w^n + t^n) \\ &= v^k + w^k - \Gamma_{mn}^k(A)w^m v^n - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)w^m w^n - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)v^m v^n \end{aligned}$$

follows from the equality (10.4.10) and the lemma 10.4.1. The equality

$$(10.4.23) \quad \begin{aligned} & v^k + w^k + t^k \\ & - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)v^m v^n + \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)v^m w^n + \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)v^m t^n \\ & + \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)w^m v^n + \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)w^m w^n + \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)w^m t^n \\ & + \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)t^m v^n + \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)t^m w^n + \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)t^m t^n \\ &= v^k + w^k - \Gamma_{mn}^k(A)w^m v^n - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)w^m w^n - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)v^m v^n \end{aligned}$$

follows from the equality (10.4.22). The equality

$$(10.4.24) \quad \begin{aligned} & t^k - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)v^m w^n - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)v^m t^n - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)w^m t^n \\ & - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)t^m v^n - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)t^m w^n - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)t^m t^n \\ &= -\frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)w^m v^n \end{aligned}$$

follows from the equality (10.4.23). The equality

$$(10.4.25) \quad \begin{aligned} & \Gamma_{mn}^k(A)t^m t^n + (\Gamma_{mn}^k(A)v^m + \Gamma_{mn}^k(A)w^m \\ & + \Gamma_{nm}^k(A)v^m + \Gamma_{nm}^k(A)w^m - 2\delta_n^k)t^n \\ & + 2T_{mn}^k(A)v^m w^n = 0 \end{aligned}$$

follows from the equality (10.4.24). The equality (10.4.21) follows from the equality (10.4.25).

Now we consider the vector $w + v$. The equality

$$(10.4.26) \quad \begin{aligned} & v^k + w^k - t^k - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)(v^m + w^m - t^m)(v^n + w^n - t^n) \\ &= w^k + v^k - \Gamma_{mn}^k(A)v^m w^n - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)v^m v^n - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)w^m w^n \end{aligned}$$

follows from the equality (10.4.11) and the lemma 10.4.1. The equality

$$\begin{aligned}
 & v^k + w^k - t^k \\
 & - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)v^mv^n - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)v^mw^n + \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)v^mt^n \\
 (10.4.27) \quad & - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)w^mv^n - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)w^mw^n + \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)w^mt^n \\
 & + \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)t^mv^n + \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)t^mw^n - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)t^mt^n \\
 & = w^k + v^k - \Gamma_{mn}^k(A)v^mw^n - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)v^mv^n - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)w^mw^n
 \end{aligned}$$

follows from the equality (10.4.26). The equality

$$\begin{aligned}
 & - t^k \\
 & + \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)v^mt^n \\
 (10.4.28) \quad & - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)w^mv^n + \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)w^mt^n \\
 & + \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)t^mv^n + \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)t^mw^n - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)t^mt^n \\
 & = - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)v^mw^n
 \end{aligned}$$

follows from the equality (10.4.27). The equality

$$\begin{aligned}
 & \Gamma_{mn}^k(A)t^mt^n + (\Gamma_{mn}^k(A)v^m + \Gamma_{mn}^k(A)w^m \\
 (10.4.29) \quad & + \Gamma_{nm}^k(A)v^m + \Gamma_{nm}^k(A)w^m - 2\delta_n^k)t^n \\
 & + 2T_{nm}^k(A)v^mw^n = 0
 \end{aligned}$$


follows from the equality (10.4.28). The equality (10.4.21) follows from the equality (10.4.29). \square

It is not a simple question to answer whether the system of equations (10.4.21) has a solution. However there is another way to find coordinates of vector t .

We draw geodesic L_{v+w} through the point A using the vector $v+w$ as a tangent vector to L_{v+w} in the point A . We draw geodesic L_{w+v} through the point A using the vector $w+v$ as a tangent vector to L_{w+v} in the point A . We draw geodesic L_{v+w} through the point A

$$u^k = v^k + w^k$$

using the vector $v+w$ as a tangent vector to L_{v+w} in the point A .



According to theorems 10.4.2, 10.4.4, the point F is the middle of the segment EC . Therefore it is possible to consider the segment AF as the median of the triangle ACE . According to the theorem 10.4.4, we identify the segment FC and

vektor t . Therefore, the theorem 10.4.2 gives us the way to find coordinates of vector t .

10.5. Noncommutative module

In the section 10.4, we considered opportunity to study affine geometry on affine manifold. This geometry has two features. The set of vectors is not closed relative sum and addition operation may be noncommutative.

We are not ready to consider first problem; however we can consider questions related to the noncommutativity of sum of vectors. The representation

$$f : D \longrightarrow G$$

of commutative ring D in arbitrary group G is called non-commutative module. This representation is much like a module, so all theorems about the structure of module are true. However, the question about the structure of basis remains open.

In general

$$av + bw \neq bw + av$$

Therefore, the question arises: what set of group G we want to consider as a basis.

We can construct a basis the same way as we do a basis of module. Then this basis should permit expression

$$av + bw + cv$$

Or we may require items of basis to be in strict order in linear combination. In this case we assume that if (v, w) is a basis of non-commutative module V , then for any expression $bw + av$ there exist $c, d \in D$ such that

$$cv + dw = bw + av$$

References

- [1] F. W. Hehl, P. von der Heyde, G. D. Kerlick, and J. M. Nester, General relativity with spin and torsion: Foundations and prospects, *Rev. Mod. Phys.* **48**, 393 (1976)
- [2] Serge Lang, Algebra, Springer, 2002
- [3] G. E. Shilov, Calculus, Multivariable Functions, Moscow, Nauka, 1972
- [4] P. K. Rashevsky, Riemann Geometry and Tensor Calculus, Moscow, Nauka, 1967
- [5] A. G. Kurosh, Lectures on General Algebra, Chelsea Pub Co, 1965
- [6] Kevin McCrimmon; A Taste of Jordan Algebras; Springer, 2004
- [7] V. V. Zharinov, Algebraic and geometric foundation of mathematical physics, Lecture courses of the scientific and educational center, 9, Steklov Math. Institute of RAS, Moscow, 2008
- [8] Aleks Kleyn, Biring of Matrices, eprint [arXiv:math.OA/0612111](https://arxiv.org/abs/math.OA/0612111) (2007)
- [9] Aleks Kleyn, Lorentz Transformation and General Covariance Principle, eprint [arXiv:0803.3276](https://arxiv.org/abs/0803.3276) (2009)
- [10] Aleks Kleyn, Introduction into Geometry over Division Ring, eprint [arXiv:0906.0135](https://arxiv.org/abs/0906.0135) (2010)
- [11] Aleks Kleyn, Alexandre Laugier, Orthonormal Basis in Minkowski Space, eprint [arXiv:1201.4158](https://arxiv.org/abs/1201.4158) (2012)
- [12] Aleks Kleyn, Linear Map of D -Algebra, eprint [arXiv:1502.04063](https://arxiv.org/abs/1502.04063) (2015)
- [13] John C. Baez, The Octonions, eprint [arXiv:math.RA/0105155](https://arxiv.org/abs/math.RA/0105155) (2002)
- [14] Paul M. Cohn, Universal Algebra, Springer, 1981
- [15] Paul M. Cohn, Algebra, Volume 1, John Wiley & Sons, 1982
- [16] N. Bourbaki, Algebra 1, Springer, 2004
- [17] N. Bourbaki, Lie Groups and Lie Algebras, Chapters 1 - 3, Springer, 1989
- [18] Postnikov M. M., Geometry IV: Differential geometry, Moscow, Nauka, 1983
- [19] Alekseyevskii D. V., Vinogradov A. M., Lychagin V. V., Basic Concepts of Differential Geometry
VINITI Summary 28
Moscow. VINITI, 1988
- [20] Richard D. Schafer, An Introduction to Nonassociative Algebras, Dover Publications, Inc., New York, 1995

- [21] Paul Bamberg, Shlomo Sternberg, A course in mathematics for students of physics, Cambridge University Press, 1991

Index

- A^* -module 154
- A^* -vector space 154
- A -representation in Ω -algebra 17, 74
- Abelian multiplicative Ω -group 55
- Abelian Ω -group 42
- Abelian semigroup 16
- active representation in basis manifold 100, 131
- active transformation of basis manifold 100, 131
- additive map 40
- affine space 173, 176
- algebra over ring 152
- arity 10
- associative law 72, 72, 73, 73, 140, 156, 163
- associative multiplicative Ω -group 55
- associative Ω -group 42
- associative operation 16
- automorphism 11
- automorphism of diagram of representations 113
- automorphism of representation of Ω -algebra 36

- basis for vector space 144, 160, 167
- basis manifold 100, 131
- basis of diagram of representations 129
- basis of representation 97
- biring 60

- can be embedded 11
- carrier of Ω -algebra 10
- Cartesian power 9
- Cartesian product of Ω -algebras 13
- category of representations 43, 48
- commutative diagram of representations of universal algebras 107
- commutative operation 16
- commutativity of representations 140, 155, 162
- condition of reducibility of products 61
- congruence 15
- coordinate matrix of vector 145, 160, 168
- coordinate representation 102, 133
- coordinates 145, 160, 168
- coordinates of A_2 -number m relative to set X 88, 119

- coordinates of geometric object 103, 134
- coordinates of morphism of diagram of representations 123
- coordinates of point A of affine space $\overset{\circ}{A}$ relative to basis (O, \bar{e}) 177
- coordinates of reduced morphism of representation 91
- $*_*$ -product (product column over row) 59

- D -algebra 152
- D -module 139
- diagram of representations of universal algebras 106
- direct product of Ω -algebras 13
- distributive law 42, 56, 57, 140, 156, 163
- duality principle for biring 60
- duality principle for biring of matrices 60

- effective representation 17, 79
- endomorphism 11
- endomorphism of diagram of representations 113
- endomorphism of representation of Ω -algebra 35
- epimorphism 11
- equivalence 7

- free algebra over ring 152
- free module 146, 161, 169
- free representation 18, 18, 80

- generating set 86, 117, 144, 144, 159, 159, 167, 167
- geometric object 103, 134
- geometric object in coordinate representation 103, 134
- geometric object of type H 103, 134
- group of automorphisms of representation 36, 113

- homogeneous space 81
- homomorphic image 11
- homomorphism 11

- induction over diagram of representations 106
- invariance principle 103, 135

- invariance principle in D_*^* -vector space
103, 135
- isomorphism 11
- isomorphism of representations of Ω -algebra
26
- kernel of homomorphism 15
- kernel of map 7
- left A -module 154
- left A -vector space 154
- left module 154
- left shift of module 153
- left shift on group 74
- left vector space 154
- left-side A_1 -representation 71
- left-side product 71, 157
- left-side representation 71
- linear combination 143, 159, 166
- linear map 146, 147
- linearly dependent 143, 159, 166
- linearly dependent set 144, 159, 167
- linearly independent set 144, 159, 167
- little group 80
- map is compatible with operation 11
- matrix 58
- matrix of linear map 147, 148
- metric-affine manifold 177
- module over ring 139
- monomorphism 11
- morphism from diagram of representations
into diagram of representations 110
- morphism of representation f 21
- morphism of representations from f into g
20
- morphism of representations of Ω_1 -algebra
in Ω_2 -algebra 20
- multiplicative Ω -group 55
- n -ary operation on set 9
- natural homomorphism 15
- neutral element of operation 15
- operation on set 9
- operator domain 10
- orbit of representation 77, 78
- origin of coordinate system of affine space
177
- parallelogram 179
- passive representation in basis manifold
100, 132
- passive transformation of basis manifold
100, 132
- polyadditive map 40
- polylinear map 149
- polymorphism of representations 47
- product in category 12
- product of morphisms of diagram of
representations 113
- product of morphisms of representations of
universal algebra 25
- quasibasis of diagram of representations
126
- quasibasis of representation 94
- $*^*$ -product (product of row over column)
59
- reduced morphism of representations 31
- reduced polymorphism of representations
52
- reducible biring 61
- reflexive correspondence 7
- regular endomorphism 94, 126
- representation of Ω_1 -algebra A in Ω_2 -
algebra M 17, 74
- representative of geometric object 103, 134
- right A -vector space 162
- right module 162
- right shift on group 75
- right vector space 162
- right-side A_1 -representation 73
- right-side product 73, 165
- right-side representation 73
- semigroup 16
- set admits operation 10
- set is closed with respect to operation 10
- set of coordinates of representation 89, 119
- set of Ω_2 -words of representation 86
- set of tuples of Ω -words 117
- single transitive representation of Ω -algebra
 A 19, 80
- singular endomorphism 94, 126
- space of orbits of left-side representation
79
- stability group 80
- stable set of representation 84
- subalgebra of Ω -algebra 10
- submodule generated by set 144, 159, 167
- subrepresentation 84, 86, 115, 117
- sum of maps 149, 151
- symmetric correspondence 7
- tensor power 62
- tensor product 61
- tower of representations of Ω -algebras 105
- transformation coordinated with
equivalence 25
- transitive correspondence 7
- transitive representation of Ω -algebra A 19
- tuple of Ω -words 117
- tuple of stable sets of diagram of
representations 115
- twin representations 82

- unital extension 140, 156, 163
- unitarity law 140, 156, 163
- universal algebra 10

- vector 139, 154, 154, 162, 162
- vector $*A$ -space 162

- Ω -algebra 10
- Ω -group 42
- Ω -groupoid 75
- Ω -ring 57
- Ω_2 -word of element of representation
 - relative to generating set 86

Special Symbols and Notations

- $A(f)$ active representation in basis manifold 100, 131
 $\mathcal{A}_1(\mathcal{A}_2)$ category of representations 43
 $A_1(\mathcal{A}_2)$ category of representations 48
 $a *_b$ $*$ -product 59
 $A \cong B$ isomorphic 11
 $w^i v_i$ linear combination 143, 159
 $w^* v$ linear combination 143, 159
 $v_i w^i$ linear combination 166
 $v_* w$ linear combination 166
 A_{1a_2} little group 80
 A_Ω Ω -algebra 10
 $a *_b$ $*$ -product 59
 $\mathcal{A}(A_2 \rightarrow B_2)$ set of additive maps 40
 $A_{(1)}v$ set of vectors generated by vector v 156, 163
 A_2/A_1 space of orbits of representation 79
 A_{1a_2} stability group 80
 $\mathcal{B}[f]$ basis manifold 100, 131
 B^A Cartesian power 9
 \mathcal{B}_f lattice of subrepresentations 85
 $\mathcal{B}[f, A]$ lattice of subrepresentations 116
 $B_1 \times \dots \times B_n$ product in category 12
 $B^{\otimes n}$ tensor power of representation 62
 df product of map over scalar 151, 152
 $D_{(1)}v$ set of vectors generated by vector v 140
 $\bar{e} = (e_i, i \in I)$ basis for module 144, 160, 167
 $\bar{e} \circ S$ image of basis \bar{e} under passive transformation S 100
 $\bar{e} \circ s$ image of basis \bar{e} under passive transformation S 132
 $\text{End}(\Omega; A)$ set of endomorphisms 11
 $A_1 * a_2$ orbit of representation 77
 $a_2 * A_1$ orbit of representation 78
 $f + g$ sum of maps 149, 150
 $GA(f)$ group of automorphisms of representation f 36, 113
 $\text{Hom}(\Omega; A \rightarrow B)$ set of homomorphisms 11
 $J[f]$ closure operator of representation f 85, 116
 $J[f, X]$ subrepresentation generated by generating set X 85, 117
 $\ker f$ kernel of homomorphism 15
 $\ker f$ kernel of map 7
 $L(b)$ left shift 74
 $w^i v_i$ linear combination 143, 159
 $w^* v$ linear combination 143, 159
 $v_i w^i$ linear combination 166
 $v_* w$ linear combination 166
 $\mathcal{L}(D_1 \rightarrow D_2; A_1 \rightarrow A_2)$ set of linear maps 146
 $\mathcal{L}(D; A_1 \rightarrow A_2)$ set of linear maps 147
 $\mathcal{L}(D; A_1 \times \dots \times A_n \rightarrow S)$ set of polylinear maps 149
 $\mathcal{L}(D; A^n \rightarrow S)$ set of n -linear maps 149
 $\mathcal{O}(f, g, \bar{e}_g, m)$ geometric object in coordinate representation 103
 $\mathcal{O}(f, g, \bar{e}_g, a)$ geometric object in coordinate representation 134
 $B_1 \otimes \dots \otimes B_n$ tensor product 61
 $P(f)$ passive representation in basis manifold 100, 132
 $R(b)$ right shift 75
 \vec{V} affine space 176
 $W[f, X]$ set of coordinates of representation $J(f, X)$ 89
 $W_{(k)}[f, X]$ set of coordinates of representation $J(f, X)$ 119
 $W[f, X, m]$ coordinates of element m of representation f relative to set X 88
 $W_{(k)}[f, X, a]$ coordinates of element m of representation f relative to set X 119
 $w[f, X]$ set of tuples of Ω -words 117
 $W[f, X, B]$ set of coordinates of set $B \subset J(f, X)$ 88

- $W_{(k)}[f, X, B]$ set of coordinates of set
 $B \subset J(f, X)$ 119
 $w[f, X, B]$ set of Ω_2 -words representing
set $B \subset J(f, X)$ 86
 $W[g, Y, R(X)] \circ W[f, X, m]$ superposition
of coordinates 92
 $W_{(k)}[g, Y, r_{(k)}(X_{(k)})] \circ W_{(k)}[f, X, a_{(k)}]$
superposition of coordinates 123
 $w[f, X, a]$ tuple of Ω -words 117
 $w[f, X, m]$ Ω_2 -word representing element
 $m \in J(f, X)$ 86
 $w[f, X]$ set of Ω_2 -words of representation
 $J(f, X)$ 86
 Ω operator domain 10
 $\Omega(n)$ set of n -ary operators 10
 $\prod_{i \in I} B_i$ product in category 12
 $\prod_{i=1}^n B_i$ product in category 12

Диаграмма представлений универсальных алгебр

Александр Клейн

arXiv:1908.04418v1 [math.GM] 9 Aug 2019

Aleks_Kleyn@MailAPS.org
<http://AleksKleyn.dyndns-home.com:4080/>
<http://sites.google.com/site/AleksKleyn/>
http://arxiv.org/a/kleyn_a_1
<http://AleksKleyn.blogspot.com/>

Аннотация. Теория представлений универсальной алгебры является естественным развитием теории универсальной алгебры. В книге рассмотрены представление универсальной алгебры, диаграммы представлений и примеры представления. Морфизм представления - это отображение, сохраняющее структуру представления. Изучение морфизмов представлений ведёт к понятиям множества образующих и базиса представления.

Оглавление

Глава 1. Предисловие	5
1.1. Теория представлений	5
1.2. На грани теории	6
Глава 2. Предварительные определения	7
2.1. Отношение эквивалентности	7
2.2. Универсальная алгебра	9
2.3. Декартово произведение универсальных алгебр	12
2.4. Полугруппа	16
Глава 3. Представление универсальной алгебры	17
3.1. Представление универсальной алгебры	17
3.2. Морфизм представлений универсальной алгебры	20
3.3. Теорема о разложении морфизмов расслоений	25
3.4. Приведенный морфизм представлений	31
3.5. Автоморфизм представления универсальной алгебры	37
Глава 4. Ω -группа	39
4.1. Множество гомоморфизмов Ω -алгебры	39
4.2. Ω -группа	41
4.3. Декартово произведение представлений	44
4.4. Приведенное декартово произведение представлений	50
4.5. Мультипликативная Ω -группа	54
4.6. Ω -кольцо	59
4.7. Тензорное произведение представлений	63
4.8. Ассоциативность тензорного произведения	69
Глава 5. Представление мультипликативной Ω -группы	71
5.1. Представление мультипликативной Ω -группы	71
5.2. Левый и правый сдвиги	77
5.3. Орбита представления мультипликативной Ω -группы	79
5.4. Представление в Ω -группе	82
5.5. Однотранзитивное правостороннее представление группы	82
Глава 6. Базис представления универсальной алгебры	87
6.1. Множество образующих представления	87
6.2. Базис представления	98
6.3. Свободное представление	103
6.4. Многообразие базисов представления	103
6.5. Геометрический объект представления универсальной алгебры	105

Глава 7. Диаграмма представлений универсальных алгебр	109
7.1. Диаграмма представлений универсальных алгебр	109
7.2. Морфизм диаграммы представлений	114
7.3. Автоморфизм диаграммы представлений	118
Глава 8. Базис диаграммы представлений универсальной алгебры	120
8.1. Множество образующих диаграммы представлений	120
8.2. Базис диаграммы представлений	132
8.3. Многообразие базисов диаграммы представлений	137
8.4. Геометрический объект диаграммы представлений	138
Глава 9. Примеры диаграммы представлений: модуль	142
9.1. Об этой главе	142
9.2. Абелева группа	143
9.3. Векторное пространство	146
9.3.1. Модуль над коммутативным кольцом	146
9.3.2. Линейное отображение	153
9.3.3. Полилинейное отображение	156
9.4. Алгебра над коммутативным кольцом	159
9.5. Левый модуль над алгеброй	162
9.6. Правый модуль над алгеброй	169
9.7. Левый модуль над неассоциативной алгеброй	177
Глава 10. Примеры диаграммы представлений: аффинная геометрия	179
10.1. Об этой главе	179
10.2. Представление группы на множестве	180
10.3. Аффинное пространство	181
10.4. Аффинное пространство на дифференцируемом многообразии	186
10.5. Некоммутативный модуль	192
Список литературы	194
Предметный указатель	196
Специальные символы и обозначения	199

Предисловие

1.1. Теория представлений

В статьях я часто рассматриваю вопросы, связанные с представлением универсальной алгебры. Вначале это были небольшие наброски, которые я многократно исправлял и переписывал. Но постепенно появлялись новые наблюдения. В результате вспомогательный инструмент превратился в стройную теорию.

Я это понял, когда я работал над книгой [10], и решил посвятить отдельную книгу вопросам, связанным с представлением универсальной алгебры. Изучение теории представлений универсальной алгебры показывает, что эта теория имеет много общего с теорией универсальной алгебры.

Основным толчком к более глубокому изучению представлений универсальной алгебры послужило определение векторного пространства как представление поля в абелевой группе. Я обратил внимание, что это определение меняет роль линейного отображения. По сути, линейное отображение - это отображение, которое сохраняет структуру представления. Эту конструкцию легко обобщить на произвольное представление универсальной алгебры. Таким образом появилось понятие морфизма представлений.

Множество невырожденных автоморфизмов векторного пространства порождает группу. Эта группа действует транзитивно на множестве базисов векторного пространства. Это утверждение является фундаментом теории инвариантов векторного пространства.

Возникает естественный вопрос. Можно ли обобщить эту конструкцию на произвольное представление? Базис - это не единственное множество, которое порождает векторное пространство. Если мы к множеству векторов базиса добавим произвольный вектор, то новое множество по-прежнему порождает тоже самое векторное пространство, но базисом не является. Это утверждение является исходной точкой, от которой я начал изучение множества образующих представления. Множество образующих представления - это ещё одна интересная параллель теории представлений с теорией универсальной алгебры.

Множество автоморфизмов представления является лупой. Неассоциативность произведения порождает многочисленные вопросы, которые требуют дополнительного исследования. Все эти вопросы ведут к необходимости понимания теории инвариантов заданного представления.

Если мы рассматриваем теорию представлений универсальной алгебры как расширение теории универсальной алгебры, то почему не рассмотреть представление одного представления в другом представлении. Так появилась концепция башни представлений. Самый удивительный факт - это то, что все отображения в башне представлений действуют согласовано.

1.2. На грани теории

На протяжении многих лет я считал, что теория представлений является основным инструментом для изучения принципа общековариантности. Однако в процессе подготовки этой книги я неожиданно оказался на грани применимости теории представлений. Я не мог пройти мимо этого крайне важного события.

Точнее это было два разных открытия, связанных между собой темой некоммутативного сложения. Сначала я обнаружил, что я могу моделировать аффинную геометрию на многообразии аффинной связности (Тоже мне открытие. Думаю люди об этом знали со времён Декарта и Гауса). Здесь самым главным для меня было утверждение, что сумма определена не для любой пары векторов. Похожую задачу я видел, когда изучал многообразие базисов пространства Минковского ([11]). Если связность на аффинном многообразии имеет ненулевое кручение, то сумма векторов становится некоммутативной.

Позднее я решил исследовать представление кольца в неабелевой группе. Хотя алгебра замкнута относительно операции, я вижу возможность дальнейшего развития теории представлений. Мы можем пользоваться определением базиса из этой книги, однако некоторые важные детали будут спрятаны. Для меня интересна версия, что элементы базиса могут иметь заданный порядок, но сейчас я недостаточно ясно представляю какие из этого могут быть следствия.

Предварительные определения

В этой главе собраны определения и теоремы, которые необходимы для понимания текста предлагаемой книги. Поэтому читатель может обращаться к утверждениям из этой главы по мере чтения основного текста книги.

2.1. Отношение эквивалентности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.1.1. Соответствие $\Phi \in A \times A$ называется **отношением эквивалентности**, если ^{2.1}

2.1.1.1: соответствие Φ **рефлексивно**

$$(a, a) \in \Phi$$

2.1.1.2: соответствие Φ **симметрично**

$$(a, b) \in \Phi \Rightarrow (b, a) \in \Phi$$

2.1.1.3: соответствие Φ **транзитивно**

$$(a, b), (b, c) \in \Phi \Rightarrow (a, c) \in \Phi$$

□

ТЕОРЕМА 2.1.2. Для отображения

$$f : A \rightarrow B$$

множество

$$(2.1.1) \quad \ker f = \{(a, b) : a, b \in A, f(a) = f(b)\}$$

является отношением эквивалентности и называется **ядром отображения**. ^{2.2}

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.

ЛЕММА 2.1.3. Соответствие $\ker f$ рефлексивно.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из равенства

$$f(a) = f(a)$$

и определения (2.1.1) следует, что

$$(2.1.2) \quad (a, a) \in \ker f$$

Лемма является следствием утверждения (2.1.2) и определения 2.1.1.1. ◉

ЛЕММА 2.1.4. Соответствие $\ker f$ симметрично.

^{2.1} Смотри также определение на странице [14]-27.

^{2.2} Смотри также определение на странице [14]-28.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Равенство

$$(2.1.3) \quad f(a) = f(b)$$

является следствием утверждения

$$(a, b) \in \ker f$$

и определения (2.1.1). Равенство

$$(2.1.4) \quad f(b) = f(a)$$

является следствием равенства (2.1.3). Утверждение

$$(b, a) \in \ker f$$

является следствием равенства (2.1.4) и определения (2.1.1). Следовательно, мы доказали утверждение

$$(2.1.5) \quad (a, b) \in \ker f \Rightarrow (b, a) \in \ker f$$

Лемма является следствием утверждения (2.1.5) и определения 2.1.1.2. \odot

ЛЕММА 2.1.5. *Соответствие $\ker f$ транзитивно.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Равенство

$$(2.1.6) \quad f(a) = f(b)$$

является следствием утверждения

$$(a, b) \in \ker f$$

и определения (2.1.1). Равенство

$$(2.1.7) \quad f(b) = f(c)$$

является следствием утверждения

$$(b, c) \in \ker f$$

и определения (2.1.1). Равенство

$$(2.1.8) \quad f(a) = f(c)$$

является следствием равенств (2.1.6), (2.1.7). Утверждение

$$(a, c) \in \ker f$$

является следствием равенства (2.1.8) и определения (2.1.1). Следовательно, мы доказали утверждение

$$(2.1.9) \quad (a, b), (b, c) \in \ker f \Rightarrow (a, c) \in \ker f$$

Лемма является следствием утверждения (2.1.9) и определения 2.1.1.2. \odot

Утверждение теоремы является следствием лем 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 и определения 2.1.1. \square


ТЕОРЕМА 2.1.6. *Пусть N - отношение эквивалентности на множестве A . Рассмотрим категорию \mathcal{A} объектами которой являются отображения^{2.3}*

$$f_1 : A \rightarrow S_1 \quad \ker f_1 \supseteq N$$

$$f_2 : A \rightarrow S_2 \quad \ker f_2 \supseteq N$$

^{2.3} Утверждение леммы аналогично утверждению на с. [2]-94.

Мы определим морфизм $f_1 \rightarrow f_2$ как отображение $h : S_1 \rightarrow S_2$, для которого коммутативна диаграмма




Отображение

$$\text{nat } N : A \rightarrow A/N$$

является универсально отталкивающим в категории \mathcal{A} .^{2.4}

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Рассмотрим диаграмму



$$(2.1.10) \quad \ker f \supseteq N$$

Из утверждения (2.1.10) и равенства

$$j(a_1) = j(a_2)$$

следует

$$f(a_1) = f(a_2)$$

Следовательно, мы можем однозначно определить отображение h с помощью равенства

$$h(j(b)) = f(b)$$

□

2.2. Универсальная алгебра

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.2.1. Для любых множеств^{2.5} A, B , декартова степень B^A - это множество отображений

$$f : A \rightarrow B$$

□

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.2.2. Пусть дано множество A и целое число $n \geq 0$. Отображение^{2.6}

$$\omega : A^n \rightarrow A$$

^{2.4}Определение универсального объекта смотри в определении на с. [2]-47.

^{2.5} Я следую определению из примера (iV), [14], страницы 17, 18.

^{2.6} Определения 2.2.2, 2.2.7 опираются на определение в примере (vi), страница [14]-26.

называется n -арной операцией на множестве A или просто операцией на множестве A . Для любых $a_1, \dots, a_n \in A$, мы пользуемся любой из форм записи $\omega(a_1, \dots, a_n)$, $a_1 \dots a_n \omega$ для обозначения образа отображения ω . \square

ЗАМЕЧАНИЕ 2.2.3. Согласно определениям 2.2.1, 2.2.2, n -арная операция $\omega \in A^{A^n}$. \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.2.4. Область операторов - это множество операторов^{2.7} Ω вместе с отображением

$$a : \Omega \rightarrow N$$

Если $\omega \in \Omega$, то $a(\omega)$ называется **арностью** оператора ω . Если $a(\omega) = n$, то оператор ω называется n -арным. Мы пользуемся обозначением

$$\Omega(n) = \{\omega \in \Omega : a(\omega) = n\}$$

для множества n -арных операторов. \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.2.5. Пусть A - множество, а Ω - область операторов.^{2.8} Семейство отображений

$$\Omega(n) \rightarrow A^{A^n} \quad n \in N$$

называется структурой Ω -алгебры на A . Множество A со структурой Ω -алгебры называется Ω -алгеброй A_Ω или универсальной алгеброй. Множество A называется носителем Ω -алгебры. \square

Область операторов Ω описывает множество Ω -алгебр. Элемент множества Ω называется оператором, так как операция предполагает некоторое множество. Согласно замечанию 2.2.3 и определению 2.2.5, каждому оператору $\omega \in \Omega(n)$ сопоставляется n -арная операция ω на A .

ТЕОРЕМА 2.2.6. Пусть множество B является Ω -алгеброй. Тогда множество B^A отображений

$$f : A \rightarrow B$$

также является Ω -алгеброй.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\omega \in \Omega(n)$. Для отображений $f_1, \dots, f_n \in B^A$, мы определим операцию ω равенством

$$(f_1 \dots f_n \omega)(x) = f_1(x) \dots f_n(x) \omega$$

\square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.2.7. Пусть $B \subseteq A$. Если для любых $b_1, \dots, b_n \in B$, $b_1 \dots b_n \omega \in B$, то мы говорим, что B замкнуто относительно ω или что B допускает операцию ω . \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.2.8. Ω -алгебра B_Ω является подалгеброй Ω -алгебры A_Ω , если верны следующие утверждения^{2.9}

2.2.8.1: $B \subseteq A$.

2.2.8.2: Если оператор $\omega \in \Omega$ определяет операции ω_A на A и ω_B на B , то

$$\omega_A|_B = \omega_B$$

^{2.7} Я следую определению 1, страница [14]-62.

^{2.8} Я следую определению 2, страница [14]-62.

^{2.9} Я следую определению на странице [14]-62.

□

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.2.9. Пусть A, B - Ω -алгебры и $\omega \in \Omega(n)$. *Отображение* ^{2.10}

$$f : A \rightarrow B$$

согласовано с операцией ω , если, для любых $a_1, \dots, a_n \in A$,

$$(2.2.1) \quad f(a_1) \dots f(a_n) \omega = f(a_1 \dots a_n \omega)$$

Отображение f называется **гомоморфизмом** Ω -алгебры A в Ω -алгебру B , если f согласовано с каждым $\omega \in \Omega$. Мы обозначим $\text{Hom}(\Omega; A \rightarrow B)$ множество гомоморфизмов Ω -алгебры A в Ω -алгебру B . □

ТЕОРЕМА 2.2.10. Если область операторов пуста, то гомоморфизм Ω -алгебры A в Ω -алгебру B - это отображение

$$f : A \rightarrow B$$

Следовательно, $\text{Hom}(\emptyset; A \rightarrow B) = B^A$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Теорема является следствием определений [2.2.1](#), [2.2.9](#). □

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.2.11. Гомоморфизм f называется ^{2.11} **изоморфизмом** между A и B , если соответствие f^{-1} является гомоморфизмом. Если существует изоморфизм между A и B , то говорят, что A и B изоморфны, и пишут $A \cong B$. Инъективный гомоморфизм называется **мономорфизмом**. Сюръективный гомоморфизм называется **эпиморфизмом**. □

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.2.12. Гомоморфизм, источником и целью которого является одна и та же алгебра, называется **эндоморфизмом**. Мы обозначим $\text{End}(\Omega; A)$ множество эндоморфизмов Ω -алгебры A . Эндоморфизм, который является изоморфизмом, называется **автоморфизмом**. □

ТЕОРЕМА 2.2.13. $\text{End}(\Omega; A) = \text{Hom}(\Omega; A \rightarrow A)$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Теорема является следствием определений [2.2.9](#), [2.2.12](#). □

ТЕОРЕМА 2.2.14. Если область операторов пуста, то эндоморфизм множества A - это отображение

$$t : A \rightarrow A$$

Следовательно, $\text{End}(\emptyset; A) = A^A$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Теорема является следствием теорем [2.2.10](#), [2.2.13](#). □

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.2.15. Если существует мономорфизм Ω -алгебры A в Ω -алгебру B , то говорят, что A **может быть вложена в** B . □

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.2.16. Если существует эпиморфизм из A в B , то B называется **гомоморфным образом** алгебры A . □

^{2.10} Я следую определению на странице [\[14\]-63](#).

^{2.11} Я следую определению на странице [\[14\]-63](#).

2.3. Декартово произведение универсальных алгебр

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.3.1. Пусть \mathcal{A} - категория. Пусть $\{B_i, i \in I\}$ - множество объектов из \mathcal{A} . Объект

$$P = \prod_{i \in I} B_i$$

и множество морфизмов

$$\{f_i : P \rightarrow B_i, i \in I\}$$

называется **произведением множества объектов** $\{B_i, i \in I\}$ **в категории** \mathcal{A} ^{2.12}, если для любого объекта R и множества морфизмов

$$\{g_i : R \rightarrow B_i, i \in I\}$$

существует единственный морфизм

$$h : R \rightarrow P$$

такой, что диаграмма

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{f_i} & B_i \\ \uparrow h & \nearrow g_i & \\ R & & \end{array} \quad f_i \circ h = g_i$$

коммутативна для всех $i \in I$.

Если $|I| = n$, то для произведения множества объектов $\{B_i, i \in I\}$ в \mathcal{A} мы так же будем пользоваться записью

$$P = \prod_{i=1}^n B_i = B_1 \times \dots \times B_n$$

□

ПРИМЕР 2.3.2. Пусть \mathcal{S} - категория множеств.^{2.13} Согласно определению 2.3.1, декартово произведение

$$A = \prod_{i \in I} A_i$$

семейства множеств $(A_i, i \in I)$ и семейство проекций на i -й множитель

$$p_i : A \rightarrow A_i$$

являются произведением в категории \mathcal{S} . □

ТЕОРЕМА 2.3.3. Произведение существует в категории \mathcal{A} Ω -алгебр. Пусть Ω -алгебра A и семейство морфизмов

$$p_i : A \rightarrow A_i \quad i \in I$$

является произведением в категории \mathcal{A} . Тогда

2.3.3.1: Множество A является декартовым произведением семейства множеств $(A_i, i \in I)$

^{2.12} Определение дано согласно [2], страница 45.

^{2.13} Смотри также пример в [2], страница 45.

2.3.3.2: Гомоморфизм Ω -алгебры

$$p_i : A \rightarrow A_i$$

является проекцией на i -й множитель.

2.3.3.3: Любое A -число a может быть однозначно представлено в виде кортежа $(p_i(a), i \in I)$ A_i -чисел.

2.3.3.4: Пусть $\omega \in \Omega$ - n -арная операция. Тогда операция ω определена покомпонентно

$$(2.3.1) \quad a_1 \dots a_n \omega = (a_{1i} \dots a_{ni} \omega, i \in I)$$

$$\text{где } a_1 = (a_{1i}, i \in I), \dots, a_n = (a_{ni}, i \in I) .$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть

$$A = \prod_{i \in I} A_i$$

декартово произведение семейства множеств $(A_i, i \in I)$ и, для каждого $i \in I$, отображение

$$p_i : A \rightarrow A_i$$

является проекцией на i -й множитель. Рассмотрим диаграмму морфизмов в категории множеств \mathcal{S}

$$(2.3.2) \quad \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{p_i} & A_i \\ \omega \uparrow & \nearrow g_i & \\ A^n & & \end{array} \quad p_i \circ \omega = g_i$$

где отображение g_i определено равенством

$$g_i(a_1, \dots, a_n) = p_i(a_1) \dots p_i(a_n) \omega$$

Согласно определению 2.3.1, отображение ω определено однозначно из множества диаграмм (2.3.2)

$$(2.3.3) \quad a_1 \dots a_n \omega = (p_i(a_1) \dots p_i(a_n) \omega, i \in I)$$

Равенство (2.3.1) является следствием равенства (2.3.3). \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.3.4. Если Ω -алгебра A и семейство морфизмов

$$p_i : A \rightarrow A_i \quad i \in I$$

является произведением в категории \mathcal{A} , то Ω -алгебра A называется **прямым или декартовым произведением Ω -алгебр** $(A_i, i \in I)$. \square

ТЕОРЕМА 2.3.5. Пусть множество A является декартовым произведением множеств $(A_i, i \in I)$ и множество B является декартовым произведением множеств $(B_i, i \in I)$. Для каждого $i \in I$, пусть

$$f_i : A_i \rightarrow B_i$$

является отображением множества A_i в множество B_i . Для каждого $i \in I$, рассмотрим коммутативную диаграмму

$$(2.3.4) \quad \begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{p'_i} & B_i \\ f \uparrow & & \uparrow f_i \\ A & \xrightarrow{p_i} & A_i \end{array}$$

где отображения p_i, p'_i являются проекцией на i -й множитель. Множество коммутативных диаграмм (2.3.4) однозначно определяет отображение

$$f : A \rightarrow B \\ f(a_i, i \in I) = (f_i(a_i), i \in I)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Для каждого $i \in I$, рассмотрим коммутативную диаграмму

$$(2.3.5) \quad \begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{p'_i} & B_i \\ f \uparrow & (1) & \uparrow f_i \\ A & \xrightarrow{p_i} & A_i \\ & g_i \nearrow & \\ & (2) & \end{array}$$

Пусть $a \in A$. Согласно утверждению 2.3.3.3, A -число a может быть представлено в виде кортежа A_i -чисел

$$(2.3.6) \quad a = (a_i, i \in I) \quad a_i = p_i(a) \in A_i$$

Пусть

$$(2.3.7) \quad b = f(a) \in B$$

Согласно утверждению 2.3.3.3, B -число b может быть представлено в виде кортежа B_i -чисел

$$(2.3.8) \quad b = (b_i, i \in I) \quad b_i = p'_i(b) \in B_i$$

Из коммутативности диаграммы (1) и из равенств (2.3.7), (2.3.8) следует, что

$$(2.3.9) \quad b_i = g_i(b)$$

Из коммутативности диаграммы (2) и из равенства (2.3.6) следует, что

$$b_i = f_i(a_i)$$

□

ТЕОРЕМА 2.3.6. Пусть Ω -алгебра A является декартовым произведением Ω -алгебр $(A_i, i \in I)$ и Ω -алгебра B является декартовым произведением Ω -алгебр $(B_i, i \in I)$. Для каждого $i \in I$, пусть отображение

$$f_i : A_i \rightarrow B_i$$

является гомоморфизмом Ω -алгебры. Тогда отображение

$$f : A \rightarrow B$$

определённое равенством

$$(2.3.10) \quad f(a_i, i \in I) = (f_i(a_i), i \in I)$$

является гомоморфизмом Ω -алгебры.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\omega \in \Omega$ - n -арная операция. Пусть $a_1 = (a_{1i}, i \in I)$, ..., $a_n = (a_{ni}, i \in I)$ и $b_1 = (b_{1i}, i \in I)$, ..., $b_n = (b_{ni}, i \in I)$. Из равенств (2.3.1), (2.3.10) следует, что

$$\begin{aligned} f(a_1 \dots a_n \omega) &= f(a_{1i} \dots a_{ni} \omega, i \in I) \\ &= (f_i(a_{1i} \dots a_{ni} \omega), i \in I) \\ &= ((f_i(a_{1i})) \dots (f_i(a_{ni}))), i \in I \\ &= (b_{1i} \dots b_{ni} \omega, i \in I) \\ f(a_1) \dots f(a_n) \omega &= b_{1i} \dots b_{ni} \omega = (b_{1i} \dots b_{ni} \omega, i \in I) \end{aligned}$$

□

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.3.7. Эквивалентность на Ω -алгебре A , которая является подалгеброй Ω -алгебры A^2 , называется **конгруэнцией** ^{2.14} на A . □

ТЕОРЕМА 2.3.8 (первая теорема об изоморфизмах). Пусть

$$f : A \rightarrow B$$

гомоморфизм Ω -алгебр с ядром s . Тогда отображение f имеет разложение

$$\begin{array}{ccc} A/\ker f & \xrightarrow{q} & f(A) \\ p \uparrow & & \downarrow r \\ A & \xrightarrow{f} & B \end{array} \quad f = p \circ q \circ r$$

2.3.8.1: Ядро гомоморфизма $\ker f = f \circ f^{-1}$ является конгруэнцией на Ω -алгебре A .

2.3.8.2: Множество $A/\ker f$ является Ω -алгеброй.

2.3.8.3: Отображение

$$p : a \in A \rightarrow a^{\ker f} \in A/\ker f$$

является эпиморфизмом и называется **естественным гомоморфизмом**.

2.3.8.4: Отображение

$$q : p(a) \in A/\ker f \rightarrow f(a) \in f(A)$$

является изоморфизмом.

2.3.8.5: Отображение

$$r : f(a) \in f(A) \rightarrow f(a) \in B$$

является мономорфизмом.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Утверждение 2.3.8.1 является следствием предложения П.3.4 ([14], страница 72). Утверждения 2.3.8.2, 2.3.8.3 являются следствием теоремы П.3.5 ([14], страница 72) и последующего определения. Утверждения 2.3.8.4, 2.3.8.5 являются следствием теоремы П.3.7 ([14], страница 74). □

^{2.14} Я следую определению на странице [14]-71.

2.4. Полугруппа

Обычно операция $\omega \in \Omega(2)$ называется произведением

$$ab\omega = ab$$

либо суммой

$$ab\omega = a + b$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4.1. Пусть A является Ω -алгеброй и $\omega \in \Omega(2)$. A -число e называется **нейтральным элементом операции** ω , если для любого A -числа a верны равенства

$$(2.4.1) \quad e a \omega = a$$

$$(2.4.2) \quad a e \omega = a$$

□

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4.2. Пусть A является Ω -алгеброй. Операция $\omega \in \Omega(2)$ называется **ассоциативной**, если верно равенство

$$a(bc\omega)\omega = (ab\omega)c\omega$$

□

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4.3. Пусть A является Ω -алгеброй. Операция $\omega \in \Omega(2)$ называется **коммутативной**, если верно равенство

$$ab\omega = ba\omega$$

□

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4.4. Пусть $\Omega = \{\omega\}$. Если операция $\omega \in \Omega(2)$ ассоциативна, то Ω -алгебра называется **полугруппой**. Если операция в полугруппе коммутативна, то полугруппа называется **абелевой полугруппой**. □

Представление универсальной алгебры

3.1. Представление универсальной алгебры

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.1.1. Пусть множество A_2 является Ω_2 -алгеброй. Пусть на множестве преобразований $\text{End}(\Omega_2, A_2)$ определена структура Ω_1 -алгебры. Гомоморфизм

$$f : A_1 \rightarrow \text{End}(\Omega_2; A_2)$$

Ω_1 -алгебры A_1 в Ω_1 -алгебре $\text{End}(\Omega_2, A_2)$ называется **представлением Ω_1 -алгебры A_1 или A_1 -представлением** в Ω_2 -алгебре A_2 . \square

Диаграмма

$$\begin{array}{ccc} A_2 & \xrightarrow{f(a)} & A_2 \\ & \uparrow f & \\ & A_1 & \end{array}$$

означает, что мы рассматриваем представление Ω_1 -алгебры A_1 . Отображение $f(a)$ является образом $a \in A_1$. Мы будем также пользоваться записью

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

для обозначения представления Ω_1 -алгебры A_1 в Ω_2 -алгебре A_2 .

Существует несколько способов описать представление. Мы можем указать отображение f , имея в виду что область определения - это Ω_1 -алгебра A_1 и область значений - это Ω_1 -алгебра $\text{End}(\Omega_2, A_2)$. Либо мы можем указать Ω_1 -алгебру A_1 и Ω_2 -алгебру A_2 , имея в виду что нам известна структура отображения f .^{3.1}

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.1.2. Мы будем называть представление

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

Ω_1 -алгебры A_1 **эффективным**,^{3.2} если отображение

$$f : A_1 \rightarrow \text{End}(\Omega_2; A_2)$$

является изоморфизмом Ω_1 -алгебры A_1 в $\text{End}(\Omega_2, A_2)$. \square

ТЕОРЕМА 3.1.3. Представление

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

^{3.1} Например, мы рассматриваем векторное пространство V над полем D (раздел 9.3).

^{3.2} Аналогичное определение эффективного представления группы смотри в [18], страница 16, [19], страница 111, [15], страница 51 (Кон называет такое представление точным). Смотри также теорему 5.4.2.

эффективно тогда и только тогда, когда из утверждения $a_1 \neq b_1$, $a_1, b_1 \in A_1$, следует существование $a_2 \in A_2$ такого, что^{3.3}

$$f(a_1)(a_2) \neq f(b_1)(a_2)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть представление f эффективно и $a_1 \neq b_1$. Если для любого $a_2 \in A_2$ верно равенство

$$f(a_1)(a_2) = f(b_1)(a_2)$$

то

$$f(a_1) = f(b_1)$$

Это противоречит утверждению, что представление f эффективно.

Пусть из утверждения $a_1 \neq b_1$, $a_1, b_1 \in A_1$, следует существование $a_2 \in A_2$ такого, что

$$f(a_1)(a_2) \neq f(b_1)(a_2)$$

Следовательно, из утверждения $a_1 \neq b_1$, $a_1, b_1 \in A_1$, следует, что

$$f(a) \neq f(b)$$

Согласно определению 3.1.2, представление f эффективно. □

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.1.4. Мы будем называть представление

$$f : A_1 \dashrightarrow A_2$$

Ω_1 -алгебры A_1 свободным,^{3.4} если из утверждения

$$f(a_1)(a_2) = f(b_1)(a_2)$$

для любого $a_2 \in A_2$ следует, что $a_1 = b_1$. □

ТЕОРЕМА 3.1.5. Мы будем называть представление

$$f : A_1 \dashrightarrow A_2$$

Ω_1 -алгебры A_1 свободным, если из утверждения $f(a_1) = f(b_1)$ следует, что $a_1 = b_1$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Утверждение $f(a_1) = f(b_1)$ верно тогда и только тогда, когда

$$f(a_1)(a_2) = f(b_1)(a_2)$$

для любого $a_2 \in A_2$. □

ТЕОРЕМА 3.1.6. Свободное представление эффективно.

^{3.3} Для группы теорема 3.1.3 имеет следующий вид. Представление

$$f : A_1 \dashrightarrow A_2$$

эффективно тогда и только тогда, когда для любого A_1 -числа $a_1 \neq e$ существует $a_2 \in A_2$ такое, что

$$f(a_1)(a_2) \neq a_2$$

^{3.4} Аналогичное определение свободного представления группы смотри в [18], страница 16. Смотри также теорему 5.5.2.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть отображение

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

является свободным представлением. Пусть $a, b \in A_1$. Согласно определению 3.1.4, из утверждения

$$f(a_1)(a_2) = f(b_1)(a_2)$$

для любого $a_2 \in A_2$ следует, что $a_1 = b_1$. Следовательно, если $a_1 \neq b_1$, то существует $a_2 \in A_2$ такое, что

$$f(a_1)(a_2) \neq f(b_1)(a_2)$$

Согласно теореме 3.1.3, представление f эффективно. \square

ЗАМЕЧАНИЕ 3.1.7. Представление группы вращений в аффинном пространстве эффективно, но не свободно, так как начало координат является неподвижной точкой любого преобразования. \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.1.8. Мы будем называть представление

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

Ω_1 -алгебры **транзитивным**,^{3.5} если для любых $a, b \in A_2$ существует такое g , что

$$a = f(g)(b)$$

Мы будем называть представление Ω_1 -алгебры **однотранзитивным**, если оно транзитивно и свободно. \square

ТЕОРЕМА 3.1.9. Представление однотранзитивно тогда и только тогда, когда для любых $a, b \in A_2$ существует одно и только одно $g \in A_1$ такое, что $a = f(g)(b)$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Следствие определений 3.1.4 и 3.1.8. \square

ТЕОРЕМА 3.1.10. Пусть

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

однотранзитивное представление Ω_1 -алгебры A_1 в Ω_2 -алгебре A_2 . Существует структура Ω_1 -алгебры на множестве A_2 .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $b \in A_2$, $\omega \in \Omega_1(n)$. Для любых A_2 -чисел b_1, \dots, b_n , существуют A_1 -числа a_1, \dots, a_n такие, что

$$b_1 = f(a_1)(b) \quad \dots \quad b_n = f(a_n)(b)$$

Мы определим операцию ω на множестве A_2 равенством

$$(3.1.1) \quad b_1 \dots b_n \omega = f(a_1 \dots a_n \omega)(b)$$

Мы также требуем, что выбор A_2 -числа b не зависит от операции ω . \square

^{3.5} Аналогичное определение транзитивного представления группы смотри в [19], страница 110, [15], страница 51.

ТЕОРЕМА 3.1.11. Пусть

$$f : A_1 \dashrightarrow A_2$$

эффективное представление Ω_1 -алгебры A_1 в Ω_2 -алгебре A_2 . Пусть $\omega \in \Omega_1(n) \cap \Omega_2(n)$. Тогда

$$(3.1.2) \quad f(a_1 \dots a_n \omega)(b) = f(a_1)(b) \dots f(a_n)(b) \omega$$

3.2. Морфизм представлений универсальной алгебры

ТЕОРЕМА 3.2.1. Пусть A_1 и B_1 - Ω_1 -алгебры. Представление Ω_1 -алгебры B_1

$$g : B_1 \dashrightarrow A_2$$

и гомоморфизм Ω_1 -алгебры

$$h : A_1 \rightarrow B_1$$

определяют представление f Ω_1 -алгебры A_1

$$(3.2.1) \quad \begin{array}{ccc} A_1 & \xrightarrow{f} & \text{End}(\Omega_2; A_2) \\ & \searrow h & \nearrow g \\ & B_1 & \end{array}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Отображение f является гомоморфизмом Ω_1 -алгебры A_1 в Ω_1 -алгебру $\text{End}(\Omega_2, A_2)$, так как отображение g является гомоморфизмом Ω_1 -алгебры B_1 в Ω_1 -алгебру $\text{End}(\Omega_2, A_2)$. \square

Мы будем также пользоваться диаграммой

$$\begin{array}{ccc} A_1 & \xrightarrow{f} & A_2 \\ & \searrow h & \nearrow g \\ & B_1 & \end{array}$$

вместо диаграммы (3.2.1).

Если мы изучаем представление Ω_1 -алгебры в Ω_2 -алгебрах A_2 и B_2 , то нас интересуют отображения $A_2 \rightarrow B_2$, сохраняющие структуру представления.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.2.2. Пусть

$$f : A_1 \dashrightarrow A_2$$

представление Ω_1 -алгебры A_1 в Ω_2 -алгебре A_2 и

$$g : B_1 \dashrightarrow B_2$$

представление Ω_1 -алгебры B_1 в Ω_2 -алгебре B_2 . Для $i = 1, 2$, пусть отображение

$$r_i : A_i \rightarrow B_i$$

является гомоморфизмом Ω_i -алгебры. Кортеж отображений $r = (r_1, r_2)$ та-ких, что

$$(3.2.2) \quad r_2 \circ f(a) = g(r_1(a)) \circ r_2$$

называется **морфизмом представлений из f в g** . Мы также будем говорить, что определён **морфизм представлений Ω_1 -алгебры в Ω_2 -алгебре**. \square

ЗАМЕЧАНИЕ 3.2.3. Мы можем рассматривать пару отображений r_1, r_2 как отображение

$$F : A_1 \cup A_2 \rightarrow B_1 \cup B_2$$

такое, что

$$F(A_1) = B_1 \quad F(A_2) = B_2$$

Поэтому в дальнейшем кортеж отображений $r = (r_1, r_2)$ мы будем также называть отображением и пользоваться записью

$$r : f \rightarrow g$$

Пусть $a = (a_1, a_2)$ - кортеж A -чисел. Мы будем пользоваться записью

$$r(a) = (r_1(a_1), r_2(a_2))$$

для образа кортежа A -чисел при морфизме представлений r . \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.2.4. Если представления f и g совпадают, то морфизм представлений $r = (r_1, r_2)$ называется **морфизмом представления** f . \square

ТЕОРЕМА 3.2.5. Пусть

$$f : A_1 \xrightarrow{*} A_2$$

представление Ω_1 -алгебры A_1 в Ω_2 -алгебре A_2 и

$$g : B_1 \xrightarrow{*} B_2$$

представление Ω_1 -алгебры B_1 в Ω_2 -алгебре B_2 . Отображение

$$(r_1 : A_1 \rightarrow B_1, r_2 : A_2 \rightarrow B_2)$$

является морфизмом представлений тогда и только тогда, когда

$$(3.2.3) \quad r_2(f(a)(m)) = g(r_1(a))(r_2(m))$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Для произвольного $m \in A_2$ равенство (3.2.2) имеет вид (3.2.3). \square

ЗАМЕЧАНИЕ 3.2.6. Рассмотрим морфизм представлений

$$(r_1 : A_1 \rightarrow B_1, r_2 : A_2 \rightarrow B_2)$$

Мы можем обозначать элементы множества B_1 , пользуясь буквой по образцу $b \in B_1$. Но если мы хотим показать, что b является образом элемента $a \in A_1$, мы будем пользоваться обозначением $r_1(a)$. Таким образом, равенство

$$r_1(a) = r_1(a)$$

означает, что $r_1(a)$ (в левой части равенства) является образом $a \in A_1$ (в правой части равенства). Пользуясь подобными соображениями, мы будем обозначать элемент множества B_2 в виде $r_2(m)$. Мы будем следовать этому соглашению, изучая соотношения между гомоморфизмами Ω_1 -алгебр и отображениями между множествами, где определены соответствующие представления. \square

ЗАМЕЧАНИЕ 3.2.7. Мы можем интерпретировать (3.2.3) двумя способами

- Пусть преобразование $f(a)$ отображает $m \in A_2$ в $f(a)(m)$. Тогда преобразование $g(r_1(a))$ отображает $r_2(m) \in B_2$ в $r_2(f(a)(m))$.

- Мы можем представить морфизм представлений из f в g , пользуясь диаграммой

$$(3.2.4) \quad \begin{array}{ccc} A_2 & \xrightarrow{r_2} & B_2 \\ \downarrow f(a) & & \downarrow g(r_1(a)) \\ A_2 & \xrightarrow{r_2} & B_2 \\ \uparrow f & & \uparrow g \\ A_1 & \xrightarrow{r_1} & B_1 \end{array} \quad (1)$$

Из (3.2.2) следует, что диаграмма (1) коммутативна.

Мы будем также пользоваться диаграммой

$$(3.2.5) \quad \begin{array}{ccc} A_2 & \xrightarrow{r_2} & B_2 \\ \uparrow f^* & & \uparrow g^* \\ A_1 & \xrightarrow{r_1} & B_1 \end{array}$$

вместо диаграммы (3.2.4). □

ТЕОРЕМА 3.2.8. Рассмотрим представление

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

Ω_1 -алгебры A_1 и представление

$$g : B_1 \longrightarrow B_2$$

Ω_1 -алгебры B_1 . Морфизм

$$(r_1 : A_1 \rightarrow B_1, r_2 : A_2 \rightarrow B_2)$$

представлений из f в g удовлетворяет соотношению

$$(3.2.6) \quad r_2 \circ (f(a_1) \dots f(a_n)\omega) = (g(r_1(a_1)) \dots g(r_1(a_n))\omega) \circ r_2$$

для произвольной операции $\omega \in \Omega_1(n)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Так как f - гомоморфизм, мы имеем

$$(3.2.7) \quad r_2 \circ (f(a_1) \dots f(a_n)\omega) = r_2 \circ f(a_1 \dots a_n\omega)$$

Из (3.2.2) и (3.2.7) следует

$$(3.2.8) \quad r_2 \circ (f(a_1) \dots f(a_n)\omega) = g(r_1(a_1 \dots a_n\omega)) \circ r_2$$

Так как r_1 - гомоморфизм, из (3.2.8) следует

$$(3.2.9) \quad r_2 \circ (f(a_1) \dots f(a_n)\omega) = g(r_1(a_1) \dots r_1(a_n)\omega) \circ r_2$$

Так как g - гомоморфизм, из (3.2.9) следует (3.2.6). □

ТЕОРЕМА 3.2.9. Пусть отображение

$$(r_1 : A_1 \rightarrow B_1, r_2 : A_2 \rightarrow B_2)$$

является морфизмом из представления

$$f : A_1 \multimap A_2$$

Ω_1 -алгебры A_1 в представление

$$g : B_1 \multimap B_2$$

Ω_1 -алгебры B_1 . Если представление f эффективно, то отображение

$$r_2^* : \text{End}(\Omega_2; A_2) \rightarrow \text{End}(\Omega_2; B_2)$$

определённое равенством

$$(3.2.10) \quad r_2^*(f(a)) = g(r_1(a))$$

является гомоморфизмом Ω_1 -алгебры.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Так как представление f эффективно, то для выбранного преобразования $f(a)$ выбор элемента a определён однозначно. Следовательно, преобразование $g(r_1(a))$ в равенстве (3.2.10) определено корректно.

Так как f - гомоморфизм, мы имеем

$$(3.2.11) \quad r_2^*(f(a_1) \dots f(a_n)\omega) = r_2^*(f(a_1 \dots a_n)\omega)$$

Из (3.2.10) и (3.2.11) следует

$$(3.2.12) \quad r_2^*(f(a_1) \dots f(a_n)\omega) = g(r_1(a_1 \dots a_n)\omega)$$

Так как h - гомоморфизм, из (3.2.12) следует

$$(3.2.13) \quad r_2^*(f(a_1) \dots f(a_n)\omega) = g(r_1(a_1) \dots r_1(a_n)\omega)$$

Так как g - гомоморфизм,

$$r_2^*(f(a_1) \dots f(a_n)\omega) = g(r_1(a_1) \dots g(r_1(a_n))\omega) = r_2^*(f(a_1)) \dots r_2^*(f(a_n))\omega$$

следует из (3.2.13). Следовательно, отображение r_2^* является гомоморфизмом Ω_1 -алгебры. \square

ТЕОРЕМА 3.2.10. Пусть

$$f : A_1 \multimap A_2$$

однотранзитивное представление Ω_1 -алгебры A_1 и

$$g : B_1 \multimap B_2$$

однотранзитивное представление Ω_1 -алгебры B_1 . Если отображение

$$r_1 : A_1 \rightarrow B_1$$

является гомоморфизмом Ω_1 -алгебры, то существует морфизм представлений из f в g

$$(r_1 : A_1 \rightarrow B_1, r_2 : A_2 \rightarrow B_2)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Выберем гомоморфизм r_1 . Выберем элемент $m \in A_2$ и элемент $n \in B_2$. Чтобы построить отображение r_2 , рассмотрим следующую диаграмму

$$\begin{array}{ccc}
 A_2 & \xrightarrow{r_2} & B_2 \\
 \downarrow f(a) & & \downarrow g(r_1(a)) \\
 A_2 & \xrightarrow{r_2} & B_2 \\
 \uparrow f & & \uparrow g \\
 A_1 & \xrightarrow{r_1} & B_1
 \end{array}
 \quad (1)$$

Из коммутативности диаграммы (1) следует

$$r_2(f(a)(m)) = g(r_1(a))(r_2(m))$$

Для произвольного $m' \in A_2$ однозначно определён $a \in A_1$ такой, что $m' = f(a)(m)$. Следовательно, мы построили отображение r_2 , которое удовлетворяет равенству (3.2.2). \square

ТЕОРЕМА 3.2.11. Если представление

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

Ω_1 -алгебры A_1 однотранзитивно и представление

$$g : B_1 \longrightarrow B_2$$

Ω_1 -алгебры B_1 однотранзитивно, то для заданного гомоморфизма Ω_1 -алгебры

$$r_1 : A_1 \rightarrow B_1$$

гомоморфизм Ω_2 -алгебры

$$r_2 : A_2 \rightarrow B_2$$

такой, что $r = (r_1, r_2)$ является морфизмом представлений из f в g , определён однозначно с точностью до выбора образа $n = r_2(m) \in B_2$ заданного элемента $m \in A_2$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из доказательства теоремы 3.2.10 следует, что выбор гомоморфизма r_1 и элементов $m \in A_2$, $n \in B_2$ однозначно определяет отображение r_2 . \square


ТЕОРЕМА 3.2.12. Если представление

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

Ω_1 -алгебры A_1 однотранзитивно, то для любого эндоморфизма $r_1 \in \text{End}(\Omega_1; A_1)$ существует морфизм представления f

$$(r_1 : A_1 \rightarrow A_1, r_2 : A_2 \rightarrow A_2)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Рассмотрим следующую диаграмму



Утверждение теоремы является следствием теоремы 3.2.10. □

3.3. Теорема о разложении морфизмов расслоений

ТЕОРЕМА 3.3.1. Пусть

$$f : A_1 \dashrightarrow A_2$$

представление Ω_1 -алгебры A_1 ,

$$g : B_1 \dashrightarrow B_2$$

представление Ω_1 -алгебры B_1 ,

$$h : C_1 \dashrightarrow C_2$$

представление Ω_1 -алгебры C_1 . Пусть определены морфизмы представлений Ω_1 -алгебры

$$(p_1 : A_1 \rightarrow B_1, p_2 : A_2 \rightarrow B_2)$$


$$(q_1 : B_1 \rightarrow C_1, q_2 : B_2 \rightarrow C_2)$$

Тогда определён морфизм представлений Ω_1 -алгебры

$$(r_1 : A_1 \rightarrow C_1, r_2 : A_2 \rightarrow C_2)$$

где $r_1 = q_1 \circ p_1$, $r_2 = q_2 \circ p_2$. Мы будем называть морфизм $r = (r_1, r_2)$ представлений из f в h **произведением морфизмов** $p = (p_1, p_2)$ и $q = (q_1, q_2)$ **представлений универсальной алгебры**.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Мы можем представить утверждение теоремы, пользуясь диаграммой



Отображение r_1 является гомоморфизмом Ω_1 -алгебры A_1 в Ω_1 -алгебру C . Нам надо показать, что отображение $r = (r_1, r_2)$ удовлетворяет (3.2.2):

$$\begin{aligned}
 r_2(f(a)(m)) &= (q_2 \circ p_2)(f(a)(m)) \\
 &= q_2(g(p_1(a))(p_2(m))) \\
 &= h((q_1 \circ p_1)(a)((q_2 \circ p_2)(m))) \\
 &= h(r_1(a))(r_2(m))
 \end{aligned}$$

□

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.3.2. Пусть на множестве A_2 определена эквивалентность S . Преобразование f называется **согласованным с эквивалентностью S** , если из условия $m_1 \equiv m_2 \pmod{S}$ следует $f(m_1) \equiv f(m_2) \pmod{S}$. □

ТЕОРЕМА 3.3.3. Пусть на множестве A_2 определена эквивалентность S . Пусть на множестве $\text{End}(\Omega_2, A_2)$ определена Ω_1 -алгебра. Если любое преобразование $f \in \text{End}(\Omega_2; A_2)$, согласованно с эквивалентностью S , то мы можем определить структуру Ω_1 -алгебры на множестве $\text{End}(\Omega_2; A_2/S)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $h = \text{nat } S$. Если $m_1 \equiv m_2 \pmod{S}$, то $h(m_1) = h(m_2)$. Поскольку $f \in \text{End}(\Omega_2; A_2)$ согласованно с эквивалентностью S , то $h(f(m_1)) = h(f(m_2))$. Это позволяет определить преобразование F согласно правилу

$$(3.3.1) \quad F([m]) = h(f(m))$$

Пусть ω - n -арная операция Ω_1 -алгебры. Пусть $f_1, \dots, f_n \in \text{End}(\Omega_2; A_2)$ и

$$F_1([m]) = h(f_1(m)) \quad \dots \quad F_n([m]) = h(f_n(m))$$

Согласно условию теоремы, преобразование

$$f = f_1 \dots f_n \omega \in \text{End}(\Omega_2; A_2)$$

согласованно с эквивалентностью S . Следовательно, из условия $m_1 \equiv m_2 \pmod{S}$ и определения 3.3.2 следует

$$(3.3.2) \quad \begin{aligned} f(m_1) &\equiv f(m_2) \pmod{S} \\ (f_1 \dots f_n \omega)(m_1) &\equiv (f_1 \dots f_n \omega)(m_2) \pmod{S} \end{aligned}$$

Следовательно, мы можем определить операцию ω на множестве $\text{End}(\Omega_2; A_2/S)$ по правилу

$$(3.3.3) \quad (F_1 \dots F_n \omega)([m]) = h((f_1 \dots f_n \omega)(m))$$

Из определения (3.3.1) и равенства (3.3.2) следует, что мы корректно определили операцию ω на множестве $\text{End}(\Omega_2; A_2/S)$. \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.3.4. Пусть

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

представление Ω_1 -алгебры A_1 ,

$$g : B_1 \longrightarrow B_2$$

представление Ω_1 -алгебры B_1 . Пусть

$$(r_1 : A_1 \rightarrow B_1, r_2 : A_2 \rightarrow B_2)$$

морфизм представлений из f в g такой, что r_1 - изоморфизм Ω_1 -алгебры и r_2 - изоморфизм Ω_2 -алгебры. Тогда отображение $r = (r_1, r_2)$ называется **изоморфизмом представлений**. \square

ТЕОРЕМА 3.3.5. Пусть

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$


представление Ω_1 -алгебры A_1 ,

$$g : B_1 \longrightarrow B_2$$

представление Ω_1 -алгебры B_1 . Пусть

$$(t_1 : A_1 \rightarrow B_1, t_2 : A_2 \rightarrow B_2)$$

морфизм представлений из f в g . Тогда для отображений t_1, t_2 существуют разложения, которые можно описать диаграммой



3.3.5.1: Ядро гомоморфизма $\ker t_i = t_i \circ t_i^{-1}$ является конгруэнцией на Ω_i -алгебре A_i , $i = 1, 2$.

3.3.5.2: Существует разложение гомоморфизма t_i , $i = 1, 2$,

$$(3.3.4) \quad t_i = r_i \circ q_i \circ p_i$$

3.3.5.3: Отображения

$$p_1(a) = a^{\ker t_1}$$

$$p_2(a) = a^{\ker t_2}$$

являются естественными гомоморфизмами.

3.3.5.4: Отображения

$$(3.3.5) \quad q_1(p_1(a)) = t_1(a)$$

$$(3.3.6) \quad q_2(p_2(a)) = t_2(a)$$

являются изоморфизмами.

3.3.5.5: Отображения

$$r_1 : t_1(a) \in f(A_1) \rightarrow t_1(a) \in B_1$$

$$r_2 : t_2(a) \in f(A_2) \rightarrow t_2(a) \in B_2$$

являются мономорфизмами.

3.3.5.6: F - представление Ω_1 -алгебры A_1/s в A_2/s_2

3.3.5.7: G - представление Ω_1 -алгебры t_1A_1 в t_2A_2

3.3.5.8: Отображение $p = (p_1, p_2)$ является морфизмом представлений f и F

3.3.5.9: Отображение $q = (q_1, q_2)$ является изоморфизмом представлений F и G

3.3.5.10: Отображение $r = (r_1, r_2)$ является морфизмом представлений G и g

3.3.5.11: *Существует разложение морфизма представлений*

$$(3.3.7) \quad (t_1, t_2) = (r_1, r_2) \circ (q_1, q_2) \circ (p_1, p_2)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Утверждения 3.3.5.1, 3.3.5.2, 3.3.5.3, 3.3.5.4, 3.3.5.5 являются следствием теоремы 2.3.8. Следовательно, диаграммы (1) и (2) коммутативны.

Мы начнём с диаграммы (4).

Пусть $m_1 \equiv m_2 \pmod{\ker t_2}$. Следовательно,

$$(3.3.8) \quad t_2(m_1) = t_2(m_2)$$

Если $a_1 \equiv a_2 \pmod{\ker t_1}$, то

$$(3.3.9) \quad t_1(a_1) = t_1(a_2)$$

Следовательно, $p_1(a_1) = p_1(a_2)$. Так как отображение (t_1, t_2) - морфизм представлений, то

$$(3.3.10) \quad t_2(f(a_1)(m_1)) = g(t_1(a_1))(t_2(m_1))$$

$$(3.3.11) \quad t_2(f(a_2)(m_2)) = g(t_1(a_2))(t_2(m_2))$$

Из (3.3.8), (3.3.9), (3.3.10), (3.3.11) следует

$$(3.3.12) \quad t_2(f(a_1)(m_1)) = t_2(f(a_2)(m_2))$$

Из (3.3.12) следует

$$(3.3.13) \quad f(a_1)(m_1) \equiv f(a_2)(m_2) \pmod{\ker t_2}$$

и, следовательно,

$$(3.3.14) \quad p_2(f(a_1)(m_1)) = p_2(f(a_2)(m_2))$$

Из (3.3.14) следует, что отображение

$$(3.3.15) \quad F(p_1(a))(p_2(m)) = p_2(f(a)(m))$$

определено корректно и является преобразованием множества $A_2/\ker t_2$.

Из равенства (3.3.13) (в случае $a_1 = a_2$) следует, что, для любого a , преобразование согласованно с эквивалентностью $\ker t_2$. Из теоремы 3.3.3 следует, что на множестве $\text{End}(\Omega_2; A_2/\ker t_2)$ определена структура Ω_1 -алгебры. Рассмотрим n -арную операцию ω и n преобразований

$$F(p_1(a_i))(p_2(m)) = p_2(f(a_i)(m)) \quad i = 1, \dots, n$$

пространства $A_2/\ker t_2$. Мы положим

$$(F(p_1(a_1)) \dots F(p_1(a_n))\omega)(p_2(m)) = p_2((f(a_1) \dots f(a_n)\omega)(m))$$

Следовательно, отображение F является представлением Ω_1 -алгебры $A_1/\ker t_1$.

Согласно теореме 3.2.5, утверждение 3.3.5.8 является следствием (3.3.15).

Рассмотрим диаграмму (5).

ЛЕММА 3.3.6. *Отображение $q = (q_1, q_2)$ является морфизмом представлений F и G .*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Так как q_2 - биекция, то мы можем отождествить элементы множества $A_2/\ker t_2$ и множества $t_2(A_2)$, причём это отождествление имеет вид

$$(3.3.16) \quad q_2(p_2(m)) = t_2(m)$$

Мы можем записать преобразование $F(p_1(a))$ множества $A_2/\ker t_2$ в виде

$$(3.3.17) \quad F(p_1(a)) : p_2(m) \rightarrow F(p_1(a))(p_2(m))$$

Так как T - биекция, то мы можем определить преобразование

$$(3.3.18) \quad q_2(p_2(m)) \rightarrow q_2(F(p_1(a))(p_2(m)))$$

множества RA_2 . Преобразование (3.3.18) зависит от $p_1(a) \in A_1/\ker t_1$. Так как q_1 - биекция, то мы можем отождествить элементы множества $A_1/\ker t_1$ и множества $t_1(A_1)$, причём это отождествление имеет вид

$$(3.3.19) \quad q_1(p_1(a)) = t_1(a)$$

Следовательно, мы определили отображение

$$G : t_1(A_1) \rightarrow \text{End}(\Omega_2; t_2(A_2))$$

согласно равенству

$$(3.3.20) \quad G(q_1(p_1(a)))(q_2(p_2(m))) = q_2(F(p_1(a))(p_2(m)))$$

Рассмотрим n -арную операцию ω и n преобразований

$$G(t_1(a_i))(t_2(m)) = q_2(F(p_1(a_i))(p_2(m))) \quad i = 1, \dots, n$$

множества $t_2(A_2)$. Мы положим

$$(3.3.21) \quad (G(t_1(a_1)) \dots G(t_1(a_n))\omega)(t_2(m)) = q_2((F(p_1(a_1)) \dots F(p_1(a_n))\omega)(p_2(m)))$$

Согласно (3.3.20) операция ω корректно определена на множестве $\text{End}(\Omega_2; t_2(A_2))$. Следовательно, отображение G является представлением Ω_1 -алгебры.

Согласно теореме 3.2.5, лемма является следствием (3.3.20). \odot

ЛЕММА 3.3.7. *Отображение (q_1^{-1}, q_2^{-1}) является морфизмом представлений G и F .*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Так как q_2 - биекция, то из равенства (3.3.16) следует

$$(3.3.22) \quad p_2(m) = q_2^{-1}(t_2(m))$$

Мы можем записать преобразование $G(t_1(a))$ множества $t_2(A_2)$ в виде

$$(3.3.23) \quad G(t_1(a)) : t_2(m) \rightarrow G(t_1(a))(t_2(m))$$

Так как q_2 - биекция, то мы можем определить преобразование

$$(3.3.24) \quad q_2^{-1}(t_2(m)) \rightarrow q_2^{-1}(G(t_1(a))(t_2(m)))$$

множества $A_2/\ker t_2$. Преобразование (3.3.24) зависит от $t_1(a) \in t_1(A_1)$. Так как q_1 - биекция, то из равенства (3.3.19) следует

$$(3.3.25) \quad p_1(a) = q_1^{-1}(t_1(a))$$

Так как по построению диаграмма (5) коммутативна, то преобразование (3.3.24) совпадает с преобразованием (3.3.17). Равенство (3.3.21) можно записать в виде

$$(3.3.26) \quad \begin{aligned} & q_2^{-1}((G(t_1(a_1)) \dots G(t_1(a_n))\omega)(t_2(m))) \\ & = (F(p_1(a_1)) \dots F(p_1(a_n))\omega)(p_2(m)) \end{aligned}$$

Согласно теореме 3.2.5, лемма является следствием (3.3.20), (3.3.22), (3.3.25).

⊙

Утверждение 3.3.5.9 является следствием определения 3.3.4 и лемм 3.3.6 и 3.3.7.

Диаграмма (6) является самым простым случаем в нашем доказательстве. Поскольку отображение r_2 является вложением и диаграмма (2) коммутативна, мы можем отождествить $n \in B_2$ и $t_2(m)$, если $n \in \text{Im} t_2$. Аналогично, мы можем отождествить соответствующие преобразования.

$$(3.3.27) \quad g'(r_1(t_1(a)))(r_2(t_2(m))) = r_2(G(t_1(a))(t_2(m)))$$

$$(g'(t_1(a_1)) \dots g'(t_1(a_n))\omega)(t_2(m)) = r_2((G(t_1(a_1)) \dots G(t_1(a_n))\omega)(t_2(m)))$$

Следовательно, $r = (r_1, r_2)$ является морфизмом представлений G и g (утверждение 3.3.5.10).

Для доказательства утверждения 3.3.5.11 осталось показать, что определённое в процессе доказательства представление g' совпадает с представлением g , а операции над преобразованиями совпадают с соответствующими операциями на $\text{End}(\Omega_2, B_2)$.

$$\begin{aligned} g'(r_1(t_1(a)))(r_2(t_2(m))) &= r_2(G(t_1(a))(t_2(m))) && \text{by (3.3.27)} \\ &= r_2(G(q_1(p_1(a)))(q_2(p_2(m)))) && \text{by (3.3.5), (3.3.6),} \\ &= r_2 \circ q_2(F(p_1(a))(p_2(m))) && \text{by (3.3.20)} \\ &= r_2 \circ q_2 \circ p_2(f(a)(m)) && \text{by (3.3.15)} \\ &= t_2(f(a)(m)) && \text{by (3.3.4), } i = 2 \\ &= g(t_1(a))(t_2(m)) && \text{by (3.2.2)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (G(t_1(a_1)) \dots G(t_1(a_n))\omega)(t_2(m)) &= q_2(F(p_1(a_1)) \dots F(p_1(a_n))\omega)(p_2(m)) \\ &= q_2(F(p_1(a_1)) \dots p_1(a_n)\omega)(p_2(m)) \\ &= q_2(F(p_1(a_1 \dots a_n\omega)))(p_2(m)) \\ &= q_2(p_2(f(a_1 \dots a_n\omega)(m))) \end{aligned}$$

□

3.4. Приведенный морфизм представлений

Из теоремы 3.3.5 следует, что мы можем свести задачу изучения морфизма представлений Ω_1 -алгебры к случаю, описываемому диаграммой

$$(3.4.1) \quad \begin{array}{ccc} A_2 & \xrightarrow{p_2} & A_2/\ker t_2 \\ \uparrow f & & \uparrow F \\ A_1 & \xrightarrow{p_1} & A_1/\ker t_1 \end{array}$$

ТЕОРЕМА 3.4.1. Диаграмма (3.4.1) может быть дополнена представлением F_1 Ω_1 -алгебры A_1 в Ω_2 -алгебре $A_2/\ker t_2$ так, что диаграмма

$$(3.4.2) \quad \begin{array}{ccc} A_2 & \xrightarrow{p_2} & A_2/\ker t_2 \\ \uparrow f & \nearrow F_1 & \uparrow F \\ A_1 & \xrightarrow{p_1} & A_1/\ker t_1 \end{array}$$

коммутативна. При этом множество преобразований представления F и множество преобразований представления F_1 совпадают.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Для доказательства теоремы достаточно положить

$$F_1(a) = F(p_1(a))$$

Так как отображение p_1 - сюръекция, то $\text{Im} F_1 = \text{Im} F$. Так как p_1 и F - гомоморфизмы Ω_1 -алгебры, то F_1 - также гомоморфизм Ω_1 -алгебры. \square

Теорема 3.4.1 завершает цикл теорем, посвящённых структуре морфизма представлений Ω_1 -алгебры. Из этих теорем следует, что мы можем упростить задачу изучения морфизма представлений Ω_1 -алгебры и ограничиться морфизмом представлений вида

$$(\text{id} : A_1 \rightarrow A_1, r_2 : A_2 \rightarrow B_2)$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.4.2. Пусть

$$f : A_1 \twoheadrightarrow A_2$$

представление Ω_1 -алгебры A_1 в Ω_2 -алгебре A_2 и

$$g : A_1 \twoheadrightarrow B_2$$

представление Ω_1 -алгебры A_1 в Ω_2 -алгебре B_2 . Пусть

$$(\text{id} : A_1 \rightarrow A_1, r_2 : A_2 \rightarrow B_2)$$

морфизм представлений. В этом случае мы можем отождествить морфизм (id, r_2) представлений Ω_1 -алгебры и соответствующий гомоморфизм r_2 Ω_2 -алгебры и будем называть гомоморфизм r_2 **приведённым морфизмом представлений**. Мы будем пользоваться диаграммой

$$(3.4.3) \quad \begin{array}{ccc} & A_2 & \xrightarrow{r_2} & B_2 \\ & \downarrow f(a) & & \downarrow g(a) \\ & A_2 & \xrightarrow{r_2} & B_2 \\ & \uparrow f & \nearrow g & \\ A_1 & & & \end{array}$$

для представления приведенного морфизма r_2 представлений Ω_1 -алгебры. Из диаграммы следует

$$(3.4.4) \quad r_2 \circ f(a) = g(a) \circ r_2$$

Мы будем также пользоваться диаграммой

$$\begin{array}{ccc} A_2 & \xrightarrow{r_2} & B_2 \\ & \swarrow f^* & \nearrow g^* \\ & A_1 & \end{array}$$

вместо диаграммы (3.4.3). □

ТЕОРЕМА 3.4.3. Пусть

$$f : A_1 \xrightarrow{*} A_2$$

представление Ω_1 -алгебры A_1 в Ω_2 -алгебре A_2 и

$$g : A_1 \xrightarrow{*} B_2$$

представление Ω_1 -алгебры A_1 в Ω_2 -алгебре B_2 . отображение

$$r_2 : A_2 \rightarrow B_2$$

является приведенным морфизмом представлений тогда и только тогда, когда

$$(3.4.5) \quad r_2(f(a)(m)) = g(a)(r_2(m))$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Равенство (3.4.5) следует из равенства (3.4.4). □

ТЕОРЕМА 3.4.4. Пусть отображение

$$r_2 : A_2 \rightarrow B_2$$

является приведенным морфизмом из представления

$$f : A_1 \xrightarrow{*} A_2$$

Ω_1 -алгебры A_1 в представление

$$g : A_1 \xrightarrow{*} B_2$$

Ω_1 -алгебры A_1 . Если представление f эффективно, то отображение

$$r_2^* : \text{End}(\Omega_2; A_2) \rightarrow \text{End}(\Omega_2; B_2)$$

определённое равенством

$$(3.4.6) \quad r_2^*(f(a)) = g(a)$$

является гомоморфизмом Ω_1 -алгебры.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Теорема является следствием теоремы 3.2.9, если мы положим $h = id$. □

ТЕОРЕМА 3.4.5. Пусть представления


$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

$$g : A_1 \longrightarrow B_2$$

Ω_1 -алгебры A_1 однотранзитивны. Существует приведенный морфизм представлений из f в g

$$r_2 : A_2 \rightarrow B_2$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Выберем элемент $m \in A_2$ и элемент $n \in B_2$. Чтобы построить отображение r_2 , рассмотрим следующую диаграмму



Из коммутативности диаграммы (1) следует

$$r_2(f(a)(m)) = g(a)(r_2(m))$$

Для произвольного $m' \in A_2$ однозначно определён $a \in A_1$ такой, что $m' = f(a)(m)$. Следовательно, мы построили отображение r_2 , которое удовлетворяет равенству (3.4.4). \square

ТЕОРЕМА 3.4.6. Пусть представления

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

$$g : A_1 \longrightarrow B_2$$

Ω_1 -алгебры A_1 однотранзитивны. Приведенный морфизм представлений из f в g

$$r_2 : A_2 \rightarrow B_2$$

определён однозначно с точностью до выбора образа $n = r_2(m) \in B_2$ заданного элемента $m \in A_2$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из доказательства теоремы 3.4.5 следует, что выбор элементов $m \in A_2$, $n \in B_2$ однозначно определяет отображение r_2 . \square

ТЕОРЕМА 3.4.7. Пусть

$$f : A \longrightarrow B$$

представление Ω_1 -алгебры A в Ω_2 -алгебре B . Пусть N - такая конгруэнция^{3.6} на Ω_2 -алгебре B , что любое преобразование $h \in \text{End}(\Omega_2, B)$ согласованно с конгруэнцией N . Существует представление

$$f_1 : A \longrightarrow B/N$$

^{3.6}Смотри определение конгруэнции на с. [14]-71.

Ω_1 -алгебры A в Ω_2 -алгебре B/N и отображение

$$\text{nat } N : B \rightarrow B/N$$

является приведенным морфизмом представления f в представление f_1

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{j} & B/N \\ & \swarrow f_* & \nearrow f_1^* \\ & A & \end{array} \quad j = \text{nat } N$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Любой элемент множества B/N мы можем представить в виде $j(a)$, $a \in B$.

Согласно теореме [14]-П.3.5, мы можем определить единственную структуру Ω_2 -алгебры на множестве B/N . Если $\omega \in \Omega_2(p)$, то мы определим операцию ω на множестве B/N согласно равенству (3) на странице [14]-73

$$(3.4.7) \quad j(b_1) \dots j(b_p) \omega = j(b_1 \dots b_p \omega)$$

Также как в доказательстве теоремы 3.3.5, мы можем определить представление

$$f_1 : A \dashrightarrow B/N$$

с помощью равенства

$$(3.4.8) \quad f_1(a) \circ j(b) = j(f(a) \circ b)$$

Равенство (3.4.8) можно представить с помощью диаграммы

$$(3.4.9) \quad \begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{j} & B/N \\ f(a) \uparrow & & \uparrow f_1(a) \\ B & \xrightarrow{j} & B/N \end{array}$$

Пусть $\omega \in \Omega_2(p)$. Так как отображения $f(a)$ и j являются гомоморфизмами Ω_2 -алгебры, то

$$(3.4.10) \quad \begin{aligned} f_1(a) \circ (j(b_1) \dots j(b_p) \omega) &= f_1(a) \circ j(b_1 \dots b_p \omega) \\ &= j(f(a) \circ (b_1 \dots b_p \omega)) \\ &= j((f(a) \circ b_1) \dots (f(a) \circ b_p) \omega) \\ &= j(f(a) \circ b_1) \dots j(f(a) \circ b_p) \omega \\ &= (f_1(a) \circ j(b_1)) \dots (f_1(a) \circ j(b_p)) \omega \end{aligned}$$

Из равенства (3.4.10) следует, что отображение $f_1(a)$ является гомоморфизмом Ω_2 -алгебры. Из равенства (3.4.8), согласно определению 3.4.2, следует, что отображение j является приведенным морфизмом представления f в представление f_1 . \square

ТЕОРЕМА 3.4.8. Пусть

$$f : A \dashrightarrow B$$

представление Ω_1 -алгебры A в Ω_2 -алгебре B . Пусть N - такая конгруэнция на Ω_2 -алгебре B , что любое преобразование $h \in \text{End}(\Omega_2, B)$ согласованно

с конгруэнцией N . Рассмотрим категорию \mathcal{A} объектами которой являются приведенные морфизмы представлений^{3.7}


$$R_1 : B \rightarrow S_1 \quad \ker R_1 \supseteq N$$

$$R_2 : B \rightarrow S_2 \quad \ker R_2 \supseteq N$$

где S_1, S_2 - Ω_2 -алгебры и


$$g_1 : A \dashrightarrow S_1 \quad g_2 : A \dashrightarrow S_2$$

представления Ω_1 -алгебры A . Мы определим морфизм $R_1 \rightarrow R_2$ как приведенный морфизм представлений $h : S_1 \rightarrow S_2$, для которого коммутативна диаграмма



Приведенный морфизм $\text{nat } N$ представления f в представление f_1 (теорема 3.4.7) является универсально отталкивающим в категории \mathcal{A} .^{3.8}

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Существование и единственность отображения h , для которого коммутативна диаграмма



следует из теоремы 2.1.6. Следовательно, мы можем однозначно определить отображение h с помощью равенства

$$(3.4.11) \quad h(j(b)) = R(b)$$

Пусть $\omega \in \Omega_2(p)$. Так как отображения R и j являются гомоморфизмами Ω_2 -алгебры, то

$$(3.4.12) \quad \begin{aligned} h(j(b_1) \dots j(b_p)\omega) &= h(j(b_1 \dots b_p)\omega) = R(b_1 \dots b_p)\omega = R(b_1) \dots R(b_p)\omega \\ &= h(j(b_1)) \dots h(j(b_p))\omega \end{aligned}$$

Из равенства (3.4.12) следует, что отображение h является гомоморфизмом Ω_2 -алгебры.

^{3.7}Утверждение леммы аналогично утверждению на странице [2]-94.

^{3.8}Определение универсального объекта смотри в определении на с. [2]-47.

Так как отображение R является приведенным морфизмом представления f в представление g , то верно равенство

$$(3.4.13) \quad g(a)(R(b)) = R(f(a)(b))$$

Из равенства (3.4.11) следует

$$(3.4.14) \quad g(a)(h(j(b))) = g(a)(R(b))$$

Из равенств (3.4.13), (3.4.14) следует

$$(3.4.15) \quad g(a)(h(j(b))) = R(f(a)(b))$$

Из равенств (3.4.11), (3.4.15) следует

$$(3.4.16) \quad g(a)(h(j(b))) = h(j(f(a)(b)))$$

Из равенств (3.4.8), (3.4.16) следует

$$(3.4.17) \quad g(a)(h(j(b))) = h(f_1(a)(j(b)))$$

Из равенства (3.4.17) следует, что отображение h является приведенным морфизмом представления f_1 в представление g . \square

3.5. Автоморфизм представления универсальной алгебры

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.5.1. Пусть

$$f : A_1 \xrightarrow{*} A_2$$

представление Ω_1 -алгебры A_1 в Ω_2 -алгебре A_2 . Приведенный морфизм представлений Ω_1 -алгебры

$$r_2 : A_2 \rightarrow A_2$$

такой, что r_2 - эндоморфизм Ω_2 -алгебры называется **эндоморфизмом представления f** . \square

ТЕОРЕМА 3.5.2. Если представление

$$f : A_1 \xrightarrow{*} A_2$$

Ω_1 -алгебры A_1 однотранзитивно, то для любых $a_{21}, a_{22} \in A_2$ существует единственный эндоморфизм

$$r_2 : A_2 \rightarrow A_2$$

представления f такой, что $r_2(a_{21}) = a_{22}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Рассмотрим следующую диаграмму

$$\begin{array}{ccc} A_2 & \xrightarrow{r_2} & A_2 \\ & \swarrow f^* & \nearrow f^* \\ & A_1 & \end{array}$$

Существование эндоморфизма является следствием теоремы 3.2.10. Единственность эндоморфизма для заданных $p, q \in A_2$ является следствием теоремы 3.2.11, когда $r_1 = \text{id}$. \square

ТЕОРЕМА 3.5.3. Эндоморфизмы представления f порождают полугруппу.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из теоремы 3.3.1 следует, что произведение эндоморфизмов (id, p_2) , (id, r_2) представления f является эндоморфизмом $(\text{id}, p_2 \circ r_2)$ представления f . \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.5.4. Пусть

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

представление Ω_1 -алгебры A_1 в Ω_2 -алгебре A_2 . Морфизм представлений Ω_1 -алгебры

$$r_2 : A_2 \rightarrow A_2$$

такой, что r_2 - автоморфизм Ω_2 -алгебры называется **автоморфизмом представления** f . \square

ТЕОРЕМА 3.5.5. Пусть

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

представление Ω_1 -алгебры A_1 в Ω_2 -алгебре A_2 . Множество автоморфизмов представления f порождает группу $GA(f)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть r_2, p_2 - автоморфизмы представления f . Согласно определению 3.5.4, отображения r_2, p_2 являются автоморфизмами Ω_2 -алгебры A_2 . Согласно теореме II.3.2, ([14], с. 60), отображение $r_2 \circ p_2$ является автоморфизмом Ω_2 -алгебры A_2 . Из теоремы 3.3.1 и определения 3.5.4 следует, что произведение автоморфизмов $r_2 \circ p_2$ представления f является автоморфизмом представления f .

Пусть r_2, p_2, q_2 - автоморфизмы представления f . Из цепочки равенств

$$\begin{aligned} ((r_2 \circ p_2) \circ q_2)(a) &= (r_2 \circ p_2)(q_2(a)) = r_2(p_2(q_2(a))) \\ &= r_2((p_2 \circ q_2)(a)) = (r_2 \circ (p_2 \circ q_2))(a) \end{aligned}$$

следует ассоциативность произведения для отображений ^{3.9} r_2, p_2, q_2 .

Пусть r_2 - автоморфизм представления f . Согласно определению 3.5.4 отображение r_2 является автоморфизмом Ω_2 -алгебры A_2 . Следовательно, отображение r_2^{-1} является автоморфизмом Ω_2 -алгебры A_2 . Для автоморфизма r_2 представления справедливо равенство (3.2.3). Положим $m' = r_2(m)$. Так как r_2 - автоморфизм Ω_2 -алгебры, то $m = r_2^{-1}(m')$ и равенство (3.2.3) можно записать в виде

$$(3.5.1) \quad r_2(f(a')(r_2^{-1}(m'))) = f(a')(m')$$

Так как отображение r_2 является автоморфизмом Ω_2 -алгебры A_2 , то из равенства (3.5.1) следует

$$(3.5.2) \quad f(a')(r_2^{-1}(m')) = r_2^{-1}(f(a')(m'))$$

Равенство (3.5.2) соответствует равенству (3.2.3) для отображения r_2^{-1} . Следовательно, отображение r_2^{-1} является автоморфизмом представления f . \square

^{3.9} При доказательстве ассоциативности произведения я следую примеру полугруппы из [5], с. 20, 21.

Ω-группа

4.1. Множество гомоморфизмов Ω-алгебры

ТЕОРЕМА 4.1.1. Пусть множества A, B являются Ω-алгебрами. Множество $\text{Hom}(\Omega; A \rightarrow B)$ является Ω-алгеброй, если для любых операций $\omega_1 \in \Omega(m), \omega_2 \in \Omega(n)$, верно следующее равенство

$$(4.1.1) \quad (a_{11} \dots a_{1n} \omega_2) \dots (a_{m1} \dots a_{mn} \omega_2) \omega_1 = (a_{11} \dots a_{m1} \omega_1) \dots (a_{1n} \dots a_{mn} \omega_1) \omega_2$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно теореме 2.2.6, множество B^A является Ω-алгеброй. Пусть $\omega \in \Omega(n)$. Для отображений $f_1, \dots, f_n \in B^A$, мы определим операцию ω равенством

$$(4.1.2) \quad (f_1 \dots f_n \omega)(x) = f_1(x) \dots f_n(x) \omega$$

Пусть $\omega_1 \in \Omega(m), \omega_2 \in \Omega(n)$. Пусть отображения $f_1, \dots, f_m \in \text{Hom}(\Omega; A \rightarrow B)$ являются гомоморфизмами Ω-алгебры A в Ω-алгебру B . В частности, для любых $a_1, \dots, a_n \in A$

$$(4.1.3) \quad \begin{aligned} f_1(a_1 \dots a_n \omega_2) &= f_1(a_1) \dots f_1(a_n) \omega_2 \\ &\dots = \dots \\ f_m(a_1 \dots a_n \omega_2) &= f_m(a_1) \dots f_m(a_n) \omega_2 \end{aligned}$$

Если мы требуем, что отображение $f_1 \dots f_m \omega_1$ является гомоморфизмом Ω-алгебры A в Ω-алгебру B , то

$$(4.1.4) \quad (f_1 \dots f_m \omega_1)(a_1 \dots a_n \omega_2) = ((f_1 \dots f_m \omega_1)(a_1)) \dots ((f_1 \dots f_m \omega_1)(a_n)) \omega_2$$

Согласно определению (4.1.2), равенство

$$(4.1.5) \quad \begin{aligned} &f_1(a_1 \dots a_n \omega_2) \dots f_m(a_1 \dots a_n \omega_2) \omega_1 \\ &= (f_1(a_1) \dots f_m(a_1) \omega_1) \dots (f_1(a_n) \dots f_m(a_n) \omega_1) \omega_2 \end{aligned}$$

является следствием равенства (4.1.4). Равенство

$$(4.1.6) \quad \begin{aligned} &(f_1(a_1) \dots f_1(a_n) \omega_2) \dots (f_m(a_1) \dots f_m(a_n) \omega_2) \omega_1 \\ &= (f_1(a_1) \dots f_m(a_1) \omega_1) \dots (f_1(a_n) \dots f_m(a_n) \omega_1) \omega_2 \end{aligned}$$

является следствием равенств (4.1.3), (4.1.5). Положим

$$(4.1.7) \quad a_{ij} = f_i(a_j)$$

Равенство (4.1.1) является следствием равенств (4.1.6), (4.1.7). □

Не всякая Ω-алгебра удовлетворяет условиям теоремы 4.1.1.

ТЕОРЕМА 4.1.2. Если G_1, G_2 - абелевы полугруппы, то множество $\text{Hom}(\{+\}; G_1 \rightarrow G_2)$ также является абелевой полугруппой.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Поскольку операция сложения в абелевой полугруппе коммутативна и ассоциативна, то теорема является следствием теоремы 4.1.1. \square

ТЕОРЕМА 4.1.3. *Множество $\text{End}(\{+\}; A)$ эндоморфизмов абелевой группы A является абелевой группой.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Теорема является следствием теорем 2.2.13, 4.1.2 и утверждения, что уравнение

$$x + a = 0$$

в абелевой группе имеет решение. \square

ТЕОРЕМА 4.1.4. *Если D_1, D_2 - кольца, то множество $\text{Hom}(\{+, *\}; D_1 \rightarrow D_2)$, вообще говоря, кольцом не является.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В кольце определены две операции: сложение, которое коммутативно и ассоциативно, и произведение, которое дистрибутивно относительно сложения. Согласно теореме 4.1.1, сложение и произведение должны удовлетворять равенству

$$(4.1.8) \quad a_{11}a_{21} + a_{12}a_{22} = (a_{11} + a_{12})(a_{21} + a_{22})$$

Однако правая часть равенства (4.1.8) имеет вид

$$\begin{aligned} (a_{11} + a_{12})(a_{21} + a_{22}) &= (a_{11} + a_{12})a_{21} + (a_{11} + a_{12})a_{22} \\ &= a_{11}a_{21} + a_{12}a_{21} + a_{11}a_{22} + a_{12}a_{22} \end{aligned}$$

Следовательно, равенство (4.1.8) не верно. \square

Анализ теорем 4.1.2, 4.1.4 говорит о том, что множество Ω -алгебр, удовлетворяющих условиям теоремы 4.1.1, невелико.

ВОПРОС 4.1.5. *Существует ли универсальная алгебра, отличная от абелевой полугруппы и удовлетворяющая условиям теоремы 4.1.1?* \square

Из нашего опыта следует, что многие Ω -алгебры содержат операцию, которая соло порождает бы полугруппу. Поэтому мы изменим формулировку теоремы 4.1.1.

ТЕОРЕМА 4.1.6. *Пусть множества A, B являются Ω -алгебрами. Пусть $\omega \in \Omega(n)$. Множество $\text{Hom}(\Omega; A \rightarrow B)$ замкнуто относительно операции ω , если верно следующее равенство*

$$(4.1.9) \quad \begin{aligned} &(a_{11} \dots a_{1n} \omega) \dots (a_{n1} \dots a_{nn} \omega) \omega \\ &= (a_{11} \dots a_{n1} \omega) \dots (a_{1n} \dots a_{nn} \omega) \omega \end{aligned}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Вообще говоря, мы рассматриваем множество $\text{Hom}(\{\omega\}; A \rightarrow B)$. Теорема является следствием теоремы 4.1.1. \square

ТЕОРЕМА 4.1.7. *Пусть операция $\omega \in \Omega(2)$ коммутативна и ассоциативна. Множество $\text{Hom}(\Omega; A \rightarrow B)$ замкнуто относительно операции ω .*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Так как операция $\omega \in \Omega(2)$ коммутативна и ассоциативна, то

$$\begin{aligned}
 (4.1.10) \quad (a_{11}a_{12}\omega)(a_{21}a_{22}\omega)\omega &= a_{11}(a_{12}(a_{21}a_{22}\omega)\omega)\omega \\
 &= a_{11}((a_{12}a_{21}\omega)a_{22}\omega)\omega \\
 &= a_{11}((a_{21}a_{12}\omega)a_{22}\omega)\omega \\
 &= a_{11}(a_{21}(a_{12}a_{22}\omega)\omega)\omega \\
 &= (a_{11}a_{21}\omega)(a_{12}\dots a_{22}\omega)\omega
 \end{aligned}$$

Теорема является следствием равенства (4.1.10) и теоремы 4.1.6. \square

ТЕОРЕМА 4.1.8. Пусть операция $\omega \in \Omega(2)$ имеет нейтральный элемент и множество $\text{Hom}(\Omega; A \rightarrow B)$ замкнуто относительно операции ω . Тогда операция ω коммутативна и ассоциативна.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Равенства

$$(4.1.11) \quad ab\omega = (eaw)(bew)\omega = (ebw)(aew)\omega = baw$$

$$(4.1.12) \quad a(bc\omega) = (aew)(bc\omega)\omega = (ab\omega)(ec\omega)\omega = (ab\omega)c\omega$$

являются следствием равенств (2.4.1), (2.4.2), (4.1.9). Ассоциативность операции ω является следствием равенства (4.1.11). Коммутативность операции ω является следствием равенства (4.1.12). \square

ВОПРОС 4.1.9. Существует ли область операторов Ω , для которой верны следующие утверждения?

- Множество $\text{Hom}(\Omega; A \rightarrow B)$ замкнуто относительно операции $\omega \in \Omega(2)$.
- Операция ω не является коммутативной или ассоциативной.

\square

4.2. Ω -группа

Пусть в Ω_2 -алгебре A_2 определена операция $\omega \in \Omega_2(2)$, которая коммутативна и ассоциативна. Мы будем отождествлять операцию ω с суммой. Мы пользуемся символом $+$ для обозначения операции суммы. Положим

$$\Omega = \Omega_2 \setminus \{+\}$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.2.1. *Отображение*

$$f : A_2 \rightarrow B_2$$

Ω_2 -алгебры A_2 в Ω_2 -алгебру B_2 называется **аддитивным отображением**, если

$$f(a + b) = f(a) + f(b)$$

Обозначим $\mathcal{A}(A_2 \rightarrow B_2)$ множество аддитивных отображений Ω_2 -алгебры A_2 в Ω_2 -алгебру B_2 . \square

ТЕОРЕМА 4.2.2. $\mathcal{A}(A_2 \rightarrow B_2) = \text{Hom}(\{+\}; A_2 \rightarrow B_2)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Теорема является следствием определений 2.2.9, 4.2.1. \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.2.3. *Отображение*

$$g : A^n \rightarrow A$$

называется **полиаддитивным отображением**, если для любого $i, i = 1, \dots, n$,

$$f(a_1, \dots, a_i + b_i, \dots, a_n) = f(a_1, \dots, a_i, \dots, a_n) + f(a_1, \dots, b_i, \dots, a_n)$$

□

ТЕОРЕМА 4.2.4. *Пусть отображение*

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

является эффективным представлением Ω -алгебры A_1 в абелевой полугруппе A_2 .

4.2.4.1: *На множестве A_1 можно определить структуру абелевой полугруппы*

$$(4.2.1) \quad f(a_1 + b_1)(a_2) = f(a_1)(a_2) + f(b_1)(a_2)$$

4.2.4.2: *Отображение f является аддитивным отображением.*

4.2.4.3: *Отображение f является представлением Ω_1 -алгебры A_1 , где $\Omega_1 = \Omega \cup \{+\}$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно теоремам 2.2.13, 4.1.7, множество $\text{End}(\{+\}, A_2)$ является абелевой полугруппой. Поскольку представление f эффективно, то, согласно теоремам 3.1.3, 4.1.1, для любых A_1 -чисел a, b существует единственное A_1 -число c такое, что

$$(4.2.2) \quad f(c)(a_2) = f(a)(a_2) + f(b)(a_2)$$

Опираясь на равенство (4.2.2), мы определяем сумму A_1 -чисел

$$(4.2.3) \quad c = a + b$$

Равенство (4.2.1) является следствием равенств (4.2.2), (4.2.3).

ЛЕММА 4.2.5. *Сумма A_1 -чисел коммутативна.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Поскольку сумма A_2 -чисел коммутативна, то равенство

$$(4.2.4) \quad \begin{aligned} f(a_1 + b_1)(a_2) &= f(a_1)(a_2) + f(b_1)(a_2) = f(b_1)(a_2) + f(a_1)(a_2) \\ &= f(b_1 + a_1)(a_2) \end{aligned}$$

является следствием равенства (4.2.1). Лемма является следствием равенства (4.2.4). ◉

ЛЕММА 4.2.6. *Сумма A_1 -чисел ассоциативна.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Поскольку сумма A_2 -чисел ассоциативна, то равенство

$$(4.2.5) \quad \begin{aligned} f((a_1 + b_1) + c_1)(a_2) &= f(a_1 + b_1)(a_2) + f(c_1)(a_2) \\ &= (f(a_1)(a_2) + f(b_1)(a_2)) + f(c_1)(a_2) \\ &= f(a_1)(a_2) + (f(b_1)(a_2) + f(c_1)(a_2)) \\ &= f(a_1)(a_2) + f(b_1 + c_1)(a_2) \\ &= f(a_1 + (b_1 + c_1))(a_2) \end{aligned}$$

является следствием равенства (4.2.1). Лемма является следствием равенства (4.2.5). \odot

Утверждение 4.2.4.1 является следствием равенства (4.2.3), лемм 4.2.5, 4.2.6 и определения 2.4.4.

Утверждение 4.2.4.2 является следствием равенства (4.2.3). Утверждение 4.2.4.3 является следствием утверждения 4.2.4.2, так как отображение f является гомоморфизмом Ω -алгебры. \square

ТЕОРЕМА 4.2.7. Пусть $\omega \in \Omega(n)$, $\omega_1 \in \Omega(m)$. Отображение

$$(4.2.6) \quad g : a_i \rightarrow a_1 \dots a_n \omega$$

согласовано с операцией ω_1 , если верно следующее равенство

$$(4.2.7) \quad a_1 \dots (a_{i_1} \dots a_{i_m} \omega_1) \dots a_n \omega = (a_1 \dots a_{i_1} \dots a_n \omega) \dots (a_1 \dots a_{i_m} \dots a_n \omega) \omega_1$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Равенство

$$(4.2.8) \quad \begin{aligned} g(a_{i_1} \dots a_{i_m} \omega_1) &= a_1 \dots (a_{i_1} \dots a_{i_m} \omega_1) \dots a_n \omega \\ &= (a_1 \dots a_{i_1} \dots a_n \omega) \dots (a_1 \dots a_{i_m} \dots a_n \omega) \omega_1 \\ &= g(a_{i_1}) \dots g(a_{i_m}) \omega_1 \end{aligned}$$

является следствием равенств (4.2.7), (4.2.6). Теорема является следствием определения 2.2.9 и равенства (4.2.8). \square

Равенство (4.2.7) является менее жёстким, чем равенство (4.1.1). Тем не менее, также как и в случае теоремы 4.1.1, большинство операций универсальной алгебры не удовлетворяет условиям теоремы 4.2.7. Поскольку операция сложения удовлетворяет условиям теоремы 4.1.1, мы ожидаем, что существуют условия, когда операция сложения удовлетворяет условиям теоремы 4.2.7.

ТЕОРЕМА 4.2.8. Пусть $\omega \in \Omega(n)$. Если отображение

$$(4.2.9) \quad g : a_i \rightarrow a_1 \dots a_n \omega$$

согласовано со сложением для любого i , то операция ω является полиаддитивным отображением.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно теореме 4.2.7, если отображение (4.2.9) согласовано со сложением, то верно следующее равенство

$$(4.2.10) \quad a_1 \dots (a_{i_1} + a_{i_2}) \dots a_n \omega = (a_1 \dots a_{i_1} \dots a_n \omega) + (a_1 \dots a_{i_2} \dots a_n \omega)$$

Теорема является следствием равенства (4.2.10) и определения 4.2.3. \square

ТЕОРЕМА 4.2.9. Пусть $\omega \in \Omega(n)$ - полиаддитивное отображение. Операция ω **дистрибутивна** относительно сложения

$$a_1 \dots (a_i + b_i) \dots a_n \omega = a_1 \dots a_i \dots a_n \omega + a_1 \dots b_i \dots a_n \omega \quad i = 1, \dots, n$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Теорема является следствием теоремы 4.2.8. \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.2.10. Пусть в Ω_1 -алгебре A определена операция сложения, которая не обязательно коммутативна. Мы пользуемся символом $+$ для обозначения операции суммы. Положим

$$\Omega = \Omega_1 \setminus \{+\}$$

Если Ω_1 -алгебра A является группой относительно операции сложения и любая операция $\omega \in \Omega$ является полиаддитивным отображением, то Ω_1 -алгебра

A называется Ω -группой. Если Ω -группа A является ассоциативной группой относительно операции сложения, то Ω_1 -алгебра A называется **ассоциативной Ω -группой**. Если Ω -группа A является абелевой группой относительно операции сложения, то Ω_1 -алгебра A называется **абелевой Ω -группой**. \square

ПРИМЕР 4.2.11. Группа является наиболее очевидным примером Ω -группы.

Кольцо является Ω -группой.

Бикольцо матриц над телом ([8]) является Ω -группой. \square

ЗАМЕЧАНИЕ 4.2.12. Бурбаки рассматривают похожее определение, а именно группы с операторами (смотри определение 10 в [16] на странице 100). \square

ТЕОРЕМА 4.2.13. Пусть A - Ω -группа. Пусть $\omega \in \Omega(n)$. отображение

$$g : a_i \rightarrow a_1 \dots a_n \omega$$

является эндоморфизмом аддитивной группы A .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Теорема является следствием теоремы 4.2.9 и определения 4.2.10. \square

ТЕОРЕМА 4.2.14. Пусть отображение

$$g : A_1 \xrightarrow{*} A_2$$

является представлением Ω -группы A_1 . Тогда отображение

$$\left(a_i \rightarrow a_1 \dots a_n \omega \quad f(a_i) \rightarrow f(a_1) \dots f(a_n) \omega \right)$$

является морфизмом представления f аддитивной группы A_1 .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Теорема является следствием теоремы 4.2.13 и определений 3.1.1, 3.2.2. \square

4.3. Декартово произведение представлений

ЛЕММА 4.3.1. Пусть

$$A = \prod_{i \in I} A_i$$

декартово произведение семейства Ω_2 -алгебр $(A_i, i \in I)$. Для каждого $i \in I$, пусть множество $\text{End}(\Omega_2, A_i)$ является Ω_1 -алгеброй. Тогда множество

$$(4.3.1) \quad {}^\circ A = \{f \in \text{End}(\Omega_2; A) : f(a_i, i \in I) = (f_i(a_i), i \in I)\}$$

является декартовым произведением Ω_1 -алгебр $\text{End}(\Omega_2, A_i)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно определению (4.3.1), мы можем представить отображение $f \in {}^\circ A$ в виде кортежа

$$f = (f_i, i \in I)$$

отображений $f_i \in \text{End}(\Omega_2; A_i)$. Согласно определению (4.3.1),

$$(f_i, i \in I)(a_i, i \in I) = (f_i(a_i), i \in I)$$

Пусть $\omega \in \Omega_2$ - n -арная операция. Мы определим операцию ω на множестве ${}^\circ A$ равенством

$$((f_{1i}, i \in I) \dots (f_{ni}, i \in I) \omega)(a_i, i \in I) = ((f_{1i}(a_i)) \dots (f_{ni}(a_i)) \omega, i \in I)$$

\square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.3.2. Пусть \mathcal{A}_1 - категория Ω_1 -алгебр. Пусть \mathcal{A}_2 - категория Ω_2 -алгебр. Мы определим категорию $\mathcal{A}_1(\mathcal{A}_2)$ представлений. Объектами этой категории являются представления Ω_1 -алгебры в Ω_2 -алгебре. Морфизмами этой категории являются морфизмы соответствующих представлений. \square

ТЕОРЕМА 4.3.3. В категории $\mathcal{A}_1(\mathcal{A}_2)$ существует произведение однотранзитивных представлений Ω_1 -алгебры в Ω_2 -алгебре.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Для $j = 1, 2$, пусть

$$P_j = \prod_{i \in I} B_{ji}$$

произведение семейства Ω_j -алгебр $\{B_{ji}, i \in I\}$ и для любого $i \in I$ отображение

$$t_{ji} : P_j \longrightarrow B_{ji}$$

является проекцией на множитель i . Для каждого $i \in I$, пусть

$$h_i : B_{1i} \dashrightarrow B_{2i}$$

однотранзитивное B_{1i} -представление в Ω_2 -алгебре B_{2i} .

Пусть $b_1 \in P_1$. Согласно утверждению 2.3.3.3, P_1 -число b_1 может быть представлено в виде кортежа B_{1i} -чисел

$$(4.3.2) \quad b_1 = (b_{1i}, i \in I) \quad b_{1i} = t_{1i}(b_1) \in B_{1i}$$

Пусть $b_2 \in P_2$. Согласно утверждению 2.3.3.3, P_2 -число b_2 может быть представлено в виде кортежа B_{2i} -чисел

$$(4.3.3) \quad b_2 = (b_{2i}, i \in I) \quad b_{2i} = t_{2i}(b_2) \in B_{2i}$$

ЛЕММА 4.3.4. Для каждого $i \in I$, рассмотрим диаграмму отображений

$$(4.3.4) \quad \begin{array}{ccc} & P_2 & \xrightarrow{t_{2i}} B_{2i} \\ & \nearrow g & \searrow h_i \\ P_1 & \xrightarrow{t_{1i}} B_{1i} & \xrightarrow{t_{2i}} B_{2i} \\ & \searrow h_i & \nearrow h_i(b_{1i}) \end{array} \quad (1)$$

Пусть отображение

$$g : P_1 \rightarrow \text{End}(\Omega_2; P_2)$$

определено равенством

$$(4.3.5) \quad g(b_1)(b_2) = (h_i(b_{1i})(b_{2i}), i \in I)$$

Тогда отображение g является однотранзитивным P_1 -представлением в Ω_2 -алгебре P_2

$$g : P_1 \dashrightarrow P_2$$

Отображение (t_{1i}, t_{2i}) является морфизмом представления g в представлении h_i .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.

4.3.4.1: Согласно определениям 3.1.1, отображение $h_i(b_{1i})$ является гомоморфизмом Ω_2 -алгебры B_{2i} . Согласно теореме 2.3.6, из коммутативности диаграммы (1) для каждого $i \in I$, следует, что отображение

$$g(b_1) : P_2 \rightarrow P_2$$

определённое равенством (4.3.5) является гомоморфизмом Ω_2 -алгебры P_2 .

4.3.4.2: Согласно определению 3.1.1, множество $\text{End}(\Omega_2; B_{2i})$ является Ω_1 -алгеброй. Согласно лемме 4.3.1, множество ${}^\circ P_2 \subseteq \text{End}(\Omega_2; P_2)$ является Ω_1 -алгеброй.

4.3.4.3: Согласно определению 3.1.1, отображение

$$h_i : B_{1i} \rightarrow \text{End}(\Omega_2; B_{2i})$$

является гомоморфизмом Ω_1 -алгебры. Согласно теореме 2.3.6, отображение

$$g : P_1 \rightarrow \text{End}(\Omega_2; P_2)$$

определённое равенством

$$g(b_1) = (h_i(b_{1i}), i \in I)$$

является гомоморфизмом Ω_1 -алгебры.

Согласно утверждениям 4.3.4.1, 4.3.4.3 и определению 3.1.1, отображение g является P_1 -представлением в Ω_2 -алгебре P_2 .

Пусть $b_{21}, b_{22} \in P_2$. Согласно утверждению 2.3.3.3, P_2 -числа b_{21}, b_{22} могут быть представлены в виде кортежей B_{2i} -чисел

$$(4.3.6) \quad \begin{aligned} b_{21} &= (b_{21i}, i \in I) & b_{21i} &= t_{2i}(b_{21}) \in B_{2i} \\ b_{22} &= (b_{22i}, i \in I) & b_{22i} &= t_{2i}(b_{22}) \in B_{2i} \end{aligned}$$

Согласно теореме 3.1.9, поскольку представление h_i однотранзитивно, то существует единственное B_{1i} -число b_{1i} такое, что

$$b_{22i} = h_i(b_{1i})(b_{21i})$$

Согласно определениям (4.3.2), (4.3.5), (4.3.6), существует единственное P_1 -число b_1 такое, что

$$b_{22} = g(b_1)(b_{21})$$

Согласно теореме 3.1.9, представление g однотранзитивно.

Из коммутативности диаграммы (1) и определения 3.2.2, следует, что отображение (t_{1i}, t_{2i}) является морфизмом представления g в представление h_i . \odot

Пусть

$$(4.3.7) \quad d_2 = g(b_1)(b_2) \quad d_2 = (d_{2i}, i \in I)$$

Из равенств (4.3.5), (4.3.7) следует, что

$$(4.3.8) \quad d_{2i} = h_i(b_{1i})(b_{2i})$$

Для $j = 1, 2$, пусть R_j - другой объект категории \mathcal{A}_j . Для любого $i \in I$, пусть отображение

$$r_{1i} : R_1 \longrightarrow B_{1i}$$

является морфизмом из Ω_1 -алгебра R_1 в Ω_1 -алгебру B_{1i} . Согласно определению 2.3.1, существует единственный морфизм Ω_1 -алгебры

$$s_1 : R_1 \longrightarrow P_1$$

такой, что коммутативна диаграмма

$$(4.3.9) \quad \begin{array}{ccc} P_1 & \xrightarrow{t_{1i}} & B_{1i} \\ s_1 \uparrow & & \uparrow r_{1i} \\ R_1 & & \end{array} \quad t_{1i}(s_1) = r_{1i}$$

Пусть $a_1 \in R_1$. Пусть

$$(4.3.10) \quad b_1 = s_1(a_1) \in P_1$$

Из коммутативности диаграммы (4.3.9) и утверждений (4.3.10), (4.3.2) следует, что

$$(4.3.11) \quad b_{1i} = r_{1i}(a_1)$$

Пусть

$$f : R_1 \dashrightarrow R_2$$

однотранзитивное R_1 -представление в Ω_2 -алгебре R_2 . Согласно теореме 3.2.11, морфизм Ω_2 -алгебры

$$r_{2i} : R_2 \longrightarrow B_{2i}$$

такой, что отображение (r_{1i}, r_{2i}) является морфизмом представлений из f в h_i , определён однозначно с точностью до выбора образа R_2 -числа a_2 . Согласно замечанию 3.2.7, в диаграмме отображений

$$(4.3.12) \quad \begin{array}{ccccc} & & & & B_{2i} \\ & & & & \uparrow \\ & & & & h_i \\ & & B_{1i} & \xrightarrow{h_i} & B_{2i} \\ & & \uparrow r_{1i} & & \uparrow r_{2i} \\ R_1 & & & & R_2 \\ & & & & \downarrow f(a_1) \\ & & & & R_2 \\ & & & & \uparrow r_{2i} \\ & & & & B_{2i} \end{array}$$

диаграмма (2) коммутативна. Согласно определению 2.3.1, существует единственный морфизм Ω_2 -алгебры

$$s_2 : R_2 \longrightarrow P_2$$

такой, что коммутативна диаграмма

$$(4.3.13) \quad \begin{array}{ccc} P_2 & \xrightarrow{t_{2i}} & B_{2i} \\ s_2 \uparrow & & \nearrow r_{2i} \\ R_2 & & \end{array} \quad t_{2i}(s_2) = r_{2i}$$

Пусть $a_2 \in R_2$. Пусть

$$(4.3.14) \quad b_2 = s_2(a_2) \in P_2$$

Из коммутативности диаграммы (4.3.13) и утверждений (4.3.14), (4.3.3) следует, что

$$(4.3.15) \quad b_{2i} = r_{2i}(a_2)$$

Пусть

$$(4.3.16) \quad c_2 = f(a_1)(a_2)$$

Из коммутативности диаграммы (2) и равенств (4.3.8), (4.3.15), (4.3.16) следует, что


$$(4.3.17) \quad d_{2i} = r_{2i}(c_2)$$

Из равенств (4.3.8), (4.3.17) следует, что

$$(4.3.18) \quad d_2 = s_2(c_2)$$

что согласуется с коммутативностью диаграммы (4.3.13).

Для каждого $i \in I$, мы объединим диаграммы отображений (4.3.4), (4.3.9), (4.3.13), (4.3.12)



Из равенств (4.3.7) (4.3.14) и из равенств (4.3.16), (4.3.18), следует коммутативность диаграммы (3). Следовательно, отображение (s_1, s_2) является морфизмом представлений из f в g . Согласно теореме 3.2.11, морфизм (s_1, s_2) определён однозначно, так как мы требуем (4.3.18).

Согласно определению 2.3.1, представление g и семейство морфизмов представления $((t_{1i}, t_{2i}), i \in I)$ является произведением в категории $\mathcal{A}_1(\mathcal{A}_2)$. \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.3.5. Пусть A_1, \dots, A_n, A - Ω_1 -алгебры. Пусть B_1, \dots, B_n, B - Ω_2 -алгебры. Пусть, для любого $k, k = 1, \dots, n$,

$$f_k : A_k \longrightarrow B_k$$

представление Ω_1 -алгебры A_k в Ω_2 -алгебре B_k . Пусть

$$f : A \longrightarrow B$$

представление Ω_1 -алгебры A в Ω_2 -алгебре B . Отображение

$$\left(r_{1k} : A_k \rightarrow A \quad k = 1, \dots, n \quad r_2 : B_1 \times \dots \times B_n \rightarrow B \right)$$

называется **полиморфизмом представлений** f_1, \dots, f_n в представление f , если, для любого $k, k = 1, \dots, n$, при условии, что все переменные кроме переменных $a_k \in A_k, b_k \in B_k$ имеют заданное значение, отображение (r_{1k}, r_2) является морфизмом представления f_k в представление f .

Если $f_1 = \dots = f_n$, то мы будем говорить, что отображение $((r_{1,k}, k = 1, \dots, n) \quad r_2)$ является полиморфизмом представления f_1 в представление f .

Если $f_1 = \dots = f_n = f$, то мы будем говорить, что отображение $((r_{1,k}, k = 1, \dots, n) \quad r_2)$ является полиморфизмом представления f . \square

Мы также будем говорить, что отображение $r = (r_1, r_2)$ является полиморфизмом представлений в Ω_2 -алгебрах B_1, \dots, B_n в представление в Ω_2 -алгебре B .

ТЕОРЕМА 4.3.6. Пусть отображение $((r_{1,k}, k = 1, \dots, n) \quad r_2)$ является полиморфизмом представлений f_1, \dots, f_n в представление f . Для любого $k, k = 1, \dots, n$, отображение (r_{1k}, r_2) удовлетворяет равенству

$$(4.3.19) \quad r_2(m_1, \dots, f_k(a_k)(m_k), \dots, m_n) = f(r_{1k}(a_k))(r_2(m_1, \dots, m_n))$$

Пусть $\omega_1 \in \Omega_1(p)$. Для любого $k, k = 1, \dots, n$, отображение r_{1k} удовлетворяет равенству

$$(4.3.20) \quad r_{1k}(a_{k.1} \dots a_{k.p} \omega_1) = r_{1k}(a_{k.1}) \dots r_{1k}(a_{k.p}) \omega_1$$

Пусть $\omega_2 \in \Omega_2(p)$. Для любого $k, k = 1, \dots, n$, отображение r_2 удовлетворяет равенству

$$(4.3.21) \quad \begin{aligned} & r_2(m_1, \dots, m_{k.1} \dots m_{k.p} \omega_2, \dots, m_n) \\ &= r_2(m_1, \dots, m_{k.1}, \dots, m_n) \dots r_2(m_1, \dots, m_{k.p}, \dots, m_n) \omega_2 \end{aligned}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Равенство (4.3.19) следует из определения 4.3.5 и равенства (3.2.3). Равенство (4.3.20) следует из утверждения, что, для любого $k, k = 1, \dots, n$, при условии, что все переменные кроме переменной $x_k \in A_k$ имеют заданное значение, отображение r_1 является гомоморфизмом Ω_1 -алгебры A_k в Ω_1 -алгебру A . Равенство (4.3.21) следует из утверждения, что, для любого $k, k = 1, \dots, n$, при условии, что все переменные кроме переменной $m_k \in B_k$ имеют заданное значение, отображение r_2 является гомоморфизмом Ω_2 -алгебры B_k в Ω_2 -алгебру B . \square

4.4. Приведенное декартово произведение представлений

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.4.1. Пусть A_1 - Ω_1 -алгебра. Пусть A_2 - категория Ω_2 -алгебр. Мы определим категорию $A_1(A_2)$ представлений Ω_1 -алгебры A_1 в Ω_2 -алгебре. Объектами этой категории являются представления Ω_1 -алгебры A_1 в Ω_2 -алгебре. Морфизмами этой категории являются приведенные морфизмы соответствующих представлений. \square

ТЕОРЕМА 4.4.2. В категории $A_1(A_2)$ существует произведение эффективных представлений Ω_1 -алгебры A_1 в Ω_2 -алгебре и это произведение является эффективным представлением Ω_1 -алгебры A_1 .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть

$$A_2 = \prod_{i \in I} A_{2i}$$

произведение семейства Ω_2 -алгебр $\{A_{2i}, i \in I\}$ и для любого $i \in I$ отображение

$$t_i : A_2 \longrightarrow A_{2i}$$

является проекцией на множитель i . Для каждого $i \in I$, пусть

$$h_i : A_1 \dashrightarrow A_{2i}$$

эффективное A_1 -представление в Ω_2 -алгебре A_{2i} .

Пусть $b_1 \in A_1$. Пусть $b_2 \in A_2$. Согласно утверждению 2.3.3.3, A_2 -число b_2 может быть представлено в виде кортежа A_{2i} -чисел

$$(4.4.1) \quad b_2 = (b_{2i}, i \in I) \quad b_{2i} = t_i(b_2) \in A_{2i}$$

ЛЕММА 4.4.3. Для каждого $i \in I$, рассмотрим диаграмму отображений

$$(4.4.2) \quad \begin{array}{ccc} A_2 & \xrightarrow{t_i} & A_{2i} \\ \uparrow g & & \uparrow h_i(b_1) \\ A_1 & \xrightarrow{h_i} & A_{2i} \end{array} \quad (1)$$

Пусть отображение

$$g : A_1 \rightarrow \text{End}(\Omega_2; A_2)$$

определено равенством

$$(4.4.3) \quad g(b_1)(b_2) = (h_i(b_1)(b_{2i}), i \in I)$$

Тогда отображение g является эффективным A_1 -представлением в Ω_2 -алгебре A_2

$$g : A_1 \dashrightarrow A_2$$

Отображение t_i является приведенным морфизмом представления g в представление h_i .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.

4.4.3.1: Согласно определениям 3.1.1, отображение $h_i(b_1)$ является гомоморфизмом Ω_2 -алгебры A_{2i} . Согласно теореме 2.3.6, из коммутативности диаграммы (1) для каждого $i \in I$, следует, что отображение

$$g(b_1) : A_2 \rightarrow A_2$$

определённое равенством (4.4.3) является гомоморфизмом Ω_2 -алгебры A_2 .

4.4.3.2: Согласно определению 3.1.1, множество $\text{End}(\Omega_2; A_{2i})$ является Ω_1 -алгеброй. Согласно лемме 4.3.1, множество $\text{End}(\Omega_2; A_2) \subseteq \text{End}(\Omega_2; A_2)$ является Ω_1 -алгеброй.

4.4.3.3: Согласно определению 3.1.1, отображение

$$h_i : A_1 \rightarrow \text{End}(\Omega_2, A_{2i})$$

является гомоморфизмом Ω_1 -алгебры. Согласно теореме 2.3.6, отображение

$$g : A_1 \rightarrow \text{End}(\Omega_2; A_2)$$

определённое равенством

$$g(b_1) = (h_i(b_1), i \in I)$$

является гомоморфизмом Ω_1 -алгебры.

Согласно утверждениям 4.4.3.1, 4.4.3.3 и определению 3.1.1, отображение g является A_1 -представлением в Ω_2 -алгебре A_2 .

Для любого $i \in I$, согласно определению 3.1.2, A_1 -число a_1 порождает единственное преобразование

$$(4.4.4) \quad b_{22i} = h_i(b_1)(b_{21i})$$

Пусть $b_{21}, b_{22} \in A_2$. Согласно утверждению 2.3.3.3, A_2 -числа b_{21}, b_{22} могут быть представлены в виде кортежей A_{2i} -чисел

$$(4.4.5) \quad \begin{aligned} b_{21} &= (b_{21i}, i \in I) & b_{21i} &= t_i(b_{21}) \in A_{2i} \\ b_{22} &= (b_{22i}, i \in I) & b_{22i} &= t_i(b_{22}) \in A_{2i} \end{aligned}$$

Согласно определению (4.4.3) представления g , из равенств (4.4.4), (4.4.5) следует, что A_1 -число a_1 порождает единственное преобразование

$$(4.4.6) \quad b_{22} = (h_i(b_1)(b_{21i}), i \in I) = g(b_1)(b_{21})$$

Согласно определению 3.1.2, представление g эффективно.

Из коммутативности диаграммы (1) и определения 3.2.2, следует, что отображение t_i является приведенным морфизмом представления g в представление h_i . \odot

Пусть

$$(4.4.7) \quad d_2 = g(b_1)(b_2) \quad d_2 = (d_{2i}, i \in I)$$

Из равенств (4.4.3), (4.4.7) следует, что

$$(4.4.8) \quad d_{2i} = h_i(b_1)(b_{2i})$$

Пусть R_2 - другой объект категории \mathcal{A}_2 . Пусть

$$f : A_1 \dashrightarrow R_2$$

эффективное A_1 -представление в Ω_2 -алгебре R_2 . Для любого $i \in I$, пусть существует морфизм

$$r_i : R_2 \longrightarrow A_{2i}$$

представлений из f в h_i . Согласно замечанию 3.2.7, в диаграмме отображений (4.4.9)




диаграмма (2) коммутативна. Согласно определению 2.3.1, существует единственный морфизм Ω_2 -алгебры

$$s : R_2 \longrightarrow A_2$$

такой, что коммутативна диаграмма

$$(4.4.10) \quad \begin{array}{ccc} A_2 & \xrightarrow{t_i} & A_{2i} \\ \uparrow s & & \uparrow r_i \\ R_2 & & \end{array} \quad t_i(s) = r_i$$

Пусть $a_2 \in R_2$. Пусть

$$(4.4.11) \quad b_2 = s(a_2) \in A_2$$

Из коммутативности диаграммы (4.4.10) и утверждений (4.4.11), (4.4.1) следует, что

$$(4.4.12) \quad b_{2i} = r_i(a_2)$$

Пусть

$$(4.4.13) \quad c_2 = f(a_1)(a_2)$$

Из коммутативности диаграммы (2) и равенств (4.4.8), (4.4.12), (4.4.13) следует, что


$$(4.4.14) \quad d_{2i} = r_i(c_2)$$

Из равенств (4.4.8), (4.4.14) следует, что

$$(4.4.15) \quad d_2 = s(c_2)$$

что согласуется с коммутативностью диаграммы (4.4.10).

Для каждого $i \in I$, мы объединим диаграммы отображений (4.4.2), (4.4.10), (4.4.9)



Из равенств (4.4.7), (4.4.11) и из равенств (4.4.13), (4.4.15), следует коммутативность диаграммы (3). Следовательно, отображение s является приведенным морфизмом представлений из f в g . Согласно определению 3.4.2, отображение s является гомоморфизмом Ω_2 алгебры. Согласно теореме 2.3.3 и определению 2.3.1, приведенный морфизм s определён однозначно.

Согласно определению 2.3.1, представление g и семейство морфизмов представления $(t_i, i \in I)$ является произведением в категории $A_1(A_2)$. \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.4.4. Пусть A, B_1, \dots, B_n, B - универсальные алгебры. Пусть, для любого $k, k = 1, \dots, n,$

$$f_k : A \dashrightarrow B_k$$

эффективное представление Ω_1 -алгебры A в Ω_2 -алгебре B_k . Пусть

$$f : A \dashrightarrow B$$

эффективное представление Ω_1 -алгебры A в Ω_2 -алгебре B . Отображение

$$r_2 : B_1 \times \dots \times B_n \rightarrow B$$

называется **приведенным полиморфизмом представлений** f_1, \dots, f_n в представление f , если для любого $k, k = 1, \dots, n,$ при условии, что все переменные кроме переменной $x_k \in B_k$ имеют заданное значение, отображение r_2 является приведенным морфизмом представления f_k в представление f .

Если $f_1 = \dots = f_n,$ то мы будем говорить, что отображение r_2 является приведенным полиморфизмом представления f_1 в представление f .

Если $f_1 = \dots = f_n = f,$ то мы будем говорить, что отображение r_2 является приведенным полиморфизмом представления f . \square

ТЕОРЕМА 4.4.5. Пусть отображение r_2 - приведенный полиморфизм эффективных представлений f_1, \dots, f_n в эффективное представление f .

- Для любого $k, k = 1, \dots, n,$ отображение r_2 удовлетворяет равенству

$$(4.4.16) \quad r_2(m_1, \dots, f_k(a)(m_k), \dots, m_n) = f(a)(r_2(m_1, \dots, m_n))$$

- Для любого $k, l, k = 1, \dots, n, l = 1, \dots, n$, отображение r_2 удовлетворяет равенству

$$(4.4.17) \quad \begin{aligned} & r_2(m_1, \dots, f_k(a)(m_k), \dots, m_l, \dots, m_n) \\ & = r_2(m_1, \dots, m_k, \dots, f_l(a)(m_l), \dots, m_n) \end{aligned}$$

- Пусть $\omega_2 \in \Omega_2(p)$. Для любого $k, k = 1, \dots, n$, отображение r_2 удовлетворяет равенству

$$(4.4.18) \quad \begin{aligned} & r_2(m_1, \dots, m_{k-1} \dots m_{k \cdot p} \omega_2, \dots, m_n) \\ & = r_2(m_1, \dots, m_{k-1}, \dots, m_n) \dots r_2(m_1, \dots, m_{k \cdot p}, \dots, m_n) \omega_2 \end{aligned}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Равенство (4.4.16) следует из определения 4.4.4 и равенства (3.4.4). Равенство (4.4.17) следует из равенства (4.4.16). Равенство (4.4.18) следует из утверждения, что, для любого $k, k = 1, \dots, n$, при условии, что все переменные кроме переменной $m_k \in B_k$ имеют заданное значение, отображение r_2 является гомоморфизмом Ω_2 -алгебры B_k в Ω_2 -алгебру B . \square

Мы также будем говорить, что отображение r_2 является приведенным полиморфизмом представлений в Ω_2 -алгебрах B_1, \dots, B_n в представление в Ω_2 -алгебре B .

4.5. Мультипликативная Ω -группа

Пусть отображение

$$f : A \dashrightarrow B$$

является представлением Ω_1 -алгебры A в Ω_2 алгебре B . Согласно теореме 3.5.3, множество $\text{End}(A(\Omega_2); B)$ является полугруппой. В тоже время ^{4.1}

$$(4.5.1) \quad \text{End}(A(\Omega_2); B) \subseteq \text{End}(\Omega_2; B)$$

Согласно определению 3.1.1, множество $\text{End}(\Omega_2, B)$ является Ω_2 -алгеброй. Однако из утверждения (4.5.1) не следует, что множество $\text{End}(A(\Omega_2); B)$ является Ω_2 -алгеброй.

Чтобы понять, при каких условиях множество $\text{End}(A(\Omega_2); B)$ является Ω_2 -алгеброй, мы рассмотрим связь между множеством представлений Ω_1 -алгебры A в Ω_2 -алгебре B и множеством приведенных морфизмов этих представлений.

ТЕОРЕМА 4.5.1. Пусть отображение

$$r : B \rightarrow B$$

является приведенным эндоморфизмом представления

$$f : A \dashrightarrow B$$

Ω_1 -алгебры A в Ω_2 алгебре B . Отображение

$$(4.5.2) \quad r f : a \in A \rightarrow r \circ f(a) \in \text{End}(\Omega_2; B)$$

является представлением Ω_1 -алгебры A в Ω_2 алгебре B тогда и только тогда, когда на множестве $f(A) \subseteq \text{End}(\Omega_2, B)$ произведение \circ отображений дистрибутивно слева относительно произвольной операции $\omega \in \Omega_1$

$$(4.5.3) \quad r \circ (f(a_1) \dots f(a_p) \omega) = (r \circ f(a_1)) \dots (r \circ f(a_p)) \omega$$

^{4.1} В утверждении (4.5.1), я обозначил Ω_2 категорию Ω_2 -алгебр и $A(\Omega_2)$ категорию представлений Ω_1 -алгебры A в Ω_2 -алгебре.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно определению 3.1.1, отображение $f(a)$ является эндоморфизмом Ω_2 -алгебры B . Согласно определениям 3.2.2, 3.4.2, отображение r является эндоморфизмом Ω_2 -алгебры B . Следовательно, отображение $r \circ f(a)$ является эндоморфизмом Ω_2 -алгебры B .

4.5.1.1: Согласно определению 3.1.1, отображение rf является представлением Ω_1 -алгебры A в Ω_2 алгебре B тогда и только тогда, когда отображение rf является гомоморфизмом Ω_1 -алгебры.

4.5.1.2: Утверждение 4.5.1.1 означает, что для любой операции $\omega \in \Omega_1$ верно равенство

$$(4.5.4) \quad \begin{aligned} r \circ f(a_1 \dots a_p \omega) &= (rf)(a_1 \dots a_p \omega) = ((rf)(a_1)) \dots ((rf)(a_p)) \omega \\ &= (r \circ f(a_1)) \dots (r \circ f(a_p)) \omega \end{aligned}$$

Поскольку отображение f является представлением Ω_1 -алгебры A в Ω_2 алгебре B , то, согласно определению 3.1.1, отображение f является гомоморфизмом Ω_1 -алгебры

$$(4.5.5) \quad r \circ f(a_1 \dots a_p \omega) = r \circ (f(a_1) \dots f(a_p) \omega)$$

Равенство (4.5.3) является следствием равенств (4.5.4), (4.5.5).

Теорема является следствием утверждения 4.5.1.2. \square

ТЕОРЕМА 4.5.2. Пусть отображение

$$f : A \longrightarrow B$$

является представлением Ω_1 -алгебры A в Ω_2 алгебре B . Пусть

$$(4.5.6) \quad f(A) = \text{End}(A(\Omega_2); B)$$

4.5.2.1: Произведение в полугруппе $\text{End}(A(\Omega_2); B)$ коммутативно.

4.5.2.2: Произведение \circ в полугруппе $\text{End}(A(\Omega_2); B)$ порождает произведение $*$ в Ω_1 -алгебре A таким образом, что

$$(4.5.7) \quad f(a * b) = f(a) \circ f(b)$$

4.5.2.3: Полугруппа $\text{End}(A(\Omega_2); B)$ является Ω_1 -алгеброй.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть отображение h является эндоморфизмом представления f . Согласно утверждению (4.5.6), существует $b \in A$ такое, что $h = f(b)$. Следовательно, равенство

$$(4.5.8) \quad f(a) \circ f(b) = f(b) \circ f(a)$$

является следствием равенства (3.4.4). Согласно утверждению (4.5.6), отображения $f(a)$, $f(b)$ являются эндоморфизмами представления f . Следовательно, произведение \circ в полугруппе $\text{End}(A(\Omega_2); B)$ коммутативно.

Согласно теореме 3.5.3, произведение эндоморфизмов $f(a)$, $f(b)$ представления f является эндоморфизмом h представления f . Согласно утверждению (4.5.6), существует $c \in A$ такое, что $h = f(c)$. Бинарная операция $*$ на множестве A определена равенством

$$c = a * b$$

Следовательно, утверждение 4.5.2.2 верно.

Пусть отображения h_1, \dots, h_p являются эндоморфизмами представления f . Согласно утверждению (4.5.6), существуют A -числа a_1, \dots, a_p такие, что

$$h_1 = f(a_1) \quad \dots \quad h_n = f(a_n)$$

Поскольку отображение f является представлением Ω_1 -алгебры A в Ω_2 алгебре B , то, согласно определению 3.1.1, отображение f является гомоморфизмом Ω_1 -алгебры A

$$(4.5.9) \quad h_1 \dots h_p \omega = f(a_1) \dots f(a_p) \omega = f(a_1 \dots a_p \omega)$$

Согласно утверждению (4.5.6), $h_1 \dots h_p \omega \in \text{End}(A(\Omega_2); B)$. Следовательно, утверждение 4.5.2.3 верно. \square

Согласно теореме 4.5.2, если утверждение (4.5.6) выполнено, то на множестве $\text{End}(A(\Omega_2); B)$ определены две алгебраические структуры. А именно, множество $\text{End}(A(\Omega_2); B)$ является полугруппой и в тоже время это множество является Ω_1 -алгеброй. Аналогичное утверждение верно для Ω_1 -алгебры A . Однако мы не можем утверждать, что операция произведения в Ω_1 -алгебре A дистрибутивна по отношению к произвольной операции $\omega \in \Omega_1$ (смотри теорему 4.5.1).

ТЕОРЕМА 4.5.3. Пусть отображение

$$f : A \dashrightarrow B$$

является представлением Ω_1 -алгебры A в Ω_2 алгебре B и

$$f(A) = \text{End}(A(\Omega_2); B)$$

Произведение $*$, определённое в Ω_1 -алгебре A , дистрибутивно относительно произвольной операции $\omega \in \Omega_1$ тогда и только тогда, когда отображение

$$(4.5.10) \quad f(b * a) : a \in A \rightarrow f(b * a) \in \text{End}(\Omega_2; B)$$

является представлением Ω_1 -алгебры A в Ω_2 алгебре B

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно утверждению 4.5.2.2, для нас не имеет значение рассматриваем ли мы Ω_1 -алгебру A или мы рассматриваем Ω_1 -алгебру $\text{End}(A(\Omega_2); B)$. Теорема является следствием определения (4.5.7) произведения $*$ в Ω_1 -алгебре A , а также теоремы 4.5.1 и утверждений 4.5.2.1, 4.5.2.3. \square

В теореме 4.5.3, мы встречаем универсальную алгебру, похожую на Ω -группу, однако эта алгебра отличается от Ω -группы. Поскольку эта универсальная алгебра играет важную роль в теории представлений, мы рассмотрим определения 4.5.4, 4.5.5.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.5.4. Пусть произведение

$$c_1 = a_1 * b_1$$

является операцией Ω_1 -алгебры A . Положим $\Omega = \Omega_1 \setminus \{*\}$. Если Ω_1 -алгебра A является группой относительно произведения и для любой операции $\omega \in \Omega(n)$ умножение дистрибутивно относительно операции ω

$$a * (b_1 \dots b_n \omega) = (a * b_1) \dots (a * b_n) \omega$$

$$(b_1 \dots b_n \omega) * a = (b_1 * a) \dots (b_n * a) \omega$$

то Ω_1 -алгебра A называется мультипликативной Ω -группой. \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.5.5. Если

$$(4.5.11) \quad a * b = b * a$$

то мультипликативная Ω -группа называется абелевой. \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.5.6. Если

$$(4.5.12) \quad a * (b * c) = (a * b) * c$$

то мультипликативная Ω -группа называется **ассоциативной**. \square

ТЕОРЕМА 4.5.7. Пусть A, B_1, \dots, B_n, B - универсальные алгебры. Пусть, для любого $k, k = 1, \dots, n$,

$$f_k : A \xrightarrow{*} B_k$$

представление Ω_1 -алгебры A в Ω_2 -алгебре B_k . Пусть

$$f : A \xrightarrow{*} B$$

представление Ω_1 -алгебры A в Ω_2 -алгебре B . Пусть отображение

$$r_2 : B_1 \times \dots \times B_n \rightarrow B$$

является приведенным полиморфизмом представлений f_1, \dots, f_n в представление f . Произведение \circ , определённое в Ω_1 -алгебре $f(A)$, коммутативно.

Представление

$$f : A \xrightarrow{*} B$$

допускает приведенный полиморфизм представлений тогда и только тогда, когда следующие условия выполнены

4.5.7.1: Произведение \circ , определённое в Ω_1 -алгебре $\text{End}(A(\Omega_2); B)$, дистрибутивно относительно произвольной операции $\omega \in \Omega_1$

4.5.7.2: $f(a * b) = f(a) \circ f(b)$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пользуясь равенством (4.4.16), мы можем записать выражение

$$(4.5.13) \quad r_2(m_1, \dots, f_k(a_k)(m_k), \dots, f_l(a_l)(m_l), \dots, m_n)$$

либо в виде

$$(4.5.14) \quad \begin{aligned} & r_2(m_1, \dots, f_k(a_k)(m_k), \dots, f_l(a_l)(m_l), \dots, m_n) \\ &= f(a_k)(r_2(m_1, \dots, m_k, \dots, f_l(a_l)(m_l), \dots, m_n)) \\ &= f(a_k)(f(a_l)(r_2(m_1, \dots, m_k, \dots, m_l, \dots, m_n))) \\ &= (f(a_k) \circ f(a_l))(r_2(m_1, \dots, m_k, \dots, m_l, \dots, m_n)) \end{aligned}$$

либо в виде

$$(4.5.15) \quad \begin{aligned} & r_2(m_1, \dots, f_k(a_k)(m_k), \dots, f_l(a_l)(m_l), \dots, m_n) \\ &= f(a_l)(r_2(m_1, \dots, f_k(a_k)(m_k), \dots, m_l, \dots, m_n)) \\ &= f(a_l)(f(a_k)(r_2(m_1, \dots, m_k, \dots, m_l, \dots, m_n))) \\ &= (f(a_l) \circ f(a_k))(r_2(m_1, \dots, m_k, \dots, m_l, \dots, m_n)) \end{aligned}$$

Коммутативность произведения \circ следует из равенств (4.5.14), (4.5.15). \square

ТЕОРЕМА 4.5.8. Пусть

$$f : A \xrightarrow{*} B$$

представление Ω_1 -алгебры A в Ω_2 -алгебре B и

$$(4.5.16) \quad f(A) = \text{End}(A(\Omega_2); B)$$

Тогда представление f допускает приведенный полиморфизм представлений.

Пусть $\Omega = \Omega_1 \setminus \{*\}$. Представление

$$h : A_1 \rightarrow \text{End}(\Omega; A_1) \quad h(a) : b \in A_1 \rightarrow a * b \in A_1$$

полугруппы A_1 в Ω -алгебре A_1 существует тогда и только тогда, когда для любой операции $\omega \in \Omega(n)$ умножение **дистрибутивно** относительно операции ω

$$(4.5.17) \quad a * (b_1 \dots b_n \omega) = (a * b_1) \dots (a * b_n) \omega$$

$$(4.5.18) \quad (b_1 \dots b_n \omega) * a = (b_1 * a) \dots (b_n * a) \omega$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно определению 3.1.1, равенства (4.5.17), (4.5.18) верны тогда и только тогда, когда отображение h является представлением полугруппы A_1 в Ω -алгебре A_1 . Одновременно равенства (4.5.17), (4.5.18) выражают закон дистрибутивности умножения относительно операции ω . \square

В Ω_1 -алгебре A_1 , мы определили произведение, согласованное с одностранзитивным представлением в Ω_2 -алгебре A_2 . Эту конструкцию можно построить в случае произвольного представления при условии, что произведение в Ω_1 -алгебре A_1 определено однозначно. Однако в общем случае произведение может быть некоммутативным.

ТЕОРЕМА 4.5.9. Пусть

$$A \xrightarrow{h_1} B_1 \quad A \xrightarrow{h_2} B_2 \quad A \xrightarrow{h_3} B$$

эффективные представления абелевой мультипликативной Ω_1 -группы A в Ω_2 -алгебрах B_1, B_2, B . Допустим Ω_2 -алгебра имеет 2 операции, а именно $\omega_1 \in \Omega(m), \omega_2 \in \Omega(n)$. Необходимым условием существования приведенного полиморфизма

$$R : B_1 \times B_2 \rightarrow B$$

является равенство

$$(4.5.19) \quad (a_{11} \dots a_{1n} \omega_2) \dots (a_{m1} \dots a_{mn} \omega_2) \omega_1 = (a_{11} \dots a_{m1} \omega_1) \dots (a_{1n} \dots a_{mn} \omega_1) \omega_2$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $a_1, \dots, a_p \in B_1, b_1, \dots, b_q \in B_2$. Согласно равенству (4.4.18), выражение

$$(4.5.20) \quad r_2(a_1 \dots a_p \omega_1, b_1 \dots b_q \omega_2)$$

может иметь 2 значения

$$(4.5.21) \quad \begin{aligned} & r_2(a_1 \dots a_m \omega_1, b_1 \dots b_n \omega_2) \\ &= r_2(a_1, b_1 \dots b_n \omega_2) \dots r_2(a_m, b_1 \dots b_n \omega_2) \omega_1 \\ &= (r_2(a_1, b_1) \dots r_2(a_1, b_n) \omega_2) \dots (r_2(a_m, b_1) \dots r_2(a_m, b_n) \omega_2) \omega_1 \end{aligned}$$

$$(4.5.22) \quad \begin{aligned} & r_2(a_1 \dots a_m \omega_1, b_1 \dots b_n \omega_2) \\ &= r_2(a_1 \dots a_m \omega_1, b_1) \dots r_2(a_1 \dots a_m \omega_1, b_n) \omega_2 \\ &= (r_2(a_1, b_1) \dots r_2(a_m, b_1) \omega_1) \dots (r_2(a_1, b_n) \dots r_2(a_m, b_n) \omega_1) \omega_2 \end{aligned}$$

Из равенств (4.5.21), (4.5.22) следует, что

$$(4.5.23) \quad \begin{aligned} & (r_2(a_1, b_1) \dots r_2(a_1, b_n) \omega_2) \dots (r_2(a_m, b_1) \dots r_2(a_m, b_n) \omega_2) \omega_1 \\ &= (r_2(a_1, b_1) \dots r_2(a_m, b_1) \omega_1) \dots (r_2(a_1, b_n) \dots r_2(a_m, b_n) \omega_1) \omega_2 \end{aligned}$$

Следовательно, выражение (4.5.20) определено корректно тогда и только тогда, когда равенство (4.5.23) верно. Положим

$$(4.5.24) \quad a_{i,j} = r_2(a_i, b_j) \in A$$

Равенство (4.5.19) является следствием равенств (4.5.23), (4.5.24). \square

ТЕОРЕМА 4.5.10. *Существует приведенный полиморфизм эффективного представления абелевой мультипликативной Ω -группы в абелевой группе.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Поскольку операция сложения в абелевой группе коммутативна и ассоциативна, то теорема является следствием теоремы 4.5.9. \square

ТЕОРЕМА 4.5.11. *Не существует приведенный полиморфизм эффективно представления абелевой мультипликативной Ω -группы в кольце.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В кольце определены две операции: сложение, которое коммутативно и ассоциативно, и произведение, которое дистрибутивно относительно сложения. Согласно теореме 4.5.9, если существует полиморфизм эффективно представления в кольцо, то сложение и произведение должны удовлетворять равенству

$$(4.5.25) \quad a_{11}a_{21} + a_{12}a_{22} = (a_{11} + a_{12})(a_{21} + a_{22})$$

Однако правая часть равенства (4.5.25) имеет вид

$$\begin{aligned} (a_{11} + a_{12})(a_{21} + a_{22}) &= (a_{11} + a_{12})a_{21} + (a_{11} + a_{12})a_{22} \\ &= a_{11}a_{21} + a_{12}a_{21} + a_{11}a_{22} + a_{12}a_{22} \end{aligned}$$

Следовательно, равенство (4.5.25) не верно. \square

ВОПРОС 4.5.12. *Возможно, что полиморфизм представлений существует только для эффективно представления в Абелевая группа. Однако это утверждение пока не доказано.* \square

4.6. Ω -кольцо

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.6.1. Пусть сложение

$$c_1 = a_1 + b_1$$

которое не обязательно коммутативно, и произведение

$$c_1 = a_1 * b_1$$

являются операциями Ω_1 -алгебры A . Положим $\Omega = \Omega_1 \setminus \{+, *\}$. Если Ω_1 -алгебра A является $\Omega \cup \{*\}$ -группой и мультипликативной $\Omega \cup \{+\}$ -группой, то Ω_1 -алгебра A называется Ω -кольцом. \square

ТЕОРЕМА 4.6.2. *Произведение в Ω -кольце дистрибутивно относительно сложения*

$$\begin{aligned} a * (b_1 + b_2) &= a * b_1 + a * b_2 \\ (b_1 + b_2) * a &= b_1 * a + b_2 * a \end{aligned}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Теорема является следствием определений 4.2.10, 4.5.4, 4.6.1. \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.6.3. Пусть A - Ω -кольцо. **Матрица** над Ω -кольцом A - это таблица A -чисел a_j^i , где индекс i - это номер строки и индекс j - это номер столбца. \square

СОГЛАШЕНИЕ 4.6.4. Мы будем пользоваться соглашением Эйнштейна о сумме. Это означает, что, когда индекс присутствует в выражении дважды (один вверху и один внизу) и множество индексов известно, это выражение подразумевает сумму по повторяющемуся индексу. В этом случае предполагается известным множество индекса суммирования и знак суммы опускается

$$a^i v_i = \sum_{i \in I} a^i v_i$$

Я буду явно указывать множество индексов, если это необходимо. \square

Произведение матриц связано с произведением гомоморфизмов векторных пространств над полем. Согласно традиции произведение матриц a и b определено как произведение строк матрицы a и столбцов матрицы b .

ПРИМЕР 4.6.5. Пусть \bar{e} - базис правого векторного пространства V над D -алгеброй A (смотри определение 9.6.2 и теорему 9.6.15). Мы представим базис \bar{e} как строку матрицы

$$e = (e_1 \quad \dots \quad e_n)$$

Мы можем представить координаты вектора v как вектор столбец

$$v = \begin{pmatrix} v^1 \\ \dots \\ v^n \end{pmatrix}$$

Поэтому мы можем представить вектор v как традиционное произведение матриц

$$v = (e_1 \quad \dots \quad e_n) \begin{pmatrix} v^1 \\ \dots \\ v^n \end{pmatrix} = e_i v^i$$

Линейный гомоморфизм правого векторного пространства V может быть представлен с помощью матрицы

$$(4.6.1) \quad v'^i = f_j^i v^j$$

Равенство (4.6.1) выражает традиционное произведение матриц f и v . \square

ПРИМЕР 4.6.6. Пусть \bar{e} - базис левого векторного пространства V над D -алгеброй A (смотри определение 9.5.2 и теорему 9.5.15). Мы представим базис \bar{e} как строку матрицы

$$e = (e_1 \quad \dots \quad e_n)$$

Мы можем представить координаты вектора v как вектор столбца

$$v = \begin{pmatrix} v^1 \\ \dots \\ v^n \end{pmatrix}$$

Однако мы не можем представить вектор

$$v = v^i e_i$$

как традиционное произведение матриц

$$v = \begin{pmatrix} v^1 \\ \dots \\ v^n \end{pmatrix} \quad e = (e_1 \quad \dots \quad e_n)$$

так как это произведение не определено. Линейный гомоморфизм левого векторного пространства V может быть представлен с помощью матрицы

$$(4.6.2) \quad v^i = v^j f_j^i$$

Равенство (4.6.2) не может быть выражено как традиционное произведение матриц v и f . \square

Из примеров 4.6.5, 4.6.6 следует, что мы не можем ограничиться традиционным произведением матриц и нам нужно определить два вида произведения матриц. Чтобы различать эти произведения, мы вводим новые обозначения. Для совместимости обозначений с существующими мы будем иметь в виду $*$ -произведение, когда нет явных обозначений.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.6.7. Пусть число столбцов матрицы a равно числу строк матрицы b . $*$ -произведение матриц a и b имеет вид

$$(4.6.3) \quad \begin{cases} a_* b = (a_k^i b_j^k) \\ (a_* b)_j^i = a_k^i b_j^k \end{cases}$$

и может быть выражено как произведение строк матрицы a и столбцов матрицы b .^{4.2} \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.6.8. Пусть число строк матрицы a равно числу столбцов матрицы b . $*$ -произведение матриц a и b имеет вид

$$(4.6.4) \quad \begin{cases} a^* b = (a_i^k b_k^j) \\ (a^* b)_j^i = a_i^k b_k^j \end{cases}$$

^{4.2} Мы будем пользоваться символом $*$ - в последующей терминологии и обозначениях. Мы будем читать символ $*$ как rs -произведение или произведение строки на столбец. Символ произведения строки на столбец сформирован из двух символов операции произведения, которые записываются на месте индекса суммирования. Например, если произведение A -чисел имеет вид $a \circ b$, то $*$ -произведение матриц a и b имеет вид $a \circ b$.

и может быть выражено как произведение столбцов матрицы a и строк матрицы b .^{4.3} \square

Мы так же определим следующие операции на множестве матриц.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.6.9. Транспонирование a^T матрицы a меняет местами строки и столбцы

$$(4.6.5) \quad (a^T)_j^i = a_i^j$$

\square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.6.10. Сумма матриц a и b определена равенством

$$(a + b)_j^i = a_j^i + b_j^i$$

\square

ЗАМЕЧАНИЕ 4.6.11. Мы будем пользоваться символом $*^*$ - или $*_*$ - в имени свойств каждого произведения и в обозначениях. Мы можем читать символы $*^*$ и $*_*$ как rs -произведение и sr -произведение. Это правило мы распространим на последующую терминологию. \square

ТЕОРЕМА 4.6.12.

$$(4.6.6) \quad (a *_* b)^T = a^T *_* b^T$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Цепочка равенств

$$(4.6.7) \quad ((a *_* b)^T)_i^j = (a *_* b)_j^i = a_k^i b_j^k = (a^T)_i^k (b^T)_k^j = ((a^T) *_* (b^T))_i^j$$

следует из (4.6.5), (4.6.3) и (4.6.4). Равенство (4.6.6) следует из (4.6.7). \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.6.13. Бикольцо A - это множество, на котором мы определили унарную операцию, называемую транспозицией, и три бинарных операции, называемые $*^*$ -произведение, $*_*$ -произведение и сумма, такие что

- $*^*$ -произведение и сумма определяют структуру кольца на A
- $*_*$ -произведение и сумма определяют структуру кольца на A
- оба произведения имеют общую единицу δ
- произведения удовлетворяют равенству

$$(a *_* b)^T = a^T *_* b^T$$

- транспозиция единицы есть единица

$$(4.6.8) \quad \delta^T = \delta$$

- двойная транспозиция есть исходный элемент

$$(4.6.9) \quad (a^T)^T = a$$

\square

ТЕОРЕМА 4.6.14 (принцип двойственности для бикольца). Пусть A - истинное утверждение о бикольце A . Если мы заменим одновременно

- $a \in A$ и a^T

^{4.3} Мы будем пользоваться символом $*_*$ - в последующей терминологии и обозначениях. Мы будем читать символ $*_*$ как sr -произведение или произведение столбца на строку. Символ произведение столбца на строку сформирован из двух символов операции произведения, которые записываются на месте индекса суммирования. Например, если произведение A -чисел имеет вид $a \circ b$, то $*_*$ -произведение матриц a и b имеет вид $a \circ \circ b$.

- $*$ -произведение и $*$ -произведение

то мы снова получим истинное утверждение.

ТЕОРЕМА 4.6.15 (принцип двойственности для бикольца матриц). Пусть A является бикольцом матриц. Пусть A - истинное утверждение о матрицах. Если мы заменим одновременно

- строки и столбцы всех матриц
- $*$ -произведение и $*$ -произведение

то мы снова получим истинное утверждение.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Непосредственное следствие теоремы 4.6.14. □

ЗАМЕЧАНИЕ 4.6.16. Если произведение в Ω -кольце коммутативно, то

$$(4.6.10) \quad a_*^* b = (a_i^k b_k^j) = (b_k^j a_i^k) = b^*_* a$$

Приводимое бикольцо - это бикольцо, в котором выполняется условие приводимости произведений (4.6.10). Поэтому в приводимом бикольце достаточно рассматривать только $*$ -произведение. Однако в тех случаях, когда порядок сомножителей существен, мы будем пользоваться также $*$ -произведением. □

4.7. Тензорное произведение представлений

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.7.1. Пусть A является абелевой мультипликативной Ω_1 -группой. Пусть A_1, \dots, A_n - Ω_2 -алгебры.^{4.4} Пусть для любого $k, k = 1, \dots, n$,

$$f_k : A \longrightarrow A_k$$


эффективное представление мультипликативной Ω_1 -группы A в Ω_2 -алгебре A_k . Рассмотрим категорию \mathcal{A} объектами которой являются приведенные полиморфизмы представлений f_1, \dots, f_n

$$r_1 : B_1 \times \dots \times B_n \longrightarrow S_1 \quad r_2 : B_1 \times \dots \times B_n \longrightarrow S_2$$

где S_1, S_2 - Ω_2 -алгебры и

$$g_1 : A \longrightarrow S_1 \quad g_2 : A \longrightarrow S_2$$

эффективные представления мультипликативной Ω_1 -группы A . Мы определим морфизм $r_1 \rightarrow r_2$ как приведенный морфизм представлений $h : S_1 \rightarrow S_2$, для которого коммутативна диаграмма



Универсальный объект $B_1 \otimes \dots \otimes B_n$ категории \mathcal{A} называется **тензорным произведением представлений** A_1, \dots, A_n . □

^{4.4} Я определяю тензорное произведение представлений универсальной алгебры по аналогии с определением в [2], с. 456 - 458.

ТЕОРЕМА 4.7.2. *Если тензорное произведение эффективных представлений существует, то тензорное произведение определено однозначно с точностью до изоморфизма представлений.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть A является абелевой мультипликативной Ω_1 -группой. Пусть A_1, \dots, A_n - Ω_2 -алгебры. Пусть для любого $k, k = 1, \dots, n$,

$$f_k : A \dashrightarrow B_k$$

эффективное представление мультипликативной Ω_1 -группы A в Ω_2 -алгебре B_k . Пусть эффективные представления

$$g_1 : A \dashrightarrow S_1 \quad g_2 : A \dashrightarrow S_2$$

являются тензорным произведением представлений B_1, \dots, B_n . Из коммутативности диаграммы

(4.7.1)

$$\begin{array}{ccc} & & S_1 \\ & \nearrow^{R_1} & \uparrow h_2 \\ B_1 \times \dots \times B_n & & \\ & \searrow_{R_2} & \downarrow h_1 \\ & & S_2 \end{array}$$

следует, что

$$(4.7.2) \quad \begin{aligned} R_1 &= h_2 \circ h_1 \circ R_1 \\ R_2 &= h_1 \circ h_2 \circ R_2 \end{aligned}$$

Из равенств (4.7.2) следует, что морфизмы представления $h_1 \circ h_2, h_2 \circ h_1$ являются тождественными отображениями. Следовательно, морфизмы представления h_1, h_2 являются изоморфизмами. \square

СОГЛАШЕНИЕ 4.7.3. *Алгебры S_1, S_2 могут быть различными множествами. Однако они неразличимы для нас, если мы рассматриваем их как изоморфные представления. В этом случае мы будем писать $S_1 = S_2$.* \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.7.4. *Тензорное произведение*

$$B^{\otimes n} = B_1 \otimes \dots \otimes B_n \quad B_1 = \dots = B_n = B$$

называется **тензорной степенью** представления B . \square

ТЕОРЕМА 4.7.5. *Если существует полиморфизм представлений, то тензорное произведение представлений существует.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть

$$f : A \dashrightarrow M$$

представление Ω_1 -алгебры A , порождённое декартовым произведением $B_1 \times \dots \times B_n$ множеств B_1, \dots, B_n .^{4.5} Инъекция

$$i : B_1 \times \dots \times B_n \longrightarrow M$$

определена по правилу^{4.6}

$$(4.7.3) \quad i \circ (b_1, \dots, b_n) = (b_1, \dots, b_n)$$

Пусть N - отношение эквивалентности, порождённое равенствами^{4.7}

$$(4.7.4) \quad (b_1, \dots, b_{i-1} \dots b_{i-p} \omega, \dots, b_n) = (b_1, \dots, b_{i-1}, \dots, b_n) \dots (b_1, \dots, b_{i-p}, \dots, b_n) \omega$$

$$(4.7.5) \quad (b_1, \dots, f_i(a) \circ b_i, \dots, b_n) = f(a) \circ (b_1, \dots, b_i, \dots, b_n)$$

$$b_k \in B_k \quad k = 1, \dots, n \quad b_{i-1}, \dots, b_{i-p} \in B_i \quad \omega \in \Omega_2(p) \quad a \in A$$

ЛЕММА 4.7.6. Пусть $\omega \in \Omega_2(p)$. Тогда

$$(4.7.6) \quad \begin{aligned} & f(c) \circ (b_1, \dots, b_{i-1} \dots b_{i-p} \omega, \dots, b_n) \\ &= f(c) \circ ((b_1, \dots, b_{i-1}, \dots, b_n) \dots (b_1, \dots, b_{i-p}, \dots, b_n) \omega) \end{aligned}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из равенства (4.7.5) следует

$$(4.7.7) \quad f(c) \circ (b_1, \dots, b_{i-1} \dots b_{i-p} \omega, \dots, b_n) = (b_1, \dots, f_i(c) \circ (b_{i-1} \dots b_{i-p} \omega), \dots, b_n)$$

Так как $f_i(c)$ - эндоморфизм Ω_2 -алгебры B_i , то из равенства (4.7.7) следует

$$(4.7.8) \quad f(c) \circ (b_1, \dots, b_{i-1} \dots b_{i-p} \omega, \dots, b_n) = (b_1, \dots, (f_i(c) \circ b_{i-1}) \dots (f_i(c) \circ b_{i-p}) \omega, \dots, b_n)$$

Из равенств (4.7.8), (4.7.4) следует

$$(4.7.9) \quad \begin{aligned} & f(c) \circ (b_1, \dots, b_{i-1} \dots b_{i-p} \omega, \dots, b_n) \\ &= (b_1, \dots, f_i(c) \circ b_{i-1}, \dots, b_n) \dots (b_1, \dots, f_i(c) \circ b_{i-p}, \dots, b_n) \omega \end{aligned}$$

Из равенств (4.7.9), (4.7.5) следует

$$(4.7.10) \quad \begin{aligned} & f(c) \circ (b_1, \dots, b_{i-1} \dots b_{i-p} \omega, \dots, b_n) \\ &= (f(c) \circ (b_1, \dots, b_{i-1}, \dots, b_n)) \dots (f(c) \circ (b_1, \dots, b_{i-p}, \dots, b_n)) \omega \end{aligned}$$

Так как $f(c)$ - эндоморфизм Ω_2 -алгебры B , то равенство (4.7.6) следует из равенства (4.7.10). \odot

ЛЕММА 4.7.7.

$$(4.7.11) \quad f(c) \circ (b_1, \dots, f_i(a) \circ b_i, \dots, b_n) = f(c) \circ (f(a) \circ (b_1, \dots, b_i, \dots, b_n))$$

^{4.5}Согласно теоремам 2.3.3, 4.4.2, множество, порождённое приведенным декартовым произведением представлений B_1, \dots, B_n совпадает с декартовым произведением $B_1 \times \dots \times B_n$ множеств B_1, \dots, B_n . В этом месте доказательства нас не интересует алгебраическая структура на множестве $B_1 \times \dots \times B_n$.

^{4.6}Равенство (4.7.3) утверждает, что мы отождествляем базис представления M с множеством $B_1 \times \dots \times B_n$.

^{4.7}Я рассматриваю формирование элементов представления из элементов базиса согласно теореме 6.1.4. Теорема 4.7.11 требует выполнения условий (4.7.4), (4.7.5).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из равенства (4.7.5) следует, что

$$\begin{aligned}
 (4.7.12) \quad f(c) \circ (b_1, \dots, f_i(a) \circ b_i, \dots, b_n) &= (b_1, \dots, f_i(c) \circ (f_i(a) \circ b_i), \dots, b_n) \\
 &= (b_1, \dots, (f_i(c) \circ f_i(a)) \circ b_i, \dots, b_n) \\
 &= (f(c) \circ f(a)) \circ (b_1, \dots, b_i, \dots, b_n) \\
 &= f(c) \circ (f(a) \circ (b_1, \dots, b_i, \dots, b_n))
 \end{aligned}$$

Равенство (4.7.11) следует из равенства (4.7.12). \odot

ЛЕММА 4.7.8. Для любого $c \in A$ эндоморфизм $f(c)$ Ω_2 -алгебры M согласовано с эквивалентностью N .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Утверждение леммы следует из лемм 4.7.6, 4.7.7 и определения 3.3.2. \odot

Из леммы 4.7.8 и теоремы 3.3.3 следует, что на множестве $*M/N$ определена Ω_1 -алгебра. Рассмотрим диаграмму

$$\begin{array}{ccc}
 M/N & \xrightarrow{F(a)} & M/N & j = \text{nat } N \\
 \uparrow F & \nearrow & \uparrow j & \\
 A & & & \\
 \downarrow f & \searrow & \downarrow j & \\
 M & \xrightarrow{f(a)} & M &
 \end{array}$$

Согласно лемме 4.7.8, из условия

$$j \circ b_1 = j \circ b_2$$

следует

$$j \circ (f(a) \circ b_1) = j \circ (f(a) \circ b_2)$$

Следовательно, преобразование $F(a)$ определено корректно и

$$(4.7.13) \quad F(a) \circ j = j \circ f(a)$$

Если $\omega \in \Omega_1(p)$, то мы положим

$$(F(a_1) \dots F(a_p) \omega) \circ (J \circ b) = J \circ ((f(a_1) \dots f(a_p) \omega) \circ b)$$

Следовательно, отображение F является представлением Ω_1 -алгебры A . Из (4.7.13) следует, что j является приведенным морфизмом представлений f и F .

Рассмотрим коммутативную диаграмму

$$(4.7.14) \quad \begin{array}{ccc}
 & & M/N \\
 & \nearrow g_1 & \\
 B_1 \times \dots \times B_n & \xrightarrow{i} & M \\
 & \searrow j &
 \end{array}$$

Из коммутативности диаграммы (4.7.14) и равенства (4.7.3) следует, что

$$(4.7.15) \quad g_1 \circ (b_1, \dots, b_n) = j \circ (b_1, \dots, b_n)$$

Из равенств (4.7.3), (4.7.4), (4.7.5) следует

$$(4.7.16) \quad \begin{aligned} &g_1 \circ (b_1, \dots, b_{i-1} \dots b_{i-p} \omega, \dots, b_n) \\ &= (g_1 \circ (b_1, \dots, b_{i-1}, \dots, b_n)) \dots (g_1 \circ (b_1, \dots, b_{i-p}, \dots, b_n)) \omega \end{aligned}$$

$$(4.7.17) \quad g_1 \circ (b_1, \dots, f_i(a) \circ b_i, \dots, b_n) = f(a) \circ (g_1 \circ (b_1, \dots, b_i, \dots, b_n))$$

Из равенств (4.7.16) и (4.7.17) следует, что отображение g_1 является приведенным полиморфизмом представлений f_1, \dots, f_n .

Поскольку $B_1 \times \dots \times B_n$ - базис представления M Ω_1 -алгебры A , то, согласно теореме 6.2.10, для любого представления

$$A \xrightarrow{*} V$$

и любого приведенного полиморфизма

$$g_2 : B_1 \times \dots \times B_n \longrightarrow V$$

существует единственный морфизм представлений $k : M \rightarrow V$, для которого коммутативна следующая диаграмма

$$(4.7.18) \quad \begin{array}{ccc} B_1 \times \dots \times B_n & \xrightarrow{i} & M \\ & \searrow g_2 & \downarrow k \\ & & V \end{array}$$

Так как g_2 - приведенный полиморфизм, то $\ker k \supseteq N$.

Согласно теореме 3.4.8 отображение j универсально в категории морфизмов представления f , ядро которых содержит N . Следовательно, определен морфизм представлений

$$h : M/N \rightarrow V$$

для которого коммутативна диаграмма

$$(4.7.19) \quad \begin{array}{ccc} & & M/N \\ & \nearrow j & \downarrow h \\ M & & V \\ & \searrow k & \end{array}$$

Объединяя диаграммы (4.7.14), (4.7.18), (4.7.19), получим коммутативную диаграмму

$$\begin{array}{ccccc} & & & & M/N \\ & & & \nearrow g_1 & \downarrow h \\ B_1 \times \dots \times B_n & \xrightarrow{i} & M & \xrightarrow{j} & V \\ & \searrow g_2 & \downarrow k & & \end{array}$$

Так как $\text{Im } g_1$ порождает M/N , то отображение h однозначно определено. \square

Согласно доказательству теоремы 4.7.5

$$B_1 \otimes \dots \otimes B_n = M/N$$

Для $d_i \in A_i$ будем записывать

$$(4.7.20) \quad j \circ (d_1, \dots, d_n) = d_1 \otimes \dots \otimes d_n$$

Из равенств (4.7.15), (4.7.20) следует, что

$$(4.7.21) \quad g_1 \circ (d_1, \dots, d_n) = d_1 \otimes \dots \otimes d_n$$

ТЕОРЕМА 4.7.9. *Отображение*

$$(x_1, \dots, x_n) \in B_1 \times \dots \times B_n \rightarrow x_1 \otimes \dots \otimes x_n \in B_1 \otimes \dots \otimes B_n$$

является полиморфизмом.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Теорема является следствием определений 4.4.4, 4.7.1. \square

ТЕОРЕМА 4.7.10. *Пусть B_1, \dots, B_n - Ω_2 -алгебры. Пусть*

$$f : B_1 \times \dots \times B_n \rightarrow B_1 \otimes \dots \otimes B_n$$

приведенный полиморфизм, определённый равенством

$$(4.7.22) \quad f \circ (b_1, \dots, b_n) = b_1 \otimes \dots \otimes b_n$$

Пусть

$$g : B_1 \times \dots \times B_n \rightarrow V$$

приведенный полиморфизм в Ω_2 -алгебру V . Существует морфизм представлений

$$h : B_1 \otimes \dots \otimes B_n \rightarrow V$$

такой, что диаграмма

$$\begin{array}{ccc} & & B_1 \otimes \dots \otimes B_n \\ & \nearrow f & \downarrow h \\ B_1 \times \dots \times B_n & & \\ & \searrow g & \downarrow \\ & & V \end{array}$$

коммутативна.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Равенство (4.7.22) следует из равенств (4.7.3) и (4.7.20). Существование отображения h следует из определения 4.7.1 и построений, выполненных при доказательстве теоремы 4.7.5. \square

ТЕОРЕМА 4.7.11. *Пусть*

$$b_k \in B_k \quad k = 1, \dots, n \quad b_{i_1}, \dots, b_{i_p} \in B_i \quad \omega \in \Omega_2(p) \quad a \in A$$

Тензорное произведение дистрибутивно относительно операции ω

$$(4.7.23) \quad \begin{aligned} & b_1 \otimes \dots \otimes (b_{i_1} \dots b_{i_p} \omega) \otimes \dots \otimes b_n \\ & = (b_1 \otimes \dots \otimes b_{i_1} \otimes \dots \otimes b_n) \dots (b_1 \otimes \dots \otimes b_{i_p} \otimes \dots \otimes b_n) \omega \end{aligned}$$

Представление мультипликативной Ω_1 -группы A в тензорном произведении определено равенством

$$(4.7.24) \quad b_1 \otimes \dots \otimes (f_i(a) \circ b_i) \otimes \dots \otimes b_n = f(a) \circ (b_1 \otimes \dots \otimes b_i \otimes \dots \otimes b_n)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Равенство (4.7.23) является следствием равенства (4.7.16) и определения (4.7.21). Равенство (4.7.24) является следствием равенства (4.7.17) и определения (4.7.21). \square

4.8. Ассоциативность тензорного произведения

Пусть A является мультипликативной Ω_1 -группой. Пусть B_1, B_2, B_3 - Ω_2 -алгебры. Пусть для $k = 1, 2, 3$

$$f_k : A \xrightarrow{*} B_k$$

эффективное представление мультипликативной Ω_1 -группы A в Ω_2 -алгебре B_k .

ЛЕММА 4.8.1. Для заданного значения $x_3 \in B_3$, отображение

$$(4.8.1) \quad h_{12} : (B_1 \otimes B_2) \times B_3 \rightarrow B_1 \otimes B_2 \otimes B_3$$

определённое равенством

$$(4.8.2) \quad h_{12}(x_1 \otimes x_2, x_3) = x_1 \otimes x_2 \otimes x_3$$

является приведенным морфизмом представления $B_1 \otimes B_2$ в представление $B_1 \otimes B_2 \otimes B_3$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно теореме 4.7.9, для заданного значения $x_3 \in B_3$, отображение

$$(4.8.3) \quad (x_1, x_2, x_3) \in B_1 \times B_2 \times B_3 \rightarrow x_1 \otimes x_2 \otimes x_3 \in B_1 \otimes B_2 \otimes B_3$$

является полиморфизмом по переменным $x_1 \in B_1, x_2 \in B_2$. Следовательно, для заданного значения $x_3 \in B_3$, лемма является следствием теоремы 4.7.10. \square

ЛЕММА 4.8.2. Для заданного значения $x_{12} \in B_1 \otimes B_2$ отображение h_{12} является приведенным морфизмом представления B_3 в представление $B_1 \otimes B_2 \otimes B_3$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно теореме 4.7.9 и равенству (4.7.21), для заданного значения $x_1 \in B_1, x_2 \in B_2$, отображение

$$(4.8.4) \quad (x_1 \otimes x_2, x_3) \in (B_1 \otimes B_2) \times B_3 \rightarrow x_1 \otimes x_2 \otimes x_3 \in B_1 \otimes B_2 \otimes B_3$$

является морфизмом по переменной $x_3 \in B_3$. Следовательно, теорема является следствием равенства (4.4.16) и теоремы 4.5.9. \square

ЛЕММА 4.8.3. Существует приведенный морфизм представлений

$$h : (B_1 \otimes B_2) \otimes B_3 \rightarrow B_1 \otimes B_2 \otimes B_3$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно леммам 4.8.1, 4.8.2 и определению 4.4.4, отображение h_{12} является приведенным полиморфизмом представлений. Утверждение леммы является следствием теоремы 4.7.10. \square

ЛЕММА 4.8.4. Существует приведенный морфизм представлений

$$g : B_1 \otimes B_2 \otimes B_3 \rightarrow (B_1 \otimes B_2) \otimes B_3$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Отображение

$$(x_1, x_2, x_3) \in B_1 \times B_2 \times B_3 \rightarrow (x_1 \otimes x_2) \otimes x_3 \in (B_1 \otimes B_2) \otimes B_3$$

является полиморфизмом по переменным $x_1 \in B_1, x_2 \in B_2, x_3 \in B_3$. Следовательно, лемма является следствием теоремы 4.7.10. \square

ТЕОРЕМА 4.8.5.

$$(4.8.5) \quad (A_1 \otimes A_2) \otimes A_3 = A_1 \otimes (A_2 \otimes A_3) = A_1 \otimes A_2 \otimes A_3$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно лемме 4.8.3, существует приведенный морфизм представлений

$$h : (B_1 \otimes B_2) \otimes B_3 \rightarrow B_1 \otimes B_2 \otimes B_3$$

Согласно лемме 4.8.4, существует приведенный морфизм представлений

$$g : B_1 \otimes B_2 \otimes B_3 \rightarrow (B_1 \otimes B_2) \otimes B_3$$

Следовательно, приведенные морфизмы представлений h, g являются изоморфизмами, откуда следует равенство

$$(4.8.6) \quad (B_1 \otimes B_2) \otimes B_3 = B_1 \otimes B_2 \otimes B_3$$

Аналогично мы можем доказать равенство

$$B_1 \otimes (B_2 \otimes B_3) = B_1 \otimes B_2 \otimes B_3$$

\square

ЗАМЕЧАНИЕ 4.8.6. Очевидно, что структура Ω_2 -алгебр $(B_1 \otimes B_2) \otimes B_3, B_1 \otimes B_2 \otimes B_3$ слегка различна. Мы записываем равенство (4.8.6), опираясь на соглашение 4.7.3 и это позволяет нам говорить об ассоциативности тензорного произведения представлений. \square

Представление мультипликативной Ω -группы

5.1. Представление мультипликативной Ω -группы

Согласованность произведения в мультипликативной Ω -группе G и соответствующих преобразований представления f позволяет нам рассмотреть больше деталей представления f . Однако конструкция, рассмотренная в теореме 4.5.7, не полна в случае некоммутативного произведения.

Если для заданного представления

$$g : A_1 \xrightarrow{*} A_2$$

для любых A_1 -чисел a_1, b_1 , однозначно определено A_1 -число c_1 такое, что

$$f(c_1) = f(a_1) \circ f(b_1)$$

то какой формат произведения мы должны выбрать:

$$(5.1.1) \quad c_1 = a_1 * b_1$$

или

$$(5.1.2) \quad c_1 = b_1 * a_1$$

ПРИМЕР 5.1.1. *Рассмотрим представление*

$$f : G \xrightarrow{*} A_2$$

некоммутативной группы G в Ω_2 -алгебре такое, что

$$f(g_1 g_2) = f(g_1) \circ f(g_2)$$

Из равенства

$$f(g) = f(ge) = f(g) \circ f(e)$$

следует, что отображение $f(e)$ является тождественным отображением.

Из равенства

$$f(g) \circ f(g^{-1}) = f(gg^{-1}) = f(e)$$

следует, что

$$f(g^{-1}) = (f(g))^{-1}$$

Рассмотрим отображение

$$h : g \in G \rightarrow f(g^{-1}) \in \text{End}(\Omega_2, A_2)$$

Из равенства

$$h(g_1 g_2) = f((g_1 g_2)^{-1}) = f(g_2^{-1} g_1^{-1}) = f(g_2^{-1}) \circ f(g_1^{-1}) = h(g_2) \circ h(g_1)$$

следует, что отображение h не является гомоморфизмом группы G . Однако, если мы определим произведение

$$b * a = ab$$

то отображение h становится представлением мультипликативной Ω -группы. \square

ПРИМЕР 5.1.2. Пусть V - левый модуль над кольцом D . Это значит, что определено представление

$$f : D \dashrightarrow V \quad f(d) : v \rightarrow dv$$

такое, что

$$\begin{aligned} (d_1 + d_2)v &= d_1v + d_2v \\ d(v_1 + v_2) &= dv_1 + dv_2 \\ d_1(d_2v) &= (d_1d_2)v \end{aligned}$$

Отображение

$$w : V \rightarrow D$$

называется аддитивным, если

$$w(v_1 + v_2) = w(v_1) + w(v_2)$$

Мы пользуемся записью

$$(w, v) = w(v)$$

для образа аддитивного отображения. Мы определим сумму аддитивных отображений равенством

$$(w_1 + w_2, v) = (w_1, v) + (w_2, v)$$

Нетрудно показать, что множество W аддитивных отображений является абелевой группой.

Мы определим отображение

$$h : D \dashrightarrow W \quad h(d) : w \rightarrow wd$$

равенством

$$(wd, v) = (w, dv)$$

Из равенств

$$\begin{aligned} ((w_1 + w_2)d, v) &= (w_1 + w_2, dv) = (w_1, dv) + (w_2, dv) \\ &= (w_1d, v) + (w_2d, v) \\ &= (w_1d + w_2d, v) \\ (w(d_1 + d_2), v) &= (w, (d_1 + d_2)v) = (w, d_1v + d_2v) \\ &= (w, d_1v) + (w, d_2v) = (wd_1, v) + (wd_2, v) \\ &= (wd_1 + wd_2, v) \\ (5.1.3) \quad ((wd_1)d_2, v) &= (wd_1, d_2v) = (w, d_1(d_2v)) = (w, (d_1d_2)v) \\ &= (w(d_1d_2), v) \end{aligned}$$

следует, что отображение h является представлением группы G . Однако мы можем записать равенство (5.1.3) в виде

$$((h(d_2) \circ h(d_1))(w), v) = ((h(d_2)h(d_1))(w), v) = (h(d_1d_2)(w), v)$$

откуда следует, что отображение h не является гомоморфизмом группы G . \square

Из анализа примеров 5.1.1, 5.1.2 следует, что у нас есть два выбора.

- Мы согласны, что в мультипликативной Ω -группе A_1 мы можем определить оба варианта произведения: (5.1.1) и (5.1.2) - с целью согласовать произведение в мультипликативной Ω -группе A_1 и произведение преобразований представления мультипликативной Ω -группы A_1 . Эта точка зрения принята в случае коммутативного произведения и соответствует рассмотрению ковариантного и контравариантного представлений мультипликативной Ω -группы A_1 .
- Мы предполагаем, что преобразования представления мультипликативной Ω -группы A_1 могут действовать на A_2 -числа либо слева, либо справа. В этом случае нам достаточно ограничиться произведением (5.1.1) в мультипликативной Ω -группе A_1 . Таким образом, концепция представления мультипликативной Ω -группы состоит в том, что в каком порядке мы перемножаем элементы мультипликативной Ω -группы, в том же порядке перемножаются соответствующие преобразования представления.

Вторая точка зрения проще и, как мы видели в примере 5.1.2, возникает естественным образом. В примере 5.1.2, мы также видим, что мы должны изменить формат записи, прежде чем мы можем перейти ко второй точке зрения. Вместо того, чтобы рассматривать $f \in \text{End}(\Omega_2; A_2)$, как отображение

$$f : a_2 \in A_2 \rightarrow f(a_2) \in A_2$$

мы должны рассматривать эндоморфизм f как оператор.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.1.3. Пусть $\text{End}(\Omega_2, A_2)$ - мультипликативная Ω -группа с произведением^{5.1}

$$(f, g) \rightarrow f \bullet g$$

Пусть эндоморфизм f действует на A_2 -число a слева. Мы будем пользоваться записью

$$(5.1.4) \quad f(a_2) = f \bullet a_2$$

Пусть A_1 - мультипликативная Ω -группа с произведением

$$(a, b) \rightarrow a * b$$

Мы будем называть гомоморфизм мультипликативной Ω -группы

$$(5.1.5) \quad f : A_1 \rightarrow \text{End}(\Omega_2, A_2)$$

левосторонним представлением мультипликативной Ω -группы A_1 или левосторонним A_1 -представлением в Ω_2 -алгебре A_2 , если отображение f удовлетворяет условиям

$$(5.1.6) \quad f(a_1 * b_1) \bullet a_2 = (f(a_1) \bullet f(b_1)) \bullet a_2$$

Мы будем отождествлять A_1 -число a_1 с его образом $f(a_1)$ и записывать левостороннее преобразование, порождённое A_1 -числом a_1 , в форме

$$a'_2 = f(a_1) \bullet a_2 = a_1 * a_2$$

^{5.1} Очень часто произведение в мультипликативной Ω -группе $\text{End}(\Omega_2, A_2)$ совпадает с суперпозицией эндоморфизмов

$$f \bullet g = f \circ g$$

Однако, как мы увидим в примере 5.2.5, произведение в мультипликативной Ω -группе $\text{End}(\Omega_2, A_2)$ может отличаться от суперпозиции эндоморфизмов. Согласно определению 4.6.13, мы можем рассматривать две операции произведения в универсальной алгебре A .

В этом случае равенство (5.1.6) принимает вид

$$(5.1.7) \quad f(a_1 * b_1) \bullet a_2 = (a_1 * b_1) * a_2$$

Отображение

$$(a_1, a_2) \in A_1 \times A_2 \rightarrow a_1 * a_2 \in A_2$$

порождённое левосторонним представлением f , называется **левосторонним произведением** A_2 -числа a_2 на A_1 -число a_1 . \square

Пусть

$$f : A_2 \rightarrow A_2$$

$$g : A_2 \rightarrow A_2$$

эндоморфизмы Ω_2 -алгебры A_2 . Пусть произведение в мультипликативной Ω -группе $\text{End}(\Omega_2, A_2)$ является композицией эндоморфизмов. Так как произведение отображений f и g определено в том же порядке, как эти отображения действуют на A_2 -число, то мы можем рассматривать равенство

$$(5.1.8) \quad (f \circ g) \circ a = f \circ (g \circ a)$$

как **закон ассоциативности**, который позволяет записывать равенство (5.1.8) без использования скобок

$$f \circ g \circ a = f \circ (g \circ a) = (f \circ g) \circ a$$

а также записать равенство (5.1.6) в виде

$$(5.1.9) \quad f(a_1 * b_1) \circ a_2 = f(a_1) \circ f(b_1) \circ a_2$$

Из равенства (5.1.7) следует, что

$$(5.1.10) \quad (a_1 * b_1) * a_2 = a_1 * (b_1 * a_2)$$

Мы можем рассматривать равенство (5.1.10) как **закон ассоциативности**,

ЗАМЕЧАНИЕ 5.1.4. Пусть отображение

$$f : A_1 \xrightarrow{*} A_2$$

является левосторонним представлением мультипликативной Ω -группы A_1 в Ω_2 -алгебре A_2 . Пусть отображение

$$g : B_1 \xrightarrow{*} B_2$$

является левосторонним представлением мультипликативной Ω -группы B_1 в Ω_2 -алгебре B_2 . Пусть отображение

$$(r_1 : A_1 \rightarrow B_1, r_2 : A_2 \rightarrow B_2)$$

является морфизмом представлений. Мы будем пользоваться записью

$$r_2(a_2) = r_2 \circ a_2$$

для образа A_2 -числа a_2 при отображении r_2 . Тогда мы можем записать равенство (3.2.3) следующим образом

$$r_2 \circ (a_1 * a_2) = r_1(a_1) * (r_2 \circ a_2)$$

\square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.1.5. Пусть $\text{End}(\Omega_2, A_2)$ - мультипликативная Ω -группа с произведением^{5.2}

$$(f, g) \rightarrow f \bullet g$$

Пусть эндоморфизм f действует на A_2 -число a справа. Мы будем пользоваться записью

$$(5.1.11) \quad f(a_2) = a_2 \bullet f$$

Пусть A_1 - мультипликативная Ω -группа с произведением

$$(a, b) \rightarrow a * b$$

Мы будем называть гомоморфизм мультипликативной Ω -группы

$$(5.1.12) \quad f : A_1 \rightarrow \text{End}(\Omega_2, A_2)$$

правосторонним представлением мультипликативной Ω -группы A_1 или **правосторонним A_1 -представлением** в Ω_2 -алгебре A_2 , если отображение f удовлетворяет условиям

$$(5.1.13) \quad a_2 \bullet f(a_1 * b_1) = a_2 \bullet (f(a_1) \bullet f(b_1))$$

Мы будем отождествлять A_1 -число a_1 с его образом $f(a_1)$ и записывать правостороннее преобразование, порождённое A_1 -числом a_1 , в форме

$$a'_2 = a_2 \bullet f(a_1) = a_2 * a_1$$

В этом случае равенство (5.1.13) принимает вид

$$(5.1.14) \quad a_2 \bullet f(a_1 * b_1) = a_2 * (a_1 * b_1)$$

Отображение

$$(a_1, a_2) \in A_1 \times A_2 \rightarrow a_2 * a_1 \in A_2$$

порождённое правосторонним представлением f , называется **правосторонним произведением** A_2 -числа a_2 на A_1 -число a_1 . \square

Пусть

$$f : A_2 \rightarrow A_2$$

$$g : A_2 \rightarrow A_2$$

эндоморфизмы Ω_2 -алгебры A_2 . Пусть произведение в мультипликативной Ω -группе $\text{End}(\Omega_2, A_2)$ является композицией эндоморфизмов. Так как произведение отображений f и g определено в том же порядке, как эти отображения действуют на A_2 -число, то мы можем рассматривать равенство

$$(5.1.15) \quad a \circ (g \circ f) = (a \circ g) \circ f$$

как **закон ассоциативности**, который позволяет записывать равенство (5.1.15) без использования скобок

$$a \circ g \circ f = (a \circ g) \circ f = a \circ (g \circ f)$$

^{5.2} Очень часто произведение в мультипликативной Ω -группе $\text{End}(\Omega_2, A_2)$ совпадает с суперпозицией эндоморфизмов

$$f \bullet g = f \circ g$$

Однако, как мы увидим в примере 5.2.5, произведение в мультипликативной Ω -группе $\text{End}(\Omega_2, A_2)$ может отличаться от суперпозиции эндоморфизмов. Согласно определению 4.6.13, мы можем рассматривать две операции произведения в универсальной алгебре A .

а также записать равенство (5.1.13) в виде

$$(5.1.16) \quad a_2 \circ f(a_1 * b_1) = a_2 \circ f(a_1) \circ f(b_1)$$

Из равенства (5.1.14) следует, что

$$(5.1.17) \quad a_2 * (a_1 * b_1) = (a_2 * a_1) * b_1$$

Мы можем рассматривать равенство (5.1.17) как закон ассоциативности,

ЗАМЕЧАНИЕ 5.1.6. Пусть отображение

$$f : A_1 \xrightarrow{*} A_2$$

является правосторонним представлением мультипликативной Ω -группы A_1 в Ω_2 -алгебре A_2 . Пусть отображение

$$g : B_1 \xrightarrow{*} B_2$$

является правосторонним представлением мультипликативной Ω -группы B_1 в Ω_2 -алгебре B_2 . Пусть отображение

$$(r_1 : A_1 \rightarrow B_1, r_2 : A_2 \rightarrow B_2)$$

является морфизмом представлений. Мы будем пользоваться записью

$$r_2(a_2) = r_2 \circ a_2$$

для образа A_2 -числа a_2 при отображении r_2 . Тогда мы можем записать равенство (3.2.3) следующим образом

$$r_2 \circ (a_2 * a_1) = (r_2 \circ a_2) * r_1(a_1)$$

□

Если мультипликативная Ω -группа A_1 - абелевая, то нет разницы между левосторонним и правосторонним представлениями.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.1.7. Пусть A_1 - абелевая мультипликативная Ω -группа. Мы будем называть гомоморфизм мультипликативной Ω -группы

$$(5.1.18) \quad f : A_1 \rightarrow \text{End}(\Omega_2, A_2)$$

представлением мультипликативной Ω -группы A_1 или A_1 -представлением в Ω_2 -алгебре A_2 , если отображение f удовлетворяет условиям

$$(5.1.19) \quad f(a_1 * b_1) \bullet a_2 = (f(a_1) \bullet f(b_1)) \bullet a_2$$

□

Обычно мы отождествляем представление абелевой мультипликативной Ω -группы A_1 и левостороннее представление мультипликативной Ω -группы A_1 . Однако, если это необходимо нам, мы можем отождествить представление абелевой мультипликативной Ω -группы A_1 и правостороннее представление мультипликативной Ω -группы A_1 .

Из анализа примеров 5.1.1, 5.1.2 следует, что выбор между левосторонним и правосторонним представлением зависит от рассматриваемой модели. Так как левостороннее представление и правостороннее представление опирается на гомоморфизм Ω -группы, то верно следующее утверждение.

ТЕОРЕМА 5.1.8 (принцип двойственности для представления мультипликативной Ω -группы). *Любое утверждение, справедливое для левостороннего представления мультипликативной Ω -группы A_1 , будет справедливо для правостороннего представления мультипликативной Ω -группы A_1 , если мы будем пользоваться правосторонним произведением на A_1 -число a_1 вместо левостороннего произведения на A_1 -число a_1 .* \square

ЗАМЕЧАНИЕ 5.1.9. *Если Ω_1 -алгебра не является мультипликативной Ω -группой, то мы не можем сказать, действует ли представление слева или справа. В этом случае мы сохраним функциональную запись $f(a_1)(a_2)$ для представления Ω_1 -алгебры.* \square

5.2. Левый и правый сдвиги

ТЕОРЕМА 5.2.1. *Произведение*

$$(a, b) \rightarrow a * b$$

в мультипликативной Ω -группе A определяет два различных представления.

- **Левый сдвиг**

$$a' = L(b) \circ a = b * a$$

является левосторонним представлением мультипликативной Ω -группы A в Ω -алгебре A

$$(5.2.1) \quad L(c * b) = L(c) \circ L(b)$$

- **Правый сдвиг**

$$a' = a \circ R(b) = a * b$$

является правосторонним представлением мультипликативной Ω -группы A в Ω -алгебре A

$$(5.2.2) \quad R(b * c) = R(b) \circ R(c)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно определению 4.5.4, левый и правый сдвиги являются эндоморфизмами Ω -алгебры A . Согласно определению 4.5.4, мы можем определить Ω -алгебру на множестве левых сдвигов. Согласно определению мультипликативной группы, ^{5.3} равенство $a_1 = a_2$ является следствием равенства

$$L(a_1) \circ x = a_1 * x = a_2 * x = L(a_2) \circ x$$

для любого x . В частности, равенство (5.2.1) является следствием равенства

$$L(c * b) \circ a = (c * b) * a = c * (b * a) = L(c) \circ (L(b) \circ a) = L(c) \circ L(b) \circ a$$

Следовательно, отображение

$$a \in A \rightarrow L(a)$$

является левосторонним представлением мультипликативной Ω -группы A в Ω -алгебре A . Аналогичное рассуждение верно для правого сдвига. \square

Ассоциативная D -алгебра является мультипликативной Ω -группой. Неассоциативная D -алгебра A не является Ω -группой, так как относительно произведения A является группоидом. Однако нас также будет интересовать представление неассоциативной D -алгебры.

^{5.3} Смотри, например, определение на страницах [2]-17, [2]-21.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.2.2. Пусть произведение

$$c_1 = a_1 * b_1$$

является операцией Ω_1 -алгебры A . Положим $\Omega = \Omega_1 \setminus \{*\}$. Если Ω_1 -алгебра A является группоидом относительно произведения и для любой операции $\omega \in \Omega(n)$ умножение дистрибутивно относительно операция ω

$$a * (b_1 \dots b_n \omega) = (a * b_1) \dots (a * b_n) \omega$$

$$(b_1 \dots b_n \omega) * a = (b_1 * a) \dots (b_n * a) \omega$$

то Ω_1 -алгебра A называется Ω -группоидом. \square

Мы будем пользоваться тем же форматом записи для представления Ω -группоида, что мы пользуемся для представления мультипликативной Ω -группы.

ТЕОРЕМА 5.2.3. Произведение в неассоциативном Ω -группоиде A определяет два различных представления.

- Левый сдвиг

$$a' = L(b) \circ a = b * a$$

является представлением Ω -алгебры A в Ω -алгебре A .

- Правый сдвиг

$$a' = a \circ R(b) = a * b$$

является представлением Ω -алгебры A в Ω -алгебре A .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно определению 4.5.4, левый и правый сдвиги являются эндоморфизмами Ω -алгебры A . Согласно определению 5.2.2, мы можем определить Ω -алгебру на множестве левых сдвигов. Следовательно, отображение

$$a \in A \rightarrow L(a)$$

является представлением Ω -алгебры A в Ω -алгебре A . \square

ТЕОРЕМА 5.2.4. Пусть

$$L : A \dashrightarrow A$$

представление неассоциативного Ω -группоида A в Ω -алгебре A . Тогда на множестве $\text{End}(\Omega, A)$ определена операция произведения, отличная от суперпозиции эндоморфизмов.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Рассмотрим отображение

$$L : A \rightarrow \text{End}(\Omega, A) \quad L(a) : b \rightarrow ab$$

Поскольку произведение в Ω -группоиде A не ассоциативно, то, вообще говоря,

$$L(a) \circ (L(b) \circ c) = a * (b * c) \neq (a * b) * c = L(a * b) \circ c$$

Следовательно, $L(ab) \neq L(a) \circ L(b)$. \square

Согласно теореме 5.2.1, если A - мультипликативная Ω -группа, то равенство (5.2.1) гарантирует, что левый сдвиг порождает левосторонним представлением мультипликативной Ω -группы A в Ω -алгебре A . Согласно теореме 5.2.4 это равенство не верно в неассоциативном Ω -группоиде A . Однако теоремы 5.2.3, 5.2.4 не отвечают на вопрос о возможности рассмотрения левостороннего представления неассоциативного Ω -группоида A в Ω -алгебре A . Согласно

примеру 5.2.5, существует возможность подобного представления, даже если произведение в Ω -группоиде неассоциативно.

ПРИМЕР 5.2.5. Пусть A - алгебре Ли. Произведение^{5.4} $[a, b]$ A -чисел a, b удовлетворяет равенству

$$(5.2.3) \quad [a, b] = -[b, a]$$

а также тождеству Ли

$$(5.2.4) \quad [c, [b, a]] + [b, [a, c]] + [a, [c, b]] = 0$$

Левый сдвиг на алгебре Ли A определён равенством

$$(5.2.5) \quad L(b) \circ a = [b, a]$$

Из равенства (5.2.5) следует, что

$$(5.2.6) \quad L(c) \circ L(b) \circ a = L(c) \circ (L(b) \circ a) = [c, [b, a]]$$

Равенство

$$(5.2.7) \quad \begin{aligned} L(c) \circ L(b) \circ a - L(b) \circ L(c) \circ a &= [c, [b, a]] - [b, [c, a]] \\ &= [c, [b, a]] + [b, [a, c]] \end{aligned}$$

является следствием равенств (5.2.3), (5.2.6). Равенство

$$(5.2.8) \quad [c, [b, a]] + [b, [a, c]] = -[a, [c, b]] = [[c, b], a]$$

является следствием равенств (5.2.3), (5.2.4). Равенство

$$(5.2.9) \quad L(c) \circ L(b) \circ a - L(b) \circ L(c) \circ a = L([c, b]) \circ a$$

является следствием равенств (5.2.5), (5.2.7), (5.2.8).

Если я определяю произведение Ли

$$[L(c), L(b)] \circ a = L(c) \circ L(b) \circ a - L(b) \circ L(c) \circ a$$

на множестве левых сдвигов, то равенство (5.2.9) принимает вид

$$(5.2.10) \quad [L(c), L(b)] \circ a = L([c, b]) \circ a$$

Следовательно, алгебра Ли A с произведением $[a, b]$ порождает представление в векторном пространстве A . \square

5.3. Орбита представления мультипликативной Ω -группы

ТЕОРЕМА 5.3.1. Пусть отображение

$$f : A_1 \xrightarrow{*} A_2$$

является левосторонним представлением мультипликативной Ω_1 -группы A_1 и e - единица мультипликативной Ω_1 -группы A_1 . Тогда

$$f(e) = \delta$$

где δ - тождественное преобразование Ω_2 -алгебры A_2 .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Теорема является следствием равенства

$$f(a) = f(a * e) = f(a) \circ f(e)$$

для любого A_1 -числа. \square

^{5.4} Смотри определение [17]-1 на странице 9.

ТЕОРЕМА 5.3.2. Пусть отображение

$$g : A_1 \xrightarrow{*} A_2$$

является левосторонним представлением мультипликативной Ω -группы A_1 . Для любого $g \in A_1$ преобразование $f(g)$ имеет обратное отображение и удовлетворяет равенству

$$(5.3.1) \quad f(g^{-1}) = f(g)^{-1}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть e - единица мультипликативной Ω -группы A_1 и δ - тождественное преобразование множества A_2 . На основании (5.1.6) и теоремы 5.3.1 мы можем записать

$$u = \delta \circ u = f(gg^{-1}) \circ u = f(g) \circ f(g^{-1}) \circ u$$

Это завершает доказательство. \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.3.3. Пусть A_1 является Ω -группоидом с произведением

$$(a, b) \rightarrow a * b$$

Пусть отображение

$$f : A_1 \xrightarrow{*} A_2$$

является левосторонним представлением Ω -группоида A_1 в Ω_2 -алгебре A_2 . Для любого $a_2 \in A_2$, мы определим **орбиту представления** Ω -группоида A_1 как множество

$$A_1 * a_2 = \{b_2 = a_1 * a_2 : a_1 \in A_1\}$$

\square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.3.4. Пусть A_1 является Ω -группоидом с произведением

$$(a, b) \rightarrow a * b$$

Пусть отображение

$$f : A_1 \xrightarrow{*} A_2$$

является правосторонним представлением Ω -группоида A_1 в Ω_2 -алгебре A_2 . Для любого $a_2 \in A_2$, мы определим **орбиту представления** Ω -группоида A_1 как множество

$$a_2 * A_1 = \{b_2 = a_2 * a_1 : a_1 \in A_1\}$$

\square

ТЕОРЕМА 5.3.5. Пусть отображение

$$f : A_1 \xrightarrow{*} A_2$$

является левосторонним представлением мультипликативной Ω -группы A_1 . Then $a_2 \in A_1 * a_2$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно теореме 5.3.1

$$a_2 = e * a_2 = f(e) \circ a_2$$

\square

ТЕОРЕМА 5.3.6. Пусть

$$L : A \xrightarrow{*} A$$

представление алгебры Ли, порождённое множеством левых сдвигов. Тогда $a \notin [A, a]$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Теорема является следствием отсутствия единицы в алгебре Ли. Кроме того, самый простой пример алгебры Ли - это множество векторов трёх мерного пространства на котором определена операция векторного произведения. Очевидно, что не существует вектора b такого, что

$$a = b \times a$$

□

ТЕОРЕМА 5.3.7. Пусть отображение

$$f : A_1 \xrightarrow{*} A_2$$

является левосторонним представлением мультипликативной Ω -группы A_1 . Если

$$(5.3.2) \quad b_2 \in A_1 * a_2$$

то

$$(5.3.3) \quad A_1 * a_2 = A_1 * b_2$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из (5.3.2) следует существование $a_1 \in A_1$ такого, что

$$(5.3.4) \quad b_2 = a_1 * a_2$$

Если $c_2 \in A_1 * b_2$, то существует $b_1 \in A_1$ такой, что

$$(5.3.5) \quad c_2 = b_1 * b_2$$

Подставив (5.3.4) в (5.3.5), мы получим

$$(5.3.6) \quad c_2 = b_1 * a_1 * a_2$$

На основании (5.1.6) из (5.3.6) следует, что $c_2 \in A_1 * a_2$. Таким образом,

$$(5.3.7) \quad A_1 * b_2 \subseteq A_1 * a_2$$

На основании (5.3.1) из (5.3.4) следует, что

$$(5.3.8) \quad a_2 = a_1^{-1} * b_2$$

Равенство (5.3.8) означает, что $a_2 \in A_1 * b_2$ и, следовательно,

$$(5.3.9) \quad A_1 * a_2 \subseteq A_1 * b_2$$

Равенство (5.3.3) является следствием утверждений (5.3.7), (5.3.9). □

Таким образом, левостороннее представление мультипликативной Ω -группы A_1 в Ω_2 -алгебре A_2 порождает отношение эквивалентности S и орбита $A_1 * a_2$ является классом эквивалентности. Мы будем пользоваться обозначением A_2/A_1 для фактор множества A_2/S и мы будем называть это множество **пространством орбит левостороннего представления f** .

5.4. Представление в Ω -группе

ТЕОРЕМА 5.4.1. Мы будем называть ядром неэффективности левостороннего представления мультипликативной Ω -группы A_1 в Ω_2 -алгебре A_2 множество

$$K_f = \{a_1 \in A_1 : f(a_1) = \delta\}$$

Ядро неэффективности левостороннего представления - это подгруппа мультипликативной группы A_1 .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Допустим $f(a_1) = \delta$ и $f(a_2) = \delta$. Тогда

$$f(a_1 * a_2) = f(a_1) \bullet f(a_2) = \delta$$

$$f(a_1^{-1}) = (f(a_1))^{-1} = \delta$$

□

ТЕОРЕМА 5.4.2. Левостороннее представление мультипликативной Ω -группы A_1 в Ω_2 -алгебре A_2 **эффективно** тогда и только тогда, когда ядро неэффективности $K_f = \{e\}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Утверждение является следствием определения 3.1.2 и теоремы 5.4.1. □

ТЕОРЕМА 5.4.3. Если представление

$$f : A_1 \xrightarrow{*} A_2$$

мультипликативной Ω -группы A_1 в Ω_2 -алгебре A_2 не эффективно, мы можем перейти к эффективному заменив мультипликативную Ω -группу A_1 мультипликативной Ω -группой $A'_1 = A_1/K_f$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть операция $\omega \in \Omega(n)$. Чтобы доказать теорему, мы должны показать, что равенство

$$(5.4.1) \quad f(a_1 \dots a_n \omega) = f(b_1 \dots b_n \omega)$$

является следствием утверждения $f(a_1) = f(b_1), \dots, f(a_n) = f(b_n)$. Действительно, равенство (5.4.1) является следствием равенства

$$f(a_1 \dots a_n \omega) = f(a_1) \dots f(a_n) \omega = f(b_1) \dots f(b_n) \omega = f(b_1 \dots b_n \omega)$$

□

Теорема 5.4.3 означает, что мы можем изучать только эффективное действие.

5.5. Однотранзитивное правостороннее представление группы

ТЕОРЕМА 5.5.1. Пусть отображение

$$g : A_1 \xrightarrow{*} A_2$$

является левосторонним представлением мультипликативной Ω -группы A_1 в Ω_2 -алгебре A_2 . **Малая группа** или **группа стабилизации** элемента $a_2 \in A_2$ - это множество

$$A_{1a_2} = \{a_1 \in A_1 : a_1 * a_2 = a_2\}$$

Представление f **свободно** тогда и только тогда, когда для любого $a_2 \in A_2$ группа стабилизации $A_{1a_2} = \{e\}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно определению 3.1.4, представление f свободно тогда и только тогда, когда равенство $a_1 = b_1$ является следствием утверждения

$$(5.5.1) \quad f(a_1) = f(b_1)$$

Равенство (5.5.1) эквивалентно равенству

$$(5.5.2) \quad f(b_1^{-1} * a_1) = \delta$$

Равенство $a_1 = b_1$ является следствием утверждения (5.5.2) тогда и только тогда, когда для любого $a_2 \in A_2$ группа стабилизации $A_{1a_2} = \{e\}$. \square

ТЕОРЕМА 5.5.2. Пусть отображение

$$f : A_1 \dashrightarrow A_2$$

является свободным левосторонним представлением мультипликативной Ω -группы A_1 в Ω_2 -алгебре A_2 . Существует взаимно однозначное соответствие между любыми двумя орбитами представления, а также между орбитой представления и мультипликативной Ω -группой A_1 .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Допустим для точки $a_2 \in A_2$ существуют $a_1, b_1 \in A_1$

$$(5.5.3) \quad a_1 * a_2 = b_1 * a_2$$

Умножим обе части равенства (5.5.3) на a_1^{-1}

$$a_2 = a_1^{-1} * b_1 * a_2$$

Поскольку представление свободное, $a_1 = b_1$. Теорема доказана, так как мы установили взаимно однозначное соответствие между орбитой и мультипликативной Ω -группой A_1 . \square

ТЕОРЕМА 5.5.3. Левостороннее представление

$$g : A_1 \dashrightarrow A_2$$

мультипликативной Ω -группы A_1 в Ω_2 -алгебре A_2 **однотранзитивно** тогда и только тогда, когда для любых $a_2, b_2 \in A_2$ существует одно и только одно $a_1 \in A_1$ такое, что $a_2 = a_1 * b_2$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Следствие определений 3.1.2 и 3.1.8. \square

ТЕОРЕМА 5.5.4. Если существует однотранзитивное представление

$$f : A_1 \dashrightarrow A_2$$

мультипликативной Ω -группы A_1 в Ω_2 -алгебре A_2 , то мы можем однозначно определить координаты на A_2 , пользуясь A_1 -числами.

Если f - левостороннее однотранзитивное представление, то $f(a)$ эквивалентно левому сдвигу $L(a)$ на группе A_1 . Если f - правостороннее однотранзитивное представление, то $f(a)$ эквивалентно правому сдвигу $R(a)$ на группе A_1 .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть f - левостороннее представление. Мы выберем A_2 -число a_2 и определим координаты A_2 -числа b_2 как A_1 -число a_1 такое, что

$$b_2 = a_1 * a_2 = (a_1 * e) * a_2 = (L(a_1) \circ e) * a_2$$

Координаты, определённые таким образом, однозначны с точностью до выбора A_2 -числа a_2 , так как действие эффективно. Для левостороннего однотранзитивного представления мы будем также пользоваться записью

$$f(a_1) \bullet a_2 = L(a_1) \circ a_2 = (L(a_1) \circ e) * a_2$$

Мы пользуемся записью $L(a_1) \circ a_2$ для левостороннего однотранзитивного представления f так как, согласно теореме 5.2.1, произведение левых сдвигов совпадает с их композицией.

Пусть f - правостороннее однотранзитивное представление. Мы выберем A_2 -число a_2 и определим координаты A_2 -числа b_2 как A_1 -число a_1 такое, что

$$b_2 = a_2 * a_1 = a_2 * (e * a_1) = a_2 * (e \circ R(a_1))$$

Координаты, определённые таким образом, однозначны с точностью до выбора A_2 -числа a_2 , так как действие эффективно. Для правостороннего однотранзитивного представления мы будем также пользоваться записью

$$a_2 \bullet f(a_1) = a_2 \circ R(a_1) = a_2 * (e \circ R(a_1))$$

Мы пользуемся записью $a_2 \circ R(a_1)$ для правостороннего однотранзитивного представления f так как, согласно теореме 5.2.1, произведение правых сдвигов совпадает с их композицией. \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.5.5. Мы будем называть Ω_2 -алгебру A_2 **однородным пространством** мультипликативной Ω -группы A_1 , если существует однотранзитивное левостороннее представление

$$f : A_1 \xrightarrow{*} A_2$$

\square

ТЕОРЕМА 5.5.6. Свободное левостороннее представление мультипликативной Ω -группы A_1 в Ω_2 -алгебре A_2 однотранзитивно на орбите.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Следствие теоремы 5.5.2. \square

ТЕОРЕМА 5.5.7. Правый и левый сдвиги на мультипликативной Ω -группе A_1 перестановочны.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Теорема является следствием ассоциативности произведения в мультипликативной Ω -группе A_1

$$(L(a) \circ c) \circ R(b) = (a * c) * b = a * (c * b) = L(a) \circ (c \circ R(b))$$

\square

Теорема 5.5.7 может быть сформулирована следующим образом.

ТЕОРЕМА 5.5.8. Пусть A_1 - мультипликативная Ω -группа. Для любого $a_1 \in A_1$ отображение $L(a_1)$ является автоморфизмом представления R .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно теореме 5.5.7

$$(5.5.4) \quad L(a_1) \circ R(b_1) = R(b_1) \circ L(a_1)$$

Равенство (5.5.4) совпадает с равенством (3.2.2) из определения 3.2.2 при условии $r_1 = id$, $r_2 = L(a_1)$. \square

ТЕОРЕМА 5.5.9. Пусть левостороннее A_1 -представление f на Ω_2 -алгебре A_2 однотранзитивно. Тогда мы можем однозначно определить однотранзитивное правостороннее A_1 -представление h на Ω_2 -алгебре A_2 такое, что диаграмма

$$\begin{array}{ccc} A_2 & \xrightarrow{h(a_1)} & A_2 \\ \downarrow f(b_1) & & \downarrow f(b_1) \\ A_2 & \xrightarrow{h(a_1)} & A_2 \end{array}$$

коммукативна для любых $a_1, b_1 \in A_1$.^{5.5}

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Мы будем пользоваться групповыми координатами для A_2 -чисел a_2 . Тогда согласно теореме 5.5.4 мы можем записать левый сдвиг $L(a_1)$ вместо преобразования $f(a_1)$.

Пусть $a_2, b_2 \in A_2$. Тогда мы можем найти одно и только одно $a_1 \in A_1$ такое, что

$$b_2 = a_2 * a_1 = a_2 \circ R(a_1)$$

Мы предположим

$$h(a) = R(a)$$

Существует $b_1 \in A_1$ такое, что

$$c_2 = f(b_1) \bullet a_2 = L(b_1) \circ a_2 \quad d_2 = f(b_1) \bullet b_2 = L(b_1) \circ b_2$$

Согласно теореме 5.5.7 диаграмма

$$(5.5.5) \quad \begin{array}{ccc} a_2 & \xrightarrow{h(a_1)=R(a_1)} & b_2 \\ \downarrow f(b_1)=L(b_1) & & \downarrow f(b_1)=L(b_1) \\ c_2 & \xrightarrow{h(a_1)=R(a_1)} & d_2 \end{array}$$

коммукативна.

Изменяя b_1 мы получим, что c_2 - это произвольное A_2 -число.

Мы видим из диаграммы, что, если $a_2 = b_2$, то $c_2 = d_2$ и следовательно $h(e) = \delta$. С другой стороны, если $a_2 \neq b_2$, то $c_2 \neq d_2$ потому, что левостороннее A_1 -представление f однотранзитивно. Следовательно правостороннее A_1 -представление h эффективно.

Таким же образом мы можем показать, что для данного c_2 мы можем найти a_1 такое, что $d_2 = c_2 \bullet h(a_1)$. Следовательно правостороннее A_1 -представление h однотранзитивно.

В общем случае, произведение преобразований левостороннего A_1 -представления f не коммукативно и следовательно правосторонним A_1 -представление h отлично от левостороннего A_1 -представления f . Таким же образом мы можем создать левостороннее A_1 -представление f , пользуясь правосторонним A_1 -представлением h . \square

Мы будем называть представления f и h **парными представлениями** мультипликативной Ω -группы A_1 .

^{5.5}Этот утверждение можно также найти в [4].

ЗАМЕЧАНИЕ 5.5.10. Очевидно, что преобразования $L(a)$ и $R(a)$ отличаются, если мультипликативная Ω -группа A_1 неабелева. Тем не менее, они являются отображениями на. Теорема 5.5.9 утверждает, что, если оба представления правого и левого сдвига существуют на множестве A_2 , то мы можем определить два перестановочных представления на множестве A_2 . Только правый или левый сдвиг не может представлять оба типа представления. Чтобы понять почему это так, мы можем изменить диаграмму (5.5.5) и предположить

$$h(a_1) \bullet a_2 = L(a_1) \circ a_2 = b_2$$

вместо

$$a_2 \bullet h(a_1) = a_2 \circ R(a_1) = b_2$$

и проанализировать, какое выражение $h(a_1)$ имеет в точке c_2 . Диаграмма

$$\begin{array}{ccc} a_2 & \xrightarrow{h(a_1)=L(a_1)} & b_2 \\ \downarrow f(b_1)=L(b_1) & & \downarrow f(b_1)=L(b_1) \\ c_2 & \xrightarrow{h(a_1)} & d_2 \end{array}$$

эквивалентна диаграмме

$$\begin{array}{ccc} a_2 & \xrightarrow{h(a_1)=L(a_1)} & b_2 \\ \uparrow (f(b_1))^{-1}=L(b_1^{-1}) & & \downarrow f(b_1)=L(b_1) \\ c_2 & \xrightarrow{h(a_1)} & d_2 \end{array}$$

и мы имеем $d_2 = b_1 b_2 = b_1 a_1 a_2 = b_1 a_1 b_1^{-1} c_2$. Следовательно

$$h(a_1) \bullet c_2 = (b_1 a_1 b_1^{-1}) c_2$$

Мы видим, что представление h зависит от его аргумента. \square

ТЕОРЕМА 5.5.11. Пусть f и h - парные представления мультипликативной Ω -группы A_1 . Для любого $a_1 \in A_1$ отображение $h(a_1)$ является автоморфизмом представления f .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Следствие теорем 5.5.8 и 5.5.9. \square

ВОПРОС 5.5.12. Существует ли морфизм представлений из L в L , отличный от автоморфизма $R(a_1)$? Если мы положим

$$\begin{aligned} r_1(a_1) &= c_1 a_1 c_1^{-1} \\ r_2(a_1) \circ a_2 &= c_1 a_2 a_1 c_1^{-1} \end{aligned}$$

то нетрудно убедиться, что отображение $(r_1 \ r_2(a_1))$ является морфизмом представлений из L в L . Но это отображение не является автоморфизмом представления L , так как $r_1 \neq \text{id}$. \square

Базис представления универсальной алгебры

6.1. Множество образующих представления

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.1.1. Пусть

$$f : A_1 \dashrightarrow A_2$$

представление Ω_1 -алгебры A_1 в Ω_2 -алгебре A_2 . Множество $B_2 \subset A_2$ называется **стабильным множеством представления** f , если $f(a)(t) \in B_2$ для любых $a \in A_1$, $t \in B_2$. \square

Мы также будем говорить, что множество A_2 стабильно относительно представления f .

ТЕОРЕМА 6.1.2. Пусть

$$f : A_1 \dashrightarrow A_2$$

представление Ω_1 -алгебры A_1 в Ω_2 -алгебре A_2 . Пусть множество $B_2 \subset A_2$ является подалгеброй Ω_2 -алгебры A_2 и стабильным множеством представления f . Тогда существует представление

$$f_{B_2} : A_1 \dashrightarrow B_2$$

такое, что $f_{B_2}(a) = f(a)|_{B_2}$. Представление f_{B_2} называется **подпредставлением** представления f .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть ω_1 - n -арная операция Ω_1 -алгебры A_1 . Тогда для любых $a_1, \dots, a_n \in A_1$ и любого $b \in B_2$

$$\begin{aligned} (f_{B_2}(a_1) \dots f_{B_2}(a_n) \omega_1)(b) &= (f(a_1) \dots f(a_n) \omega_1)(b) = f(a_1 \dots a_n \omega_1)(b) \\ &= f_{B_2}(a_1 \dots a_n \omega_1)(b) \end{aligned}$$

Пусть ω_2 - n -арная операция Ω_2 -алгебры A_2 . Тогда для любых $b_1, \dots, b_n \in B_2$ и любого $a \in A_1$

$$\begin{aligned} f_{B_2}(a)(b_1) \dots f_{B_2}(a)(b_n) \omega_2 &= f(a)(b_1) \dots f(a)(b_n) \omega_2 = f(a)(b_1 \dots b_n \omega_2) \\ &= f_{B_2}(a)(b_1 \dots b_n \omega_2) \end{aligned}$$

Утверждение теоремы доказано. \square

Из теоремы 6.1.2 следует, что если f_{B_2} - подпредставление представления f , то отображение

$$(\text{id} : A \rightarrow A, \text{id}_{B_2} : B_2 \rightarrow A_2)$$

является морфизмом представлений.

ТЕОРЕМА 6.1.3. Множество^{6.1} \mathcal{B}_f всех подпредставлений представления f порождает систему замыканий на Ω_2 -алгебре A_2 и, следовательно, является полной структурой.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $(K_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ - семейство подалгебр Ω_2 -алгебры A_2 , стабильных относительно представления f . Операцию пересечения на множестве \mathcal{B}_f мы определим согласно правилу

$$\bigcap f_{K_\lambda} = f_{\cap K_\lambda}$$

Операция пересечения подпредставлений определена корректно. $\cap K_\lambda$ - подалгебра Ω_2 -алгебры A_2 . Пусть $m \in \cap K_\lambda$. Для любого $\lambda \in \Lambda$ и для любого $a \in A_1$, $f(a)(m) \in K_\lambda$. Следовательно, $f(a)(m) \in \cap K_\lambda$. Следовательно, $\cap K_\lambda$ - стабильное множество представления f . \square

Обозначим соответствующий оператор замыкания через $J[f]$. Таким образом, $J[f, X]$ является пересечением всех подалгебр Ω_2 -алгебры A_2 , содержащих X и стабильных относительно представления f .

ТЕОРЕМА 6.1.4. Пусть^{6.2}

$$g : A_1 \xrightarrow{*} A_2$$

представление Ω_1 -алгебры A_1 в Ω_2 -алгебре A_2 . Пусть $X \subset A_2$. Определим подмножество $X_k \subset A_2$ индукцией по k .

$$6.1.4.1: X_0 = X$$

$$6.1.4.2: x \in X_k \Rightarrow x \in X_{k+1}$$

$$6.1.4.3: x_1 \in X_k, \dots, x_n \in X_k, \omega \in \Omega_2(n) \Rightarrow x_1 \dots x_n \omega \in X_{k+1}$$

$$6.1.4.4: x \in X_k, a \in A \Rightarrow f(a)(x) \in X_{k+1}$$

Тогда

$$(6.1.1) \quad \bigcup_{k=0}^{\infty} X_k = J[f, X]$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Если положим $U = \cup X_k$, то по определению X_k имеем $X_0 \subset J[f, X]$, и если $X_k \subset J[f, X]$, то $X_{k+1} \subset J[f, X]$. По индукции следует, что $X_k \subset J[f, X]$ для всех k . Следовательно,

$$(6.1.2) \quad U \subset J[f, X]$$

Если $a \in U^n$, $a = (a_1, \dots, a_n)$, где $a_i \in X_{k_i}$, и если $k = \max\{k_1, \dots, k_n\}$, то $a_1 \dots a_n \omega \in X_{k+1} \subset U$. Следовательно, U является подалгеброй Ω_2 -алгебры A_2 .

Если $m \in U$, то $m \in X_k$ для некоторого k . Следовательно, $f(a)(m) \in X_{k+1} \subset U$ для любого $a \in A_1$. Следовательно, U - стабильное множество представления f .

Так как U - подалгебра Ω_2 -алгебры A_2 и стабильное множество представления f , то определено подпредставление f_U . Следовательно,

$$(6.1.3) \quad J[f, X] \subset U$$

^{6.1} Это определение аналогично определению структуры подалгебр ([14], стр. 93, 94). Вообще говоря, в этой и последующих теоремах этой главы необходимо рассмотреть структуру универсальных алгебр A_1 и A_2 . Так как основная задача этой главы - это изучение структуры представления, я сознательно упростил теоремы, чтобы детали не заслоняли основные утверждения. Более подробно эта тема будет раскрыта в главе 8, где теоремы будут сформулированы в общем виде.

^{6.2} Утверждение теоремы аналогично утверждению теоремы 5.1, [14], страница 94.

Из (6.1.2), (6.1.3), следует $J[f, X] = U$. \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.1.5. $J[f, X]$ называется **подпредставлением**, порождённым множеством X , а X - множеством образующих подпредставления $J[f, X]$. В частности, **множеством образующих** представления f будет такое подмножество $X \subset A_2$, что $J[f, X] = A_2$. \square

Следующее определение является следствием теоремы 6.1.4.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.1.6. Пусть $X \subset A_2$. Для любого $t \in J[f, X]$ существует Ω_2 -слово $w[f, X, t]$, определённое согласно следующему правилу.

6.1.6.1: Если $t \in X$, то t - Ω_2 -слово.

6.1.6.2: Если t_1, \dots, t_n - Ω_2 -слова и $\omega \in \Omega_2(n)$, то $t_1 \dots t_n \omega$ - Ω_2 -слово.

6.1.6.3: Если t - Ω_2 -слово и $a \in A_1$, то $f(a)(t)$ - Ω_2 -слово.

Мы будем отождествлять элемент $t \in J[f, X]$ и соответствующее ему Ω_2 -слово, выражая это равенством

$$t = w[f, X, t]$$

Аналогично, для произвольного множества $B \subset J[f, X]$ рассмотрим множество Ω_2 -слов^{6.3}

$$w[f, X, B] = \{w[f, X, t] : t \in B\}$$

Мы будем также пользоваться записью

$$w[f, X, B] = (w[f, X, t], t \in B)$$

Обозначим $w[f, X]$ множество Ω_2 -слов представления $J[f, X]$. \square

ТЕОРЕМА 6.1.7. $w[f, X, X] = X$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Теорема является следствием утверждения 6.1.6.1. \square

ТЕОРЕМА 6.1.8. Пусть X, Y - множества образующих представления

$$f : A_1 \xrightarrow{*} A_2$$

Пусть $w[f, X, t]$ - Ω_2 -слово A_2 -числа t относительно множества образующих X . Пусть $w[f, Y, X]$ - множество Ω_2 -слов множества X относительно множества образующих Y . Если в слове $w[f, X, t]$ вместо каждого $x \in X$ подставить его образ $w[f, Y, x]$, то мы получим Ω_2 -слово $w[f, Y, t]$ A_2 -числа t относительно множества образующих Y .

Преобразование Ω_2 -слов

$$w[f, X, t] \rightarrow w[f, Y, t]$$

$$w[f, Y, t] = w[f, Y, X] \circ w[f, X, t]$$

называется **суперпозицией координат**.

^{6.3}Выражение $w[f, X, t]$ является частным случаем выражения $w[f, X, B]$, а именно

$$w[f, X, \{t\}] = \{w[f, X, t]\}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Мы будем доказывать теорему индукцией по сложности Ω_2 -слова.

Если $m \in X$, то $w[f, X, m] = m$. Если вместо m подставить его образ $w[f, Y, m]$, то мы получим Ω_2 -слово $w[f, Y, m]$ A_2 -числа m относительно множества образующих Y .

Пусть Ω_2 -слово $w[f, X, m]$ A_2 -числа m имеет вид

$$(6.1.4) \quad w[f, X, m] = w[f, X, m_1] \dots w[f, X, m_n] \omega$$

где $\omega \in \Omega_2(n)$ и для каждого A_2 -числа m_i мы определили отображение

$$w[f, X, m_i] \rightarrow w[f, Y, m_i]$$

Согласно утверждению 6.1.6.2 выражение

$$w[f, Y, m_1] \dots w[f, Y, m_n] \omega$$

является Ω_2 -словом $w[f, Y, m]$ A_2 -числа m относительно множества образующих Y . Следовательно, мы определили отображение

$$w[f, X, m] \rightarrow w[f, Y, m]$$

для A_2 -числа m .

Пусть Ω_2 -слово $w[f, X, m]$ A_2 -числа m имеет вид

$$(6.1.5) \quad w[f, X, m] = f(a)(w[f, X, m_1])$$

где для A_2 -числа m_1 мы определили отображение

$$w[f, X, m_1] \rightarrow w[f, Y, m_1]$$

Согласно утверждению 6.1.6.3 выражение

$$f(a)(w[f, Y, m_1])$$

является Ω_2 -словом $w[f, Y, m]$ A_2 -числа m относительно множества образующих Y . Следовательно, мы определили отображение

$$w[f, X, m] \rightarrow w[f, Y, m]$$

для A_2 -числа m . □

Выбор Ω_2 -слова относительно множества образующих X неоднозначен. Поэтому, если Ω_2 -число имеет различные Ω_2 -слова, то мы, чтобы их отличать, будем пользоваться индексами: $w[f, X, m]$, $w_1[f, X, m]$, $w_2[f, X, m]$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.1.9. Множество образующих X представления f порождает отношение эквивалентности

$$\rho[f, X] = \{(w[f, X, m], w_1[f, X, m]) : m \in A_2\}$$

на множестве Ω_2 -слов. □

Согласно определению 6.1.9, два Ω_2 -слова относительно множества образующих X представления f эквивалентны тогда и только тогда, когда они соответствуют одному и тому же A_2 -числу. Когда мы будем записывать равенство двух Ω_2 -слов относительно множества образующих X представления f , мы будем иметь в виду, что это равенство верно с точностью до отношения эквивалентности $\rho[f, X]$.

ТЕОРЕМА 6.1.10. Пусть

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

представление Ω_1 -алгебры A_1 в Ω_2 -алгебре A_2 . Пусть

$$g : A_1 \longrightarrow B_2$$

представление Ω_1 -алгебры A_1 в Ω_2 -алгебре B_2 . Пусть X - множество образующих представления f . Пусть

$$R : A_2 \rightarrow B_2$$

приведенный морфизм представления^{6.4} и $X' = R(X)$. Приведенный морфизм R представления порождает отображение Ω_2 -слов

$$w[f \rightarrow g, X, R] : w[f, X] \rightarrow w[g, X']$$

такое, что

6.1.10.1: Если $m \in X$, $m' = R(m)$, то

$$w[f \rightarrow g, X, R](m) = m'$$

6.1.10.2: Если

$$m_1, \dots, m_n \in w[f, X]$$

$$m'_1 = w[f \rightarrow g, X, R](m_1) \quad \dots \quad m'_n = w[f \rightarrow g, X, R](m_n)$$

то для операции $\omega \in \Omega_2(n)$ справедливо

$$w[f \rightarrow g, X, R](m_1 \dots m_n \omega) = m'_1 \dots m'_n \omega$$

6.1.10.3: Если

$$m \in w[f, X] \quad m' = w[f \rightarrow g, X, R](m) \quad a \in A_1$$

то

$$w[f \rightarrow g, X, R](f(a)(m)) = g(a)(m')$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Утверждения 6.1.10.1, 6.1.10.2 справедливы в силу определения приведенного морфизма R . Утверждение 6.1.10.3 является следствием равенства (3.4.5). \square

ЗАМЕЧАНИЕ 6.1.11. Пусть

$$R : A_2 \rightarrow B_2$$

приведенный морфизм представления. Пусть

$$m \in J[f, X] \quad m' = R(m) \quad X' = R(X)$$

Теорема 6.1.10 утверждает, что $m' \in J[g, X']$. Теорема 6.1.10 также утверждает, что Ω_2 -слово, представляющее m , относительно X и Ω_2 -слово, представляющее m' , относительно X' формируются согласно одному и тому же

^{6.4} Я рассмотрел морфизм представления в теореме 8.1.7.

алгоритму. Это позволяет рассматривать множество Ω_2 -слов $w[g, X', m']$ как отображение

$$(6.1.6) \quad W[f, X, m] : (g, X') \rightarrow (g, X') \circ W[f, X, m] = w[g, X', m']$$

где

$$X' = R(X) \quad m' = R(m)$$

для некоторого приведенного морфизма R .

Если $f = g$, то вместо отображения (6.1.6) мы будем рассматривать отображение

$$W[f, X, m] : X' \rightarrow X' \circ W[f, X, m] = w[f, X', m']$$

такое, что, если для некоторого эндоморфизма R

$$X' = R(X) \quad m' = R(m)$$

то

$$W[f, X, m](X') = X' \circ W[f, X, m] = w[f, X', m'] = m'$$

Отображение $W[f, X, m]$ называется **координатами A_2 -числа m относительно множества X** . Аналогично, мы можем рассмотреть координаты множества $B \subset J[f, X]$ относительно множества X

$$W[f, X, B] = \{W[f, X, m] : m \in B\} = (W[f, X, m], m \in B)$$

Обозначим

$$W[f, X] = \{W[f, X, m] : m \in J[f, X]\} = (W[f, X, m], m \in J[f, X])$$

множество координат представления $J[f, X]$. □

ТЕОРЕМА 6.1.12. На множестве координат $W[f, X]$ определена структура Ω_2 -алгебры.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\omega \in \Omega_2(n)$. Тогда для любых $m_1, \dots, m_n \in J[f, X]$ положим

$$(6.1.7) \quad W[f, X, m_1] \dots W[f, X, m_n] \omega = W[f, X, m_1 \dots m_n \omega]$$

Согласно замечанию 6.1.11, из равенства (6.1.7) следует

$$(6.1.8) \quad \begin{aligned} X \circ (W[f, X, m_1] \dots W[f, X, m_n] \omega) &= X \circ W[f, X, m_1 \dots m_n \omega] \\ &= w[f, X, m_1 \dots m_n \omega] \end{aligned}$$

Согласно правилу 6.1.6.2, из равенства (6.1.8) следует

$$(6.1.9) \quad \begin{aligned} &X \circ (W[f, X, m_1] \dots W[f, X, m_n] \omega) \\ &= w[f, X, m_1] \dots w[f, X, m_n] \omega \\ &= (X \circ W[f, X, m_1]) \dots (X \circ W[f, X, m_n]) \omega \end{aligned}$$

Из равенства (6.1.9) следует корректность определения (6.1.7) операции ω на множестве координат. □

ТЕОРЕМА 6.1.13. Определено представление Ω_1 -алгебры A_1 в Ω_2 -алгебре $W[f, X]$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $a \in A_1$. Тогда для любого $m \in J[f, X]$ положим

$$(6.1.10) \quad f(a)(W[f, X, m]) = W[f, X, f(a)(m)]$$

Согласно замечанию 6.1.11, из равенства (6.1.10) следует

$$(6.1.11) \quad X \circ (f(a)(W[f, X, m])) = X \circ W[f, X, f(a)(m)] = w[f, X, f(a)(m)]$$

Согласно правилу 6.1.6.3, из равенства (6.1.11) следует

$$(6.1.12) \quad X \circ (f(a)(W[f, X, m])) = f(a)(w[f, X, m]) = f(a)(X \circ W[f, X, m])$$

Из равенства (6.1.12) следует корректность определения (6.1.10) представления Ω_1 -алгебры A_1 в Ω_2 -алгебре $W[f, X]$. \square

ТЕОРЕМА 6.1.14. Пусть

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

представление Ω_1 -алгебры A_1 в Ω_2 -алгебре A_2 . Пусть

$$g : A_1 \longrightarrow B_2$$

представление Ω_1 -алгебры A_1 в Ω_2 -алгебре B_2 . Для заданных множеств $X \subset A_2$, $X' \subset B_2$, пусть отображение

$$R_1 : X \rightarrow X'$$

согласовано со структурой представления f , т. е.

$$\begin{aligned} \omega \in \Omega_2(n) \ x_1, \dots, x_n, \ x_1 \dots x_n \omega \in X, \ R_1(x_1 \dots x_n \omega) \in X' \\ \Rightarrow R_1(x_1 \dots x_n \omega) = R_1(x_1) \dots R_1(x_n) \omega \\ x \in X, \ a \in A, \ R_1(f(a)(x)) \in X' \\ \Rightarrow R_1(f(a)(x)) = g(a)(R_1(x)) \end{aligned}$$

Рассмотрим отображение Ω_2 -слов

$$w[f \rightarrow g, X, X', R_1] : w[f, X] \rightarrow w[g, X']$$

удовлетворяющее условиям 6.1.10.1, 6.1.10.2, 6.1.10.3, и такое, что

$$x \in X \Rightarrow w[f \rightarrow g, X, X', R_1](x) = R_1(x)$$

Существует единственное отображение

$$R : A_2 \rightarrow B_2$$

определённое правилом

$$R(m) = w[f \rightarrow g, X, X', R_1](w[f, X, m])$$

которое является приведенным морфизмом представлений $J[f, X]$ и $J[g, X']$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Мы будем доказывать теорему индукцией по сложности Ω_2 -слова.

Если $w[f, X, m] = m$, то $m \in X$. Согласно условию 6.1.10.1,

$$R(m) = w[f \rightarrow g, X, X', R_1](w[f, X, m]) = w[f, X, R_1](m) = R_1(m)$$

Следовательно, на множестве X отображения R и R_1 совпадают, и отображение R согласовано со структурой представления f .

Пусть $\omega \in \Omega_2(n)$. Пусть отображение R определено для $m_1, \dots, m_n \in J[f, X]$. Пусть

$$w_1 = w[f, X, m_1] \quad \dots \quad w_n = w[f, X, m_n]$$

если $m = m_1 \dots m_n \omega$, то согласно правилу 6.1.6.2,

$$w[f, X, m] = w_1 \dots w_n \omega$$

Согласно условию 6.1.10.2,

$$\begin{aligned} R(m) &= w[f \rightarrow g, X, X', R_1](w[f, X, m]) = w[f \rightarrow g, X, X', R_1](w_1 \dots w_n \omega) \\ &= w[f \rightarrow g, X, X', R_1](w_1) \dots w[f \rightarrow g, X, X', R_1](w_n) \omega \\ &= R(m_1) \dots R(m_n) \omega \end{aligned}$$

Следовательно, отображение R является эндоморфизмом Ω_2 -алгебры A_2 .

Пусть отображение R определено для $m_1 \in J[f, X]$, $w_1 = w[f, X, m_1]$. Пусть $a \in A_1$. Если $m = f(a)(m_1)$, то согласно правилу 6.1.6.3,

$$w[f, X, f(a)(m_1)] = f(a)(w_1)$$

Согласно условию 6.1.10.3,

$$\begin{aligned} R(m) &= w[f \rightarrow g, X, X', R_1](w[f, X, m]) = w[f \rightarrow g, X, X', R_1](f(a)(w_1)) \\ &= f(a)(w[f \rightarrow g, X, X', R_1](w_1)) = f(a)(R(m_1)) \end{aligned}$$

Из равенства (3.2.3) следует, что отображение R является морфизмом представления f .

Единственность эндоморфизма R , а следовательно, корректность его определения, следует из следующего рассуждения. Допустим, $m \in A_2$ имеет различные Ω_2 -слова относительно множества X , например

$$(6.1.13) \quad m = x_1 \dots x_n \omega = f(a)(x)$$

Так как R - эндоморфизм представления, то из равенства (6.1.13) следует

$$(6.1.14) \quad R(m) = R(x_1 \dots x_n \omega) = R(x_1) \dots R(x_n) \omega = R(f(a)(x)) = f(a)(R(x))$$

Из равенства (6.1.14) следует

$$(6.1.15) \quad R(m) = R(x_1) \dots R(x_n) \omega = f(a)(R(x))$$

Из равенств (6.1.13), (6.1.15) следует, что равенство (6.1.13) сохраняется при отображении. Следовательно, образ A_2 не зависит от выбора координат. \square

ЗАМЕЧАНИЕ 6.1.15. Теорема 6.1.14 - это теорема о продолжении отображения. Единственное, что нам известно о множестве X - это то, что X - множество образующих представления f . Однако, между элементами множества X могут существовать соотношения, порождённые либо операциями Ω_2 -алгебры A_2 , либо преобразованиями представления f . Поэтому произвольное отображение множества X , вообще говоря, не может быть продолжено до приведенного морфизма представления f .^{6.5} Однако, если отображение R_1 согласованно со структурой представления на множестве X , то мы можем построить продолжение этого отображения, которое является приведенным морфизмом представления f . \square

^{6.5}В теореме 6.2.10, требования к множеству образующих более жёсткие. Поэтому теорема 6.2.10 говорит о продолжении произвольного отображения. Более подробный анализ дан в замечании 6.2.12.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.1.16. Пусть X - множество образующих представления

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

Ω_1 -алгебры A_1 в Ω_2 -алгебре A_2 . Пусть Y - множество образующих представления

$$g : A_1 \longrightarrow B_2$$

Ω_1 -алгебры A_1 в Ω_2 -алгебре B_2 . Пусть

$$R : A_2 \rightarrow B_2$$

приведенный морфизм представления f . Множество координат $W[g, Y, R(X)]$ называется **координатами приведенного морфизма представления**. \square

Из определений 6.1.6, 6.1.16 следует, что

$$W[g, Y, R(X)] = (W[g, Y, R(x)], x \in X)$$

Пусть $m \in A_2$. Если в слове $w[f, X, m]$ вместо каждого $x \in X$ подставить его образ $w[g, Y, R(x)]$, то, согласно теореме 6.1.14, мы получим Ω_2 -слово $w[g, Y, R(m)]$. Из этого утверждения следует определение 6.1.17.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.1.17. Пусть X - множество образующих представления

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

Ω_1 -алгебры A_1 в Ω_2 -алгебре A_2 . Пусть Y - множество образующих представления

$$g : A_1 \longrightarrow B_2$$

Ω_1 -алгебры A_1 в Ω_2 -алгебре B_2 . Пусть R

$$R : A_2 \rightarrow B_2$$

приведенный морфизм представления f . Пусть $m \in A_2$. Мы определим **суперпозицию координат** приведенного морфизма R представления f и A_2 -числа m как координаты, определённые согласно правилу

$$(6.1.16) \quad W[g, Y, R(X)] \circ W[f, X, m] = W[g, Y, R(m)]$$

Мы определим суперпозицию координат приведенного морфизма R представления f и множества $B \subseteq A_2$ согласно правилу

$$(6.1.17) \quad W[g, Y, R(X)] \circ W[f, X, B] = (W[g, Y, R(X)] \circ W[f, X, m], m \in B)$$

$$W[g, Y, R(X)] \circ w[f, X, B] = w[g, Y, R(X)] \circ W[f, X, B] = w[g, Y, R(B)]$$

\square

ТЕОРЕМА 6.1.18. Пусть X - множество образующих представления

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

Ω_1 -алгебры A_1 в Ω_2 -алгебре A_2 . Пусть Y - множество образующих представления

$$g : A_1 \longrightarrow B_2$$

Ω_1 -алгебры A_1 в Ω_2 -алгебре B_2 . Приведенный морфизм представления

$$R : A_2 \rightarrow B_2$$

порождает отображение координат представления

$$(6.1.18) \quad W[f \rightarrow g, X, Y, R] : W[f, X] \rightarrow W[g, Y]$$

такое, что

$$(6.1.19) \quad W[f, X, m] \rightarrow W[f \rightarrow g, X, Y, R] \circ W[f, X, m] = W[g, Y, R(m)]$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно замечанию 6.1.11, мы можем рассматривать равенства (6.1.16), (6.1.18) относительно заданных множеств образующих X , Y . При этом координатам $W[f, X, m]$ соответствует слово

$$(6.1.20) \quad X \circ W[f, X, m] = w[f, X, m]$$

а координатам $W[g, Y, R(m)]$ соответствует слово

$$(6.1.21) \quad Y \circ W[g, Y, R(m)] = w[g, Y, R(m)]$$

Поэтому для того, чтобы доказать теорему, нам достаточно показать, что отображению $W[f, X, R]$ соответствует отображение $w[f, X, R]$. Мы будем доказывать это утверждение индукцией по сложности Ω_2 -слова.

Если $m \in X$, $m' = R(m)$, то, согласно равенствам (6.1.20), (6.1.21), отображения $W[f, X, R]$ и $w[f, X, R]$ согласованы.

Пусть для $m_1, \dots, m_n \in X$ отображения $W[f, X, R]$ и $w[f, X, R]$ согласованы. Пусть $\omega \in \Omega_2(n)$. Согласно теореме 6.1.12

$$(6.1.22) \quad W[f, X, m_1 \dots m_n \omega] = W[f, X, m_1] \dots W[f, X, m_n] \omega$$

Так как R - эндоморфизм Ω_2 -алгебры A_2 , то из равенства (6.1.22) следует

$$(6.1.23) \quad \begin{aligned} W[f, X, R \circ (m_1 \dots m_n \omega)] &= W[f, X, (R \circ m_1) \dots (R \circ m_n) \omega] \\ &= W[f, X, R \circ m_1] \dots W[f, X, R \circ m_n] \omega \end{aligned}$$

Из равенств (6.1.22), (6.1.23) и предположения индукции следует, что отображения $W[f, X, R]$ и $w[f, X, R]$ согласованы для $t = m_1 \dots m_n \omega$.

Пусть для $m_1 \in A_2$ отображения $W[f, X, R]$ и $w[f, X, R]$ согласованы. Пусть $a \in A_1$. Согласно теореме 6.1.13

$$(6.1.24) \quad W[f, X, f(a)(m_1)] = f(a)(W[f, X, m_1])$$

Так как R - эндоморфизм представления f , то из равенства (6.1.24) следует

$$(6.1.25) \quad W[f, X, R \circ f(a)(m_1)] = W[f, X, f(a)(R \circ m_1)] = f(a)(W[f, X, R \circ m_1])$$

Из равенств (6.1.24), (6.1.25) и предположения индукции следует, что отображения $W[f, X, R]$ и $w[f, X, R]$ согласованы для $t = f(a)(m_1)$. \square

СЛЕДСТВИЕ 6.1.19. Пусть X - множество образующих представления f . Пусть R - эндоморфизм представления f . Отображение $W[f, X, R]$ является эндоморфизмом представления Ω_1 -алгебры A_1 в Ω_2 -алгебре $W[f, X]$. \square

В дальнейшем мы будем отождествлять отображение $W[f, X, R]$ и множество координат $W[f, X, R \circ X]$.

ТЕОРЕМА 6.1.20. Пусть X - множество образующих представления f . Пусть R - эндоморфизм представления f . Пусть $Y \subset A_2$. Тогда

$$(6.1.26) \quad W[f, X, R(X)] \circ W[f, X, Y] = W[f, X, R(Y)]$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Равенство (6.1.26) является следствием равенства

$$R \circ Y = (R \circ m, m \in Y)$$

а также равенств (6.1.16), (6.1.17). \square

ТЕОРЕМА 6.1.21. Пусть X - множество образующих представления f . Пусть R, S - эндоморфизмы представления f . Тогда

$$(6.1.27) \quad W[f, X, R] \circ W[f, X, S] = W[f, X, R \circ S]$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Равенство (6.1.27) следует из равенства (6.1.26), если положить $Y = S \circ X$. \square

Концепция суперпозиции координат очень проста и напоминает своеобразную машину Тьюринга. Если элемент $m \in A_2$ имеет вид

$$m = m_1 \dots m_n \omega$$

или

$$m = f(a)(m_1)$$

то мы ищем координаты элементов m_i , для того чтобы подставить их в соответствующее выражение. Как только элемент $m \in A_2$ принадлежит множеству образующих Ω_2 -алгебры A_2 , мы выбираем координаты соответствующего элемента из второго множителя. Поэтому мы требуем, чтобы второй множитель в суперпозиции был множеством координат образа множества образующих X .

Следующие формы записи образа множества Y при эндоморфизме R эквивалентны.

$$(6.1.28) \quad R \circ Y = (R(X)) \circ W[f, X, Y] = (X \circ W[f, X, R]) \circ W[f, X, Y]$$

Из равенств (6.1.26), (6.1.28) следует, что

$$(6.1.29) \quad X \circ (W[f, X, R] \circ W[f, X, Y]) = (X \circ W[f, X, R]) \circ W[f, X, Y]$$

Равенство (6.1.29) является законом ассоциативности для операции композиции и позволяет записать выражение

$$X \circ W[f, X, R] \circ W[f, X, Y]$$

без использования скобок.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.1.22. Пусть $X \subset A_2$ - множество образующих представления

$$f : A_1 \xrightarrow{*} A_2$$

Пусть отображение

$$H : A_2 \rightarrow A_2$$

является эндоморфизмом представления f . Пусть множество $X' = H \circ X$ является образом множества X при отображении H . Эндоморфизм H представления f называется невырожденным на множестве образующих X , если множество X' является множеством образующих представления f . В противном случае, эндоморфизм H представления f называется вырожденным на множестве образующих X . \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.1.23. Эндоморфизм представления f называется **невырожденным**, если он невырожден на любом множестве образующих. В противном случае, эндоморфизм H представления f называется **вырожденным**. \square

ТЕОРЕМА 6.1.24. Автоморфизм R представления

$$f : A_1 \xrightarrow{*} A_2$$

является невырожденным эндоморфизмом.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть X - множество образующих представления f . Пусть $X' = R(X)$.

Согласно теореме 6.1.10 эндоморфизм R порождает отображение Ω_2 -слов $w[f \rightarrow g, X, R]$.

Пусть $m' \in A_2$. Так как R - автоморфизм, то существует $m \in A_2$, $R \circ m = m'$. Согласно определению 6.1.6, $w[f, X, m]$ - Ω_2 -слово, представляющее A_2 относительно множества образующих X . Согласно теореме 6.1.10, $w[f, X', m']$ - Ω_2 -слово, представляющее m' относительно множества образующих X'

$$w[f, X', m'] = w[f \rightarrow g, X, R](w[f, X, m])$$

Следовательно, X' - множество образующих представления f . Согласно определению 6.1.23, автоморфизм R - невырожден. \square

6.2. Базис представления

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.2.1. Пусть

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

представление Ω_1 -алгебры A_1 в Ω_2 -алгебре A_2 и

$$\text{Gen}[f] = \{X \subseteq A_2 : J[f, X] = A_2\}$$

Если для множества $X \subseteq A_2$ верно $X \in \text{Gen}[f]$, то для любого множества Y , $X \subseteq Y \subseteq A_2$, также верно $Y \in \text{Gen}[f]$. Если существует минимальное множество $X \in \text{Gen}[f]$, то множество X называется **квазибазисом представления** f . \square

ТЕОРЕМА 6.2.2. Если множество X является квазибазисом представления f , то для любого $t \in X$ множество $X \setminus \{t\}$ не является множеством образующих представления f .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть X - квазибазис представления f . Допустим для некоторого $t \in X$ существует Ω_2 -слово

$$w = w[f, X \setminus \{t\}, t]$$

Рассмотрим A_2 -число m' , для которого Ω_2 -слово $w' = w[f, X, m']$ зависит от t . Согласно определению 6.1.6, любое вхождение A_2 -числа t в Ω_2 -слово w' может быть заменено Ω_2 -словом w . Следовательно, Ω_2 -слово w' не зависит от t , а множество $X \setminus \{t\}$ является множеством образующих представления f . Следовательно, X не является квазибазисом расслоения f . \square

ЗАМЕЧАНИЕ 6.2.3. Доказательство теоремы 6.2.2 даёт нам эффективный метод построения квазибазиса представления f . Выбрав произвольное множество образующих, мы шаг за шагом исключаем те элементы множества, которые имеют координаты относительно остальных элементов множества. Если множество образующих представления бесконечно, то рассмотренная операция может не иметь последнего шага. Если представление имеет конечное множество образующих, то за конечное число шагов мы можем построить квазибазис этого представления. \square

Мы ввели Ω_2 -слово элемента $x \in A_2$ относительно множества образующих X в определении 6.1.6. Из теоремы 6.2.2 следует, что если множество образующих X не является квазибазисом, то выбор Ω_2 -слова относительно множества

образующих X неоднозначен. Но даже если множество образующих X является квазibasисом, то представление $t \in A_2$ в виде Ω_2 -слова неоднозначно.

ЗАМЕЧАНИЕ 6.2.4. *Существует три источника неоднозначности в записи Ω_2 -слова.*

6.2.4.1: В Ω_i -алгебре A_i , $i = 1, 2$, могут быть определены равенства. Например, если e - единица мультипликативной группы A_i , то верно равенство

$$ae = a$$

для любого $a \in A_i$.

6.2.4.2: Неоднозначность выбора Ω_2 -слова может быть связана со свойствами представления. Например, если t_1, \dots, t_n - Ω_2 -слова, $\omega \in \Omega_2(n)$ и $a \in A_1$, то ^{6.6}

$$(6.2.1) \quad f(a)(t_1 \dots t_n \omega) = (f(a)(t_1)) \dots (f(a)(t_n)) \omega$$

В то же время, если ω является операцией Ω_1 -алгебры A_1 и операцией Ω_2 -алгебры A_2 , то мы можем потребовать, что Ω_2 -слова $f(a_1 \dots a_n \omega)(x)$ и $(f(a_1)(x)) \dots (f(a_n)(x)) \omega$ описывают один и тот же элемент Ω_2 -алгебры A_2 . ^{6.7}

$$(6.2.2) \quad f(a_1 \dots a_n \omega)(x) = (f(a_1)(x)) \dots (f(a_n)(x)) \omega$$

6.2.4.3: Равенства вида (6.2.1), (6.2.2) сохраняются при морфизме представления. Поэтому мы можем игнорировать эту форму неоднозначности записи Ω_2 -слова. Однако возможна принципиально другая форма неоднозначности, пример которой можно найти в теоремах 9.3.15, 9.3.16.

Таким образом, мы видим, что на множестве Ω_2 -слов можно определить различные отношения эквивалентности. ^{6.8} Наша задача - найти максимальное отношение эквивалентности на множестве Ω_2 -слов, которое сохраняется при морфизме представления.

Аналогичное замечание касается отображения $W[f, X, t]$, определённого в замечании 6.1.11. ^{6.9} □

ТЕОРЕМА 6.2.5. Пусть X - квазibasис представления

$$f : A_1 \dashrightarrow A_2$$

^{6.6} Например, пусть $\{e_1, e_2\}$ - базис векторного пространства над полем k . Равенство (6.2.1) принимает форму закона дистрибутивности

$$a(b^1 e_1 + b^2 e_2) = (ab^1) e_1 + (ab^2) e_2$$

^{6.7} Для векторного пространства это требование принимает форму закона дистрибутивности

$$(a + b) e_1 = a e_1 + b e_1$$

^{6.8} Очевидно, что каждое из равенств (6.2.1), (6.2.2) порождает некоторое отношение эквивалентности.

^{6.9} Если базис векторного пространства - конечен, то мы можем представить базис в виде матрицы строки

$$\bar{e} = (e_1 \quad \dots \quad e_2)$$

Рассмотрим отношение эквивалентности

$$\lambda[f, X] \subseteq w[f, X] \times w[f, X]$$

которое порождено исключительно следующими утверждениями.

6.2.5.1: Если в Ω_2 -алгебре A_2 существует равенство

$$w_1[f, X, m] = w_2[f, X, m]$$

определяющее структуру Ω_2 -алгебры, то

$$(w_1[f, X, m], w_2[f, X, m]) \in \lambda[f, X]$$

6.2.5.2: Если в Ω_1 -алгебре A_1 существует равенство

$$w_1[f, X, m] = w_2[f, X, m]$$

определяющее структуру Ω_1 -алгебры, то

$$(f(w_1)(w[f, X, m]), f(w_2)(w[f, X, m])) \in \lambda[f, X]$$

6.2.5.3: Для любой операции $\omega \in \Omega_1(n)$,

$$(f(a_{11} \dots a_{1n} \omega)(a_2), (f(a_{11}) \dots f(a_{1n}) \omega)(a_2)) \in \lambda[f, X]$$

6.2.5.4: Для любой операции $\omega \in \Omega_2(n)$,

$$(f(a_1)(a_{21} \dots a_{2n} \omega), f(a_1)(a_{21}) \dots f(a_1)(a_{2n}) \omega) \in \lambda[f, X]$$

6.2.5.5: Пусть $\omega \in \Omega_1(n) \cap \Omega_2(n)$. Если представление f удовлетворяет равенству ^{6.10}

$$f(a_{11} \dots a_{1n} \omega)(a_2) = (f(a_{11})(a_2)) \dots (f(a_{1n})(a_2)) \omega$$

то мы можем предположить, что верно равенство

$$(f(a_{11} \dots a_{1n} \omega)(a_2), (f(a_{11})(a_2)) \dots (f(a_{1n})(a_2)) \omega) \in \lambda[f, X]$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Теорема верна, так как рассмотренные равенства сохраняются при гомоморфизмах универсальных алгебр A_1 и A_2 . \square

Мы можем представить отображение $W[f, \bar{e}](v)$ в виде матрицы столбца

$$W[f, \bar{e}, v] = \begin{pmatrix} v^1 \\ \dots \\ v^n \end{pmatrix}$$

Тогда

$$W[f, \bar{e}, v](\bar{e}') = W[f, \bar{e}, v] \begin{pmatrix} e'_1 & \dots & e'_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v^1 \\ \dots \\ v^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e'_1 & \dots & e'_n \end{pmatrix}$$

имеет вид произведения матриц.

6.10 Рассмотрим представление коммутативного кольца D в D -алгебре A . Мы будем пользоваться записью

$$f(a)(v) = av$$

В обеих алгебрах определены операции сложения и умножения. Однако равенство

$$f(a + b)(v) = f(a)(v) + f(b)(v)$$

верно, а равенство

$$f(ab)(v) = f(a)(v)f(b)(v)$$

является ошибочным.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.2.6. Квазибазис \bar{e} представления f такой, что

$$\rho[f, \bar{e}] = \lambda[f, \bar{e}]$$

называется **базисом представления** f . \square

ЗАМЕЧАНИЕ 6.2.7. Как отметил Кон в [14], стр. 96, 97, представление может иметь неэквивалентные базисы. Например, циклическая группа шестого порядка имеет базисы $\{a\}$ и $\{a^2, a^3\}$, которые нельзя отобразить один в другой эндоморфизмом представления. \square

ЗАМЕЧАНИЕ 6.2.8. Мы будем записывать базис также в виде

$$\bar{e} = (e, e \in \bar{e})$$

Если базис - конечный, то мы будем также пользоваться записью

$$\bar{e} = (e_i, i \in I) = (e_1, \dots, e_n)$$

\square

ТЕОРЕМА 6.2.9. Автоморфизм представления f отображает базис представления f в базис.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть отображение R - автоморфизм представления f . Пусть множество \bar{e} - базис представления f . Пусть ^{6.11} $\bar{e}' = R \circ \bar{e}$. Допустим множество \bar{e}' не является базисом. Согласно теореме 6.2.2 существует $e' \in \bar{e}'$ такое, что $\bar{e}' \setminus \{e'\}$ является множеством образующих представления f . Согласно теореме 3.5.5 отображение R^{-1} является автоморфизмом представления f . Согласно теореме 6.1.24 и определению 6.1.23, множество $\bar{e} \setminus \{e\}$ является множеством образующих представления f . Полученное противоречие доказывает теорему. \square

ТЕОРЕМА 6.2.10. Пусть \bar{e} - базис представления f . Пусть

$$R_1 : \bar{e} \rightarrow \bar{e}'$$

произвольное отображение множества X . Рассмотрим отображение Ω_2 -слов

$$w[f \rightarrow g, \bar{e}, \bar{e}', R_1] : w[f, \bar{e}] \rightarrow w[g, \bar{e}']$$

удовлетворяющее условиям 6.1.10.1, 6.1.10.2, 6.1.10.3, и такое, что

$$e \in \bar{e} \Rightarrow w[f \rightarrow g, \bar{e}, \bar{e}', R_1](e) = R_1(e)$$

Существует единственный эндоморфизм представления f ^{6.12}

$$r_2 : A_2 \rightarrow A_2$$

определённый правилом

$$R(m) = w[f \rightarrow g, \bar{e}, \bar{e}', R_1](w[f, \bar{e}, m])$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Утверждение теоремы является следствием теорем 6.1.10, 6.1.14. \square

СЛЕДСТВИЕ 6.2.11. Пусть \bar{e}, \bar{e}' - базисы представления f . Пусть R - автоморфизм представления f такой, что $\bar{e}' = R \circ \bar{e}$. Автоморфизм R определён однозначно. \square

^{6.11} Согласно определениям 5.1.3, 6.4.1, мы будем пользоваться записью $R(\bar{e}) = R \circ \bar{e}$.

^{6.12} Это утверждение похоже на теорему [2]-1, с. 104.

ЗАМЕЧАНИЕ 6.2.12. Теорема 6.2.10, так же как и теорема 6.1.14, является теоремой о продолжении отображения. Однако здесь \bar{e} - не произвольное множество образующих представления, а базис. Согласно замечанию 6.2.3, мы не можем определить координаты любого элемента базиса через остальные элементы этого же базиса. Поэтому отпадает необходимость в согласованности отображения базиса с представлением. \square

ТЕОРЕМА 6.2.13. Набор координат $W[f, \bar{e}, \bar{e}]$ соответствует тождественному преобразованию

$$W[f, \bar{e}, E] = W[f, \bar{e}, \bar{e}]$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Утверждение теоремы следует из равенства

$$m = \bar{e} \circ W[f, \bar{e}, m] = \bar{e} \circ W[f, \bar{e}, \bar{e}] \circ W[f, \bar{e}, m]$$

\square

ТЕОРЕМА 6.2.14. Пусть $W[f, \bar{e}, R \circ \bar{e}]$ - множество координат автоморфизма R . Определено множество координат $W[f, R \circ \bar{e}, \bar{e}]$, соответствующее автоморфизму R^{-1} . Множество координат $W[f, R \circ \bar{e}, \bar{e}]$ удовлетворяют равенству

$$(6.2.3) \quad \begin{aligned} W[f, \bar{e}, R \circ \bar{e}] \circ W[f, R \circ \bar{e}, \bar{e}] &= W[f, \bar{e}, \bar{e}] \\ W[f \rightarrow f, \bar{e}, \bar{e}, R^{-1}] &= W[f \rightarrow f, \bar{e}, \bar{e}, R]^{-1} = W[f, R \circ \bar{e}, \bar{e}] \end{aligned}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Поскольку R - автоморфизм представления f , то, согласно теореме 6.2.9, множество $R \circ \bar{e}$ - базис представления f . Следовательно, определено множество координат $W[f, R \circ \bar{e}, \bar{e}]$. Равенство (6.2.3) следует из цепочки равенств

$$\begin{aligned} W[f, \bar{e}, R \circ \bar{e}] \circ W[f, R \circ \bar{e}, \bar{e}] &= W[f, \bar{e}, R \circ \bar{e}] \circ W[f, \bar{e}, R^{-1} \circ \bar{e}] \\ &= W[f, \bar{e}, R \circ R^{-1} \circ \bar{e}] = W[f, \bar{e}, \bar{e}] \end{aligned}$$

\square

ЗАМЕЧАНИЕ 6.2.15. В Ω_2 -алгебре A_2 не существует универсального алгоритма определения множества координат $W[f, R \circ \bar{e}, \bar{e}]$ для заданного множества $W[f, \bar{e}, R \circ \bar{e}]$.^{6.13} Мы полагаем, что в теореме 6.2.14 этот алгоритм задан неявно. Очевидно также, что множество Ω_2 -слов

$$(6.2.4) \quad \bar{e} \circ W[f, R \circ \bar{e}, \bar{e}] \circ W[f, \bar{e}, R \circ \bar{e}]$$

вообще говоря, не совпадает с множеством Ω_2 -слов

$$(6.2.5) \quad \bar{e} \circ W[f, \bar{e}, \bar{e}]$$

Теорема 6.2.14 утверждает, что множества Ω_2 -слов (6.2.4) и (6.2.5) совпадают с точностью до отношения эквивалентности, порождённой представлением f . \square

ТЕОРЕМА 6.2.16. Группа автоморфизмов $GA(f)$ эффективного представления f в Ω_2 -алгебре A_2 порождает эффективное левостороннее представление в Ω_2 -алгебре A_2 .

^{6.13}В векторном пространстве линейному преобразованию соответствует матрица чисел. Соответственно, обратному преобразованию соответствует обратная матрица.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из следствия 6.2.11 следует, что если автоморфизм R отображает базис \bar{e} в базис \bar{e}' , то множество координат $W[f, \bar{e}, \bar{e}']$ однозначно определяет автоморфизм R . Из теоремы 6.1.18 следует, что множество координат $W[f, \bar{e}, \bar{e}']$ определяет правило отображения координат относительно базиса \bar{e} при автоморфизме представления f . Из равенства (6.1.28) следует, что автоморфизм R действует слева на элементы Ω_2 -алгебры A_2 . Из равенства (6.1.27) следует, что представление группы является левосторонним представлением. Согласно теореме 6.2.13 набор координат $W[f, \bar{e}, \bar{e}']$ соответствует тождественному преобразованию. Из теоремы 6.2.14 следует, что набор координат $W[f, R \circ \bar{e}, \bar{e}']$ соответствует преобразованию, обратному преобразованию $W[f, \bar{e}, R \circ \bar{e}']$. \square

6.3. Свободное представление

В разделе 3.1 мы рассмотрели определение 3.1.4 свободного представления. Однако мы можем рассмотреть другое определение, которое аналогично определению свободного модуля.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.3.1. *Представление*

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

называется свободным, если это представление имеет базис. \square

ТЕОРЕМА 6.3.2. *Пусть*

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

свободное представление согласно определению 6.3.1. Тогда представление f свободно согласно определению 3.1.4.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть \bar{e} - базис представления f и $m \in \bar{e}$. Пусть существуют A_1 -числа a_1, b_1 такие, что $f(a_1) = f(b_1)$. Согласно предположению $f(a_1)(m) = f(b_1)(m)$. Однако, если $a_1 \neq b_1$, то $f(a_1)(m)$ и $f(b_1)(m)$ различные Ω_2 -слова. Следовательно, \bar{e} не является базисом. Из полученного противоречия следует, что $a_1 = b_1$. Следовательно представление f свободно согласно определению 3.1.4. \square

ТЕОРЕМА 6.3.3. *Пусть*

$$f : A_1 \longrightarrow A_2$$

свободное представление согласно определению 3.1.4. Тогда представление f свободно согласно определению 6.3.1.

ВОПРОС 6.3.4. *Очень важно найти доказательство теоремы 6.3.3 или найти пример, когда эта теорема не верна. Мы увидим в главе 7 какую роль играет свободное представление согласно определению 6.3.1. Так как в дальнейшем я буду предполагать, что представление всегда имеет базис, то в рамках этой книги я могу ограничиться теоремой 6.3.2.* \square

6.4. Многообразие базисов представления

Множество $\mathcal{B}[f]$ базисов представления f называется **многообразием базисов** представления f .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.4.1. Согласно теоремам 6.1.20, 6.2.9, автоморфизм R представления f порождает преобразование

$$(6.4.1) \quad \begin{aligned} R : \bar{h} &\rightarrow R \circ \bar{h} \\ R \circ \bar{h} &= W[f, \bar{e}, R \circ \bar{e}] \circ \bar{h} \end{aligned}$$

многообразия базисов представления. Это преобразование называется **активным**. Согласно теореме 3.5.5, определено левостороннее представление

$$A(f) : GA(f) \longrightarrow \mathcal{B}[f]$$

группы $GA(f)$ в многообразии базисов $\mathcal{B}[f]$. Представление $A(f)$ называется **активным представлением**. Согласно следствию 6.2.11, это представление **однотранзитивно**. \square

ЗАМЕЧАНИЕ 6.4.2. Согласно замечанию 6.2.3, могут существовать базисы представления f , не связанные активным преобразованием. В этом случае мы в качестве многообразия базисов будем рассматривать орбиту выбранного базиса. Следовательно, представление f может иметь различные многообразия базисов. Мы будем предполагать, что мы выбрали многообразие базисов.

ТЕОРЕМА 6.4.3. Существует **однотранзитивное правостороннее представление**

$$P(f) : GA(f) \longrightarrow \mathcal{B}[f]$$

группы $GA(f)$ в многообразии базисов $\mathcal{B}[f]$. Представление $P(f)$ называется **пассивным представлением**.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Поскольку $A(f)$ - однотранзитивное левостороннее представление группы $GA(f)$, то однотранзитивное правостороннее представление $P(f)$ определено однозначно согласно теореме 5.5.9. \square

ТЕОРЕМА 6.4.4. Преобразование представления $P(f)$ называется **пассивным преобразованием многообразия базисов представления**. Мы будем пользоваться записью

$$s(\bar{e}) = \bar{e} \circ s$$

для обозначения образа базиса \bar{e} при пассивном преобразовании S . Пассивное преобразование базиса имеет вид

$$(6.4.2) \quad \begin{aligned} S : \bar{h} &\rightarrow \bar{h} \circ S \\ \bar{h} \circ S &= \bar{h} \circ W[f, \bar{e}, \bar{e} \circ S] \end{aligned}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно равенству (6.4.1), активное преобразование действует на координаты базиса слева. Равенство (8.3.2) следует из теорем 5.5.8, 5.5.9, 5.5.11, согласно которым пассивное преобразование действует на координаты базиса справа. \square

ТЕОРЕМА 6.4.5. Пассивное преобразование многообразия базисов является **автоморфизмом представления $A(f)$** .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Теорема является следствием теоремы 5.5.11. \square

ТЕОРЕМА 6.4.6. Пусть S - пассивное преобразование многообразия базисов представления f . Пусть \bar{e}_1 - базис представления f , $\bar{e}_2 = \bar{e}_1 \circ S$. Пусть для базиса \bar{e}_3 существует активное преобразование R такое, что $\bar{e}_3 = R \circ \bar{e}_1$. Положим $\bar{e}_4 = R \circ \bar{e}_2$. Тогда $\bar{e}_4 = \bar{e}_3 \circ S$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно равенству (6.4.1), активное преобразование координат базиса \bar{e}_3 имеет вид

$$(6.4.3) \quad \bar{e}_4 = W[f, \bar{e}_1, \bar{e}_3] \circ \bar{e}_2 = W[f, \bar{e}_1, \bar{e}_3] \circ \bar{e}_1 \circ W[f, \bar{e}_1, \bar{e}_2]$$

Пусть $\bar{e}_5 = \bar{e}_3 \circ S$. Из равенства (6.4.2) следует, что

$$(6.4.4) \quad \bar{e}_5 = \bar{e}_3 \circ W[f, \bar{e}_1, \bar{e}_2] = W[f, \bar{e}_1, \bar{e}_3] \circ \bar{e}_1 \circ W[f, \bar{e}_1, \bar{e}_2]$$

Из совпадения выражений в равенствах (6.4.3), (6.4.4) следует, что $\bar{e}_4 = \bar{e}_5$. Следовательно, коммутативна диаграмма

$$\begin{array}{ccc} \bar{e}_1 \in \mathcal{B}[f] & \xrightarrow{R} & \bar{e}_3 \in \mathcal{B}[f] \\ \downarrow S & & \downarrow S \\ \bar{e}_2 \in \mathcal{B}[f] & \xrightarrow{R} & \bar{e}_4 \in \mathcal{B}[f] \end{array}$$

□

6.5. Геометрический объект представления универсальной алгебры

Активное преобразование изменяет базис представления и Ω_2 -число согласовано и координаты Ω_2 -числа относительно базиса не меняются. Пассивное преобразование меняет только базис, и это ведёт к изменению координат Ω_2 -числа относительно базиса.

ТЕОРЕМА 6.5.1. Допустим пассивное преобразование $S \in GA(f)$ отображает базис $\bar{e}_1 \in \mathcal{B}[f]$ в базис $\bar{e}_2 \in \mathcal{B}[f]$

$$(6.5.1) \quad \bar{e}_2 = \bar{e}_1 \circ S = \bar{e}_1 \circ W[f, \bar{e}_1, \bar{e}_1 \circ S]$$

Допустим A_2 -число m имеет Ω_2 -слово

$$(6.5.2) \quad m = \bar{e}_1 \circ W[f, \bar{e}_1, m]$$

относительно базиса \bar{e}_1 и имеет Ω_2 -слово

$$(6.5.3) \quad m = \bar{e}_2 \circ W[f, \bar{e}_2, m]$$

относительно базиса \bar{e}_2 . Преобразование координат

$$(6.5.4) \quad W[f, \bar{e}_2, m] = W[f, \bar{e}_1 \circ S, \bar{e}_1] \circ W[f, \bar{e}_1, m]$$

не зависит от A_2 -числа m или базиса \bar{e}_1 , а определено исключительно координатами A_2 -числа m относительно базиса \bar{e}_1 .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из (6.5.1) и (6.5.3) следует, что

$$(6.5.5) \quad \begin{aligned} \bar{e}_1 \circ W[f, \bar{e}_1, m] &= \bar{e}_2 \circ W[f, \bar{e}_2, m] = \bar{e}_1 \circ W[f, \bar{e}_1, \bar{e}_2] \circ W[f, \bar{e}_2, m] \\ &= \bar{e}_1 \circ W[f, \bar{e}_1, \bar{e}_1 \circ S] \circ W[f, \bar{e}_2, m] \end{aligned}$$

Сравнивая (6.5.2) и (6.5.5) получаем, что

$$(6.5.6) \quad W[f, \bar{e}_1, m] = W[f, \bar{e}_1, \bar{e}_1 \circ S] \circ W[f, \bar{e}_2, m]$$

Так как S - автоморфизм представления, то равенство (6.5.4) следует из (6.5.6) и теоремы 6.2.14. □

ТЕОРЕМА 6.5.2. *Преобразования координат (6.5.4) порождают эффективное левостороннее представление группы $GA(f)$, называемое координатным представлением в Ω_2 -алгебре.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно следствию 6.1.19, преобразование (6.5.4) является эндоморфизмом представления ^{6.14}

$$f : A_1 \longrightarrow W[f, \bar{e}_1]$$

Допустим мы имеем два последовательных пассивных преобразования S и T . Преобразование координат

$$(6.5.7) \quad W[f, \bar{e}_2, m] = W[f, \bar{e}_1 \circ S, \bar{e}_1] \circ W[f, \bar{e}_1, m]$$

соответствует пассивному преобразованию S . Преобразование координат

$$(6.5.8) \quad W[f, \bar{e}_2, m] = W[f, \bar{e}_1 \circ T, \bar{e}_1] \circ W[f, \bar{e}_1, m]$$

соответствует пассивному преобразованию T . Согласно теореме 6.4.3, произведение преобразований координат (6.5.7) и (6.5.8) имеет вид

$$\begin{aligned} W[f, \bar{e}_3, m] &= W[f, \bar{e}_1 \circ T, \bar{e}_1] \circ W[f, \bar{e}_1 \circ S, \bar{e}_1] \circ W[f, \bar{e}_1, m] \\ &= W[f, \bar{e}_1 \circ T \circ S, \bar{e}_1] \circ W[f, \bar{e}_1, m] \end{aligned}$$

и является координатным преобразованием, соответствующим пассивному преобразованию $T \circ S$. Это доказывает, что преобразования координат порождают левостороннее представление группы $GA(f)$.

Если координатное преобразование не изменяет координаты выбранного базиса, то ему соответствует единица группы $GA(f)$, так как пассивное представление однотранзитивно. Следовательно, координатное представление эффективно. \square

Пусть f - представление Ω_1 -алгебры A_1 в Ω_2 -алгебре A_2 . Пусть g - представление Ω_1 -алгебры A_1 в Ω_3 -алгебре A_3 . Пассивное представление $P(g)$ согласовано с пассивным представлением $P(f)$, если существует гомоморфизм h группы $GA(g)$ в группу $GA(f)$. Рассмотрим диаграмму

$$\begin{array}{ccc} \text{End}(B[f]) & \xrightarrow{H} & \text{End}(B[g]) \\ P(f) \uparrow & \nearrow f' & \uparrow P(g) \\ GA(f) & \xrightarrow{h} & GA(g) \end{array}$$

Так как отображения $P(f)$, $P(g)$ являются изоморфизмами группы, то отображение H является гомоморфизмом групп. Следовательно, отображение f' является представлением группы $GA(f)$ в многообразии базисов $\mathcal{B}(g)$. Согласно построению, пассивному преобразованию S многообразия базисов $\mathcal{B}(f)$ соответствует пассивное преобразование $H(S)$ многообразия базисов $\mathcal{B}(g)$

$$(6.5.9) \quad \bar{e}_{g1} = \bar{e}_g \circ H(S)$$

Тогда координатное преобразование в представлении g принимает вид

$$(6.5.10) \quad W[g, \bar{e}_{g1}, m] = W[g, \bar{e}_g \circ H(S), \bar{e}_g] \circ W[g, \bar{e}_g, m]$$

^{6.14}Это преобразование не порождает эндоморфизма представления f . Координаты меняются, поскольку меняется базис, относительно которого мы определяем координаты. Однако A_2 -число, координаты которого мы рассматриваем, не меняется.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.5.3. Мы будем называть орбиту

$$\begin{aligned}\mathcal{O}(f, g, \bar{e}_g, m) &= H(GA(f)) \circ W[g, \bar{e}_g, m] \\ &= (W[g, \bar{e}_g \circ H(S), \bar{e}_g] \circ W[g, \bar{e}_g, m], \bar{e}_f \circ S, S \in GA(f))\end{aligned}$$

геометрическим объектом в координатном представлении, определённом в представлении f . Для любого базиса $\bar{e}_{f1} = \bar{e}_f \circ S$ соответствующая точка (6.5.10) орбиты определяет координаты геометрического объекта относительно базиса \bar{e}_{f1} . \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.5.4. Мы будем называть орбиту

$$\mathcal{O}(f, g, m) = (W[g, \bar{e}_g \circ H(S), \bar{e}_g] \circ W[g, \bar{e}_g, m], \bar{e}_g \circ H(S), \bar{e}_f \circ S, S \in GA(f))$$

геометрическим объектом, определённым в представлении f . Мы будем также говорить, что m - это геометрический объект типа H . Для любого базиса $\bar{e}_{f1} = \bar{e}_f \circ S$ соответствующая точка (6.5.10) орбиты определяет A_2 -число

$$m = \bar{e}_g \circ W[g, \bar{e}_g, m]$$

которое мы называем представителем геометрического объекта в представлении f . \square

Так как геометрический объект - это орбита представления, то согласно теореме 5.3.7 определение геометрического объекта корректно.

Определение 6.5.3 строит геометрический объект в координатном пространстве. Определение 6.5.4 предполагает, что мы выбрали базис представления g . Это позволяет использовать представитель геометрического объекта вместо его координат.

ТЕОРЕМА 6.5.5 (принцип инвариантности). Представитель геометрического объекта не зависит от выбора базиса \bar{e}_f .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Чтобы определить представителя геометрического объекта, мы должны выбрать базис \bar{e}_f представления f , базис \bar{e}_g представления g и координаты геометрического объекта $W[g, \bar{e}_g, n]$. Соответствующий представитель геометрического объекта имеет вид

$$n = \bar{e}_g \circ W[g, \bar{e}_g, n]$$

Базис \bar{e}_{f1} связан с базисом \bar{e}_f пассивным преобразованием

$$\bar{e}_{f1} = \bar{e}_f \circ S$$

Согласно построению это порождает пассивное преобразование (6.5.9) и координатное преобразование (6.5.10). Соответствующий представитель геометрического объекта имеет вид

$$\begin{aligned}n' &= \bar{e}_{g1} \circ W[g, \bar{e}_{g1}, n'] \\ &= \bar{e}_g \circ W[g, \bar{e}_g, \bar{e}_g \circ H(S)] \circ W[g, \bar{e}_g \circ H(S), \bar{e}_g] \circ W[g, \bar{e}_g, n] \\ &= \bar{e}_g \circ W[g, \bar{e}_g, n] = n\end{aligned}$$

Следовательно, представитель геометрического объекта инвариантен относительно выбора базиса. \square

ТЕОРЕМА 6.5.6. Множество геометрических объектов типа H является Ω_3 -алгеброй.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть

$$m_i = \bar{e}_g \circ W[g, \bar{e}_g, m_i] \quad i = 1, \dots, n$$

Для операции $\omega \in \Omega_3(n)$ мы положим

$$(6.5.11) \quad m_1 \dots m_n \omega = \bar{e}_g \circ (W[g, \bar{e}_g, m_1] \dots W[g, \bar{e}_g, m_n] \omega)$$

Так как отображение $W[g, \bar{e}_g, \bar{e}_g \circ H(S)]$ для произвольного эндоморфизма S Ω_2 -алгебры A_2 является эндоморфизмом Ω_3 -алгебры A_3 , то определение (6.5.11) корректно. \square

ТЕОРЕМА 6.5.7. *Определено представление Ω_1 -алгебры A_1 в Ω_3 -алгебре N геометрических объектов типа H .*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть

$$m = \bar{e}_g \circ W[g, \bar{e}_g, m]$$

Для $a \in A_1$, мы положим

$$(6.5.12) \quad f(a)(m) = \bar{e}_g \circ f(a)(W[g, \bar{e}_g, m])$$

Так как отображение $W[g, \bar{e}_g, \bar{e}_g \circ H(S)]$ для произвольного эндоморфизма S Ω_2 -алгебры A_2 является эндоморфизмом представления g , то определение (6.5.12) корректно. \square

Диаграмма представлений универсальных алгебр

7.1. Диаграмма представлений универсальных алгебр

Из сравнения теорем 6.1.4 и [14]-5.1 следует, что нет жёсткой границы между универсальной алгеброй и представлением универсальной алгебры. Отсюда следует возможность обобщения теории представлений универсальной алгебры.

Самая простая конструкция возникает следующим образом. Пусть

$$f_{12} : A_1 \xrightarrow{*} A_2$$

представление Ω_1 -алгебры A_1 в Ω_2 -алгебре A_2 . Если мы вместо Ω_2 -алгебры A_2 рассмотрим представление

$$f_{23} : A_2 \xrightarrow{*} A_3$$

Ω_2 -алгебры A_2 в Ω_3 -алгебре A_3 , то мы получим диаграмму вида

$$(7.1.1) \quad A_1 \xrightarrow{*} A_2 \xrightarrow{*} A_3$$

Очевидно, что в диаграмме (7.1.1) мы можем положить, что A_3 является представлением

$$f_{34} : A_3 \xrightarrow{*} A_4$$

Цепочку представлений универсальных алгебр можно сделать сколь угодно длинной. Таким образом мы получаем следующее определение.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7.1.1. *Рассмотрим множество Ω_k -алгебр A_k , $k = 1, \dots, n$. Положим $A = (A_1, \dots, A_n)$. Положим $f = (f_{12}, \dots, f_{n-1n})$. Множество представлений f_{kk+1} , $k = 1, \dots, n$, Ω_k -алгебры A_k в Ω_{k+1} -алгебре A_{k+1} называется **башней** (f, A) представлений Ω -алгебр. \square*

Башню представлений (f, A) можно описать с помощью диаграммы


$$A_1 \xrightarrow{*} A_2 \xrightarrow{*} \dots \xrightarrow{*} A_n$$

Рассматривая башню представлений мы можем снова предположить, что A_2 или A_3 являются представлениями универсальных алгебр или башнями


представлений. В этом случае диаграмма (7.1.1) примет вид




либо



Мы также допускаем, что некоторые алгебры или отображения на диаграмме совпадают. Таким образом, мы будем считать, что диаграммы



и



эквивалентны.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7.1.2. *Диаграмма (f, A) представлений универсальных алгебр - это такой ориентированный граф, что*

7.1.2.1: *вершина A_k , $k = 1, \dots, n$, является Ω_k -алгеброй;*

7.1.2.2: *ребро f_{kl} является представлением Ω_k -алгебры A_k в Ω_l -алгебре A_l ;*

Мы будем требовать, чтобы этот граф был связным и не содержал циклов.

Мы будем полагать, что $A_{[0]}$ - это множество начальных вершин графа.

Мы будем полагать, что $A_{[k]}$ - это множество вершин графа, для которых максимальный путь от начальных вершин равен k . \square

ЗАМЕЧАНИЕ 7.1.3. *Так как в разных вершинах графа может быть одна и та же алгебра, то мы обозначим $A = (A_{(1)} \dots A_{(n)})$ множество универсальных алгебр, которые попарно различны. Из равенства*

$$A = (A_{(1)} \dots A_{(n)}) = (A_1 \dots A_n)$$

следует, что для любого индекса (i) существует по крайней мере один индекс i такой, что $A_{(i)} = A_i$. Если даны два набора множеств $A = (A_{(1)} \dots A_{(n)})$, $B = (B_{(1)} \dots B_{(n)})$ и определено отображение

$$h_{(i)} : A_{(i)} \rightarrow B_{(i)}$$

для некоторого индекса (i) , то также определено отображение

$$h_i : A_i \rightarrow B_i$$

для любого индекса i такого, что $A_{(i)} = A_i$ и в этом случае $h_i = h_{(i)}$. \square

ТЕОРЕМА 7.1.4 (индукция по диаграмме представлений). Пусть теорема \mathcal{T} верна для множества универсальных алгебр $A_{[0]}$ диаграммы (f, A) представлений универсальных алгебр. Пусть из утверждения, что теорема \mathcal{T} верна для множества универсальных алгебр $A_{[k]}$ диаграммы (f, A) представлений, следует утверждение, что теорема \mathcal{T} верна для множества универсальных алгебр $A_{[k+1]}$ диаграммы (f, A) представлений. Тогда теорема \mathcal{T} верна для множества универсальных алгебр диаграммы (f, A) представлений.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Теорема является следствием принципа математической индукции. \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7.1.5. Диаграмма (f, A) представлений универсальных алгебр называется **коммутативной**, если выполнено следующее условие. для каждой пары представлений

$$f_{ik} : A_i \longrightarrow A_k$$

$$f_{jk} : A_j \longrightarrow A_k$$

следующее равенство верно^{7.1}

$$(7.1.2) \quad f_{ik}(a_i)(f_{jk}(a_j)(a_k)) = f_{jk}(a_j)(f_{ik}(a_i)(a_k))$$

\square

ТЕОРЕМА 7.1.6. Пусть

$$f_{ij} : A_i \longrightarrow A_j$$

представление Ω_i -алгебры A_i в Ω_j -алгебре A_j . Пусть

$$f_{jk} : A_j \longrightarrow A_k$$

представление Ω_j -алгебры A_j в Ω_k -алгебре A_k . Мы можем описать фрагмент^{7.2}

$$A_i \xrightarrow{f_{ij}} A_j \xrightarrow{f_{jk}} A_k$$

^{7.1} Образно говоря, представления f_{ik} и f_{jk} прозрачны друг для друга.

^{7.2} Теорема 7.1.6 утверждает, что преобразования в башне представлений согласованы.

диаграммы представлений с помощью диаграммы

$$(7.1.3) \quad \begin{array}{ccc} & f_{jk}(f_{ij}(a_i)(a_j)) & \\ & \uparrow f_{ijk}(a_i) & \\ A_k & & A_k \\ & \downarrow f_{jk}(a_j) & \\ & f_{ijk}(a_j) & \\ & \uparrow f_{ijk} & \\ A_j & \xrightarrow{f_{ij}(a_i)} & A_j \\ & \uparrow f_{ij} & \\ & A_i & \end{array}$$

Отображение

$$f_{ijk} : A_i \rightarrow \text{End}(\Omega_j, \text{End}(\Omega_k, A_k))$$

определено равенством

$$(7.1.4) \quad f_{ijk}(a_i)(f_{jk}(a_j)) = f_{jk}(f_{ij}(a_i)(a_j))$$

где $a_i \in A_i$, $a_j \in A_j$. Если представление f_{jk} эффективно и представление f_{ij} свободно, то отображение f_{ijk} является свободным представлением

$$f_{ijk} : A_i \xrightarrow{*} \text{End}(\Omega_k, A_k)$$

Ω_i -алгебры A_i в Ω_j -алгебре $\text{End}(\Omega_k, A_k)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.

ЛЕММА 7.1.7. Отображение f_{ijk} является инъекцией.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $(a_i, b_i) \in \ker f_{ijk}$. Тогда

$$(7.1.5) \quad \begin{aligned} f_{jk}(f_{ij}(a_i)(a_j)) &= f_{ijk}(a_i)(f_{jk}(a_j)) = f_{ijk}(b_i)(f_{jk}(a_j)) \\ &= f_{jk}(f_{ij}(b_i)(a_j)) \end{aligned}$$

Если представление f_{jk} эффективно, то равенство

$$(7.1.6) \quad f_{ij}(a_i)(a_j) = f_{ij}(b_i)(a_j)$$

является следствием определения 3.1.2 и равенства (7.1.5) для любого $a_j \in A_j$.

Утверждение $a_i = b_i$ следует из определения 3.1.4. \odot

ЛЕММА 7.1.8. На множестве $\text{End}(\Omega_j, \text{End}(\Omega_k, A_k))$ определена структура Ω_i -алгебры.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\omega \in \Omega_i$. Пусть $a_1, \dots, a_m \in A_i$. Мы определим операцию ω на множестве $\text{End}(\Omega_j, \text{End}(\Omega_k, A_k))$ с помощью равенства

$$(7.1.7) \quad f_{ijk}(a_1) \dots f_{ijk}(a_m) \omega = f_{ijk}(a_1 \dots a_m \omega)$$

Согласно лемме 7.1.7, операция ω корректно определена равенством (7.1.7). \odot

СЛЕДСТВИЕ 7.1.9. *Отображение f_{ijk} является гомоморфизмом Ω_i -алгебры.* \odot

ЛЕММА 7.1.10. *Отображение $f_{ijk}(a)$ является гомоморфизмом Ω_j -алгебры.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $b_1, \dots, b_m \in A_j$. Тогда равенство

$$(7.1.8) \quad f_{ijk}(a)(f_{jk}(b_1)) \dots f_{ijk}(a)(f_{jk}(b_m))\omega = f_{jk}(f_{ij}(a)(b_1)) \dots f_{jk}(f_{ij}(a)(b_m))\omega$$

является следствием равенства (7.1.4). Так как отображения $f_{ij}(a)$, f_{jk} являются гомоморфизмами Ω_j -алгебры, то равенство

$$(7.1.9) \quad \begin{aligned} & f_{ijk}(a)(f_{jk}(b_1)) \dots f_{ijk}(a)(f_{jk}(b_m))\omega \\ &= f_{jk}(f_{ij}(a)(b_1) \dots f_{ij}(a)(b_m))\omega \\ &= f_{jk}(f_{ij}(a)(b_1 \dots b_m \omega)) \end{aligned}$$

является следствием равенства (7.1.8). Равенство

$$(7.1.10) \quad f_{ijk}(a)(f_{jk}(b_1)) \dots f_{ijk}(a)(f_{jk}(b_m))\omega = f_{ijk}(a)(f_{jk}(b_1 \dots b_m \omega))$$

является следствием равенств (7.1.4), (7.1.9). Так как отображение f_{jk} является гомоморфизмом Ω_2 -алгебры, то равенство

$$(7.1.11) \quad f_{ijk}(a)(f_{jk}(b_1)) \dots f_{ijk}(a)(f_{jk}(b_m))\omega = f_{ijk}(a)(f_{jk}(b_1) \dots f_{jk}(b_m))\omega$$

является следствием равенства (7.1.10). \odot

Теорема является следствием следствия 7.1.9 и леммы 7.1.10. \square

ТЕОРЕМА 7.1.11. *Отображение f_{jk} является приведенным морфизмом представлений из f_{ij} в f_{ijk} .*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Рассмотрим более детально диаграмму (7.1.3).

$$(7.1.12) \quad \begin{array}{ccc} A_j & \xrightarrow{f_{jk}} & \text{End}(\Omega_k, A_k) \\ & \swarrow f_{ij}^* & \nearrow f_{ijk}^* \\ & A_i & \end{array}$$

Утверждение теоремы следует из равенства (7.1.4) и определения 3.4.2. \square

ТЕОРЕМА 7.1.12. *Пусть*

$$f_{ij} : A_i \xrightarrow{*} A_j$$

представление Ω_i -алгебры A_i в Ω_j -алгебре A_j . Пусть

$$f_{jk} : A_j \xrightarrow{*} A_k$$

представление Ω_j -алгебры A_j в Ω_k -алгебре A_k . Тогда существует представление

$$f_{ij,k} : A_i \times A_j \xrightarrow{*} A_k$$

множества ^{7.3} $A_i \times A_j$ в Ω_k -алгебре A_k .

^{7.3} Так как Ω_i -алгебра A_i и Ω_j -алгебра A_j имеют различный набор операций, мы не можем определить структуру универсальной алгебры на множестве $A_i \times A_j$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Мы можем описать фрагмент

$$A_i \xrightarrow{f_{ij}} A_j \xrightarrow{f_{jk}} A_k$$

диаграммы представлений с помощью диаграммы

(7.1.13)

$$\begin{array}{ccc}
 & A_i \times A_j & \\
 & \parallel f_{ij,k} & \\
 A_k & \xrightarrow{f_{jk}(f_{ij}(a_i)(a_j))} & A_k \\
 & \swarrow f_{jk} & \\
 & A_j & \xrightarrow{f_{ij}(a_i)} & A_j \\
 & \parallel f_{ij} & \\
 & A_i &
 \end{array}$$

Из диаграммы (7.1.13) следует, что отображение $f_{ij,k}$ определено равенством

$$f_{ij,k}(a_i, a_j) = f_{jk}(f_{ij}(a_i)(a_j))$$

□

7.2. Морфизм диаграммы представлений

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7.2.1. Пусть (f, A) - диаграмма представлений, где $A = (A_{(1)} \dots A_{(n)})$ - множество универсальных алгебр. Пусть (B, g) - диаграмма представлений, где $B = (B_{(1)} \dots B_{(n)})$ - множество универсальных алгебр. Множество отображений $h = (h_{(1)} \dots h_{(n)})$

$$h_{(i)} : A_{(i)} \rightarrow B_{(i)}$$

называется морфизмом из диаграммы представлений (f, A) в диаграмму представлений (B, g) , если для любых индексов $(i), (j)$, i, j таких, что $A_{(i)} = A_i$, $A_{(j)} = A_j$, и для каждого представления

$$f_{ji} : A_j \xrightarrow{*} A_i$$

пара отображений (h_j, h_i) является морфизмом представлений из f_{ji} в g_{ji} .

□

Мы будем пользоваться записью

$$h : A \rightarrow B$$

если кортеж отображений h является морфизмом из диаграммы представлений (f, A) в диаграмму представлений (B, g) .

Очень часто при изучении морфизма представления универсальной алгебры, мы предполагаем, что алгебра, порождающая представление, задана. Поэтому нас не интересует отображение этой алгебры, и это соглашение упрощает

структуру морфизма. Такой морфизм представления мы называем приведенным морфизмом представления.

Похожая задача встречается при изучении морфизма диаграммы представлений. Для каждой универсальной алгебры из диаграммы представлений существует множество алгебр, предшествующих этой алгебре в соответствующем графе. Мы можем предположить, что некоторые из этих алгебр заданы и не рассматривать соответствующие гомоморфизмы. Соответствующий морфизм диаграммы представлений также называется приведенным. Однако в виду сложности структуры диаграммы представлений, мы не будем рассматривать приведенные морфизмы диаграммы представлений.

Для любого представления f_{ij} , $i = 1, \dots, n$, $j = 1, \dots, n$, мы имеем диаграмму

$$(7.2.1) \quad \begin{array}{ccc} & A_j & \xrightarrow{h_j} & B_j \\ & \uparrow f_{ij}(a_i) & & \downarrow g_{ij}(h_i(a_i)) \\ & A_j & \xrightarrow{h_j} & B_j \\ & \uparrow f_{ij} & & \downarrow g_{ij} \\ A_i & \xrightarrow{h_i} & B_i & \end{array} \quad (1)$$

Равенства

$$(7.2.2) \quad h_j \circ f_{ij}(a_i) = g_{ij}(h_i(a_i)) \circ h_j$$

$$(7.2.3) \quad h_j(f_{ij}(a_i)(a_j)) = g_{ij}(h_i(a_i))(h_j(a_j))$$

выражают коммутативность диаграммы (1).


Пусть определены представления f_{ij} и f_{jk} универсальных алгебр. Учитывая диаграмму (7.2.1) для представлений f_{ij} и f_{jk} , мы получим следующую диаграмму

$$(7.2.4) \quad \begin{array}{ccc} & A_k & \xrightarrow{h_k} & B_k \\ & \uparrow f_{jk}(f_{ij}(a_i)(a_j)) & & \downarrow g_{jk}(g_{ij}(h_i(a_i))(h_j(a_j))) \\ & A_k & \xrightarrow{h_k} & B_k \\ & \uparrow f_{ijk}(a_i) & \xrightarrow{F} & \downarrow g_{ijk}(h_i(a_i)) \\ & A_k & \xrightarrow{h_k} & B_k \\ & \uparrow f_{jk}(a_j) & & \downarrow g_{jk}(h_j(a_j)) \\ A_k & \xrightarrow{h_k} & B_k & \end{array}$$

Очевидно, что существует морфизм из $\text{End}(\Omega_k, A_k)$ в $\text{End}(\Omega_k, B_k)$, отображающий $f_{ijk}(a_i)$ в $g_{ijk}(h_i(a_i))$.

ТЕОРЕМА 7.2.2. Если представление f_{jk} эффективно и представление f_{ij} свободно, то ^{7.4} (h_i, h_k^*) является морфизмом представлений из представления f_{ijk} в представление g_{ijk} Ω_i -алгебры.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Рассмотрим диаграмму



Существование отображения h_k^* и коммутативность диаграмм (2) и (3) следует из эффективности отображения f_{jk} и теоремы 3.2.9. Коммутативность диаграмм (4) и (5) следует из теоремы 7.1.11.

Из коммутативности диаграммы (4) следует

$$(7.2.5) \quad f_{jk} \circ f_{ij}(a_i) = f_{ijk}(a_i) \circ f_{jk}$$

Из равенства (7.2.5) следует

$$(7.2.6) \quad h_k^* \circ f_{jk} \circ f_{ij}(a_i) = h_k^* \circ f_{ijk}(a_i) \circ f_{jk}$$

Из коммутативности диаграммы (3) следует

$$(7.2.7) \quad h_k^* \circ f_{jk} = g_{jk} \circ h_j$$

Из равенства (7.2.7) следует

$$(7.2.8) \quad h_k^* \circ f_{jk} \circ f_{ij}(a_i) = g_{jk} \circ h_j \circ f_{ij}(a_i)$$

Из равенств (7.2.6) и (7.2.8) следует

$$(7.2.9) \quad h_k^* \circ f_{ijk}(a_i) \circ f_{jk} = g_{jk} \circ h_j \circ f_{ij}(a_i)$$

Из коммутативности диаграммы (5) следует

$$(7.2.10) \quad g_{jk} \circ g_{ij}(h_i(a_i)) = g_{ijk}(h_i(a_i)) \circ g_{jk}$$

Из равенства (7.2.10) следует

$$(7.2.11) \quad g_{jk} \circ g_{ij}(h_i(a_i)) \circ h_j = g_{ijk}(h_i(a_i)) \circ g_{jk} \circ h_j$$

Из коммутативности диаграммы (2) следует

$$(7.2.12) \quad h_k^* \circ f_{jk} = g_{jk} \circ h_j$$

Из равенства (7.2.12) следует

$$(7.2.13) \quad g_{ijk}(h_i(a_i)) \circ h_k^* \circ f_{jk} = g_{ijk}(h_i(a_i)) \circ g_{jk} \circ h_j$$

^{7.4} Смотри определение отображения h^* в теореме 3.2.9.

Из равенств (7.2.11) и (7.2.13) следует

$$(7.2.14) \quad g_{jk} \circ g_{ij}(h_i(a_i)) \circ h_j = g_{ij}(h_i(a_i)) \circ h_k^* \circ f_{jk}$$

Внешняя диаграмма является диаграммой (7.2.1) при $i = 1$. Следовательно, внешняя диаграмма коммутативна

$$(7.2.15) \quad h_j \circ f_{ij}(a_i) = g_{ij}(h_i(a_i)) \circ h_j$$

Из равенства (7.2.15) следует

$$(7.2.16) \quad g_{jk} \circ h_j \circ f_{ij}(a_i) = g_{jk} \circ g_{ij}(h_i(a_i)) \circ h_j(a_j)$$

Из равенств (7.2.9), (7.2.14) и (7.2.16) следует

$$(7.2.17) \quad h_k^* \circ f_{ijk}(a_i) \circ f_{jk} = g_{ijk}(h_i(a_i)) \circ h_k^* \circ f_{jk}$$

Так как отображение $f_{i+1, i+2}$ - инъекция, то из равенства (7.2.17) следует

$$(7.2.18) \quad h_k^* \circ f_{ijk}(a_i) = g_{ijk}(h_i(a_i)) \circ h_k^*$$

Из равенства (7.2.18) следует коммутативность диаграммы (1), откуда следует утверждение теоремы. \square

Теорема 7.2.2 утверждает, что неизвестное отображение на диаграмме (7.2.4) является отображением h_k^* . Смысл теорем 7.1.11 и 7.2.2 состоит в том, что, если все представления свободны, то все отображения в диаграмме представлений действуют согласовано.

ТЕОРЕМА 7.2.3. *Рассмотрим множество Ω_i -алгебр $A_{(i)}, B_{(i)}, C_{(i)}$, $(i) = (1), \dots, (n)$. Пусть определены морфизмы диаграм представлений*

$$\begin{aligned} p &: (f, A) \rightarrow (g, B) \\ q &: (g, B) \rightarrow (h, C) \end{aligned}$$


Тогда определён морфизм представлений Ω -алгебры

$$r : (f, A) \rightarrow (h, C)$$

*где $r_{(k)} = q_{(k)} \circ p_{(k)}$, $(k) = (1), \dots, (n)$. Мы будем называть морфизм r диаграммы представлений из f в h **произведением морфизмов p и q диаграммы представлений**.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Для любых i, j таких, что $A_{(j)} = A_j$, если существует представление f_{ij} , мы можем представить утверждение теоремы, пользуясь

диаграммой



Отображение r_i является гомоморфизмом Ω_i -алгебры A_i в Ω_i -алгебру C_i . Нам надо показать, что пара отображений (r_i, r_j) удовлетворяет (7.2.2):

$$\begin{aligned} r_k(f_{ij}(a_i)(a_j)) &= q_j \circ p_j(f_{ij}(a_i)(a_j)) \\ &= q_k(g_{ij}(p_i(a_i))(p_j(a_j))) \\ &= h_{ij}(q_i \circ p_i(a_i))(q_j \circ p_j(a_j)) \\ &= h_{ij}(r_i(a_i))(r_j(a_j)) \end{aligned}$$

□

7.3. Автоморфизм диаграммы представлений

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7.3.1. Пусть (f, A) - диаграмма представлений универсальных алгебр. Морфизм диаграммы представлений $(h_{(1)}, \dots, h_{(n)})$ такой, что для любого (k) , $(k) = (1), \dots, (n)$, $h_{(k)}$ является эндоморфизмом $\Omega_{(k)}$ -алгебры $A_{(k)}$, называется **эндоморфизмом диаграммы представлений**. □

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7.3.2. Пусть (f, A) - диаграмма представлений универсальных алгебр. Морфизм диаграммы представлений $(h_{(1)}, \dots, h_{(n)})$ такой, что для любого (k) , $(k) = (1), \dots, (n)$, $h_{(k)}$ является автоморфизмом $\Omega_{(k)}$ -алгебры $A_{(k)}$, называется **автоморфизмом диаграммы представлений**. □

ТЕОРЕМА 7.3.3. Пусть (f, A) - диаграмма представлений универсальных алгебр. Множество автоморфизмов диаграммы (f, A) представлений порождает группу $GA(f)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $r = (r_{(1)}, \dots, r_{(n)})$, $p = (p_{(1)}, \dots, p_{(n)})$ - автоморфизмы диаграммы представлений (f, A) . Согласно определению 7.3.2 для любого (k) , $(k) = (1), \dots, (n)$, отображения $r_{(k)}$, $p_{(k)}$ являются автоморфизмами $\Omega_{(k)}$ -алгебры $A_{(k)}$. Согласно теореме II.3.2 ([14], с. 60) для любого (k) , $(k) = (1), \dots, (n)$, отображение $r_{(k)} \circ p_{(k)}$ является автоморфизмом $\Omega_{(k)}$ -алгебры $A_{(k)}$. Из теоремы 7.2.3 и определения 7.3.2 следует, что произведение автоморфизмов

$r \circ p$ диаграммы представлений (f, A) является автоморфизмом диаграммы представлений (f, A) .

Согласно доказательству теоремы 3.5.5, для любого (k) , $(k) = (1), \dots, (n)$, произведение автоморфизмов $\Omega_{(k)}$ -алгебры ассоциативно. Следовательно, ассоциативно произведение автоморфизмов диаграммы представлений.

Пусть $r = (r_{(1)}, \dots, r_{(n)})$ - автоморфизм диаграммы представлений (f, A) . Согласно определению 7.3.2 для любого (k) , $(k) = (1), \dots, (n)$, отображение $r_{(k)}$ является автоморфизмом $\Omega_{(k)}$ -алгебры $A_{(k)}$. Следовательно, для любого (k) , $(k) = (1), \dots, (n)$, отображение $r_{(k)}^{-1}$ является автоморфизмом $\Omega_{(k)}$ -алгебры $A_{(k)}$. Для автоморфизма $r = (r_{(1)}, \dots, r_{(n)})$ справедливо равенство (7.2.3). Пусть j - индекс такой, что $j = (k)$. Положим $a'_j = r_j(a_j)$. Так как r_j - автоморфизм, то $a_j = r_j^{-1}(a'_j)$ и равенство (7.2.3) можно записать в виде

$$(7.3.1) \quad h_j(f_{ij}(h_i^{-1}(a'_i))(h_j^{-1}(a'_j))) = g_{ij}(a'_i)(a'_j)$$

для любых i, j при условии, что представление f_{ij} существует. Аналогично, из равенства (7.3.1) следует

$$(7.3.2) \quad f_{ij}(h_i^{-1}(a'_i)(h_j^{-1}(a'_j))) = h_j^{-1}(g_{ij}(a'_i)(a'_j))$$

Равенство (7.3.2) соответствует равенству (7.2.3) для отображения r^{-1} . Следовательно, отображение r^{-1} является автоморфизмом диаграммы представлений (f, A) . \square

Базис диаграммы представлений универсальной алгебры

8.1. Множество образующих диаграммы представлений

Мы строим базис диаграммы представлений по той же схеме, что мы построили базис представления в секции 6.2.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.1.1. Пусть (f, A) - диаграмма представлений. Кортеж множеств

$$N = (N_{(1)} \subset A_{(1)}, \dots, N_{(n)} \subset A_{(n)}) = (N_1 \subset A_1, \dots, N_n \subset A_n)$$

называется **кортежем стабильных множеств диаграммы представлений** (f, A) , если

$$f_{ij}(a_i)(a_j) \in N_j \quad i, j = 1, \dots, n$$

для любых $a_1 \in N_1, \dots, a_n \in N_n$, при условии, что существует представление f_{ij} . Мы также будем говорить, что кортеж множеств

$$N = (N_{(1)} \subset A_{(1)}, \dots, N_{(n)} \subset A_{(n)}) = (N_1 \subset A_1, \dots, N_n \subset A_n)$$

стабилен относительно диаграммы представлений (f, A) . \square

ТЕОРЕМА 8.1.2. Пусть (f, A) - диаграмма представлений. Пусть множество $N_{(i)} \subset A_{(i)}$ является подалгеброй $\Omega_{(i)}$ -алгебры $A_{(i)}$, $(i) = (1), \dots, (n)$. Пусть кортеж множеств

$$N = (N_{(1)} \subset A_{(1)}, \dots, N_{(n)} \subset A_{(n)}) = (N_1 \subset A_1, \dots, N_n \subset A_n)$$

стабилен относительно диаграммы представлений (f, A) . Тогда существует диаграмма представлений

$$(8.1.1) \quad (N, f_N = (f_{N_{ij}}))$$

такая, что

$$f_{N_{ij}}(a_i) = f_{ij}(a_i)|_{N_j} \quad i = 1, \dots, n \quad j = 1, \dots, n$$

Диаграмма представлений (8.1.1) называется **подпредставлением** диаграммы представлений (f, A) .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть ω - m -арная операция Ω_i -алгебры A_i , $i = 1, \dots, n$. Тогда для любых $a_{i,1}, \dots, a_{i,m} \in N_i$ и любого $a_j \in N_j$

$$\begin{aligned} (f_{N_{ij}}(a_{i,1}) \dots f_{N_{ij}}(a_{i,m}) \omega)(a_j) &= (f_{ij}(a_{i,1}) \dots f_{ij}(a_{i,m}) \omega)(a_j) \\ &= f_{ij}(a_{i,1} \dots a_{i,m} \omega)(a_j) \\ &= f_{N_{ij}}(a_{i,1} \dots a_{i,m} \omega)(a_i) \end{aligned}$$

Пусть ω - m -арная операция Ω_j -алгебры A_j , $j = 1, \dots, n$. Тогда для любых $a_{j,1}, \dots, a_{j,m} \in N_j$ и любого $a_i \in N_i$

$$\begin{aligned} f_{N_{ij}}(a_i)(a_{j,1}) \dots f_{N_{ij}}(a_i)(a_{j,m})\omega &= f_{ij}(a_i)(a_{j,1}) \dots f_{ij}(a_i)(a_{j,m})\omega \\ &= f_{ij}(a_i)(a_{j,1} \dots a_{j,m}\omega) \\ &= f_{N_{ij}}(a_i)(a_{j,1} \dots a_{j,m}\omega) \end{aligned}$$

Утверждение теоремы доказано. \square

Из теоремы 8.1.2 следует, что если диаграммы представлений (8.1.1) являются диаграммой подпредставлений диаграммы представлений (f, A) , то отображение

$$(id_{(1)} : N_{(1)} \rightarrow A_{(1)}, \dots, id_{(n)} : N_{(n)} \rightarrow A_{(n)})$$

является морфизмом диаграмм представлений.

ТЕОРЕМА 8.1.3. Множество^{8.1} $\mathcal{B}[f, A]$ всех диаграмм подпредставлений диаграммы представлений (f, A) порождает систему замыканий на диаграмме представлений (f, A) и, следовательно, является полной структурой.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть для данного $\lambda \in \Lambda$,

$$K_\lambda = (K_{\lambda,(1)} \subset A_{(1)}, \dots, K_{\lambda,(n)} \subset A_{(n)})$$

кортеж множеств, стабильных относительно диаграммы представлений (f, A) . Операцию пересечения на множестве $\mathcal{B}[f, A]$ мы определим согласно правилу

$$\bigcap f_{K_{\lambda ij}} = f_{\bigcap K_{\lambda ij}} \quad i, j = 1, \dots, n$$

$$\bigcap K_\lambda = \left(K_{(1)} = \bigcap K_{\lambda,(1)}, \dots, K_{(n)} = \bigcap K_{\lambda,(n)} \right)$$

$\bigcap K_{\lambda,(i)}$ - подалгебра $\Omega_{(i)}$ -алгебры $A_{(i)}$. Пусть

$$a_j \in \bigcap K_{\lambda,j} = \bigcap K_{\lambda,(j)}$$

Для любого $\lambda \in \Lambda$ и для любого $a_i \in K_i = K_{(i)}$

$$f_{ij}(a_i)(a_j) \in K_{\lambda,j} = K_{\lambda,(j)}$$

Следовательно,

$$f_{ij}(a_i)(a_j) \in K_j = K_{(j)}$$

Следовательно, операция пересечения диаграмм подпредставлений определена корректно. \square

Обозначим соответствующий оператор замыкания через $J[f]$. Если

$$X = (X_{(1)} \subset A_{(1)}, \dots, X_{(n)} \subset A_{(n)}) = (X_1 \subset A_1, \dots, X_n \subset A_n)$$

кортеж множеств, то

$$J[f, X] = (J_{(1)}[f, X], \dots, J_{(n)}[f, X]) = (J_1[f, X], \dots, J_n[f, X])$$

является пересечением всех кортежей

$$K = (K_{(1)} \subset A_{(1)}, \dots, K_{(n)} \subset A_{(n)}) = (K_1 \subset A_1, \dots, K_n \subset A_n)$$

стабильных относительно диаграммы представлений (f, A) и таких, что для $(i) = (1), \dots, (n)$, $K_{(i)}$ - подалгебра $\Omega_{(i)}$ -алгебры $A_{(i)}$, содержащая $X_{(i)}$.

^{8.1}Эта теорема аналогична определению структуры подалгебр ([14], стр. 93, 94)

ТЕОРЕМА 8.1.4. Пусть ^{8.2} (f, A) - диаграмма представлений. Пусть

$$X = (X_{(1)} \subset A_{(1)}, \dots, X_{(n)} \subset A_{(n)}) = (X_1 \subset A_1, \dots, X_n \subset A_n)$$

Для каждого значения (i) , $(i) = (1), \dots, (n)$, определим подмножества $X_{(i)k} \subset A_{(i)}$ индукцией по k .

$$8.1.4.1: X_{(i)0} = X_{(i)}$$

$$8.1.4.2: x \in X_{(i)k} \Rightarrow x \in X_{(i)k+1}$$

$$8.1.4.3: x_1 \in X_{(i)k}, \dots, x_p \in X_{(i)k}, \omega \in \Omega_{(i)}(p) \Rightarrow x_1 \dots x_p \omega \in X_{(i)k+1}$$

$$8.1.4.4: x_i \in X_{ik} = X_{(i)k}, x_j \in X_{jk} = X_{(j)k} \Rightarrow f_{ji}(x_j)(x_i) \in X_{(i)k+1}$$

Для каждого значения (i) положим

$$Y_{(i)} = \bigcup_{m=0}^{\infty} X_{(i)m}$$

Тогда

$$J_{(i)}[f, X] = Y_{(i)} \quad (i) = (1), \dots, (n)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Для каждого значения (i) доказательство теоремы совпадает с доказательством теоремы 6.1.4. \square

$J[f, X]$ называется **подпредставлением** диаграммы представлений (f, A) , порождённым кортежем множеств X , а X - **множеством образующих** диаграммы представлений $J[f, X]$. В частности, множество образующих диаграммы представлений (f, A) будет такой кортеж

$$X = (X_{(1)} \subset A_{(1)}, \dots, X_{(n)} \subset A_{(n)}) = (X_1 \subset A_1, \dots, X_n \subset A_n)$$

что $J[f, X] = A$.

Из теоремы 8.1.4 следует следующее определение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.1.5. Пусть

$$X = (X_{(1)} \subset A_{(1)}, \dots, X_{(n)} \subset A_{(n)}) = (X_1 \subset A_1, \dots, X_n \subset A_n)$$

кортеж множеств. Для любого кортежа A -чисел $a \in J[f, X]$

$$a = (a_{(1)} \dots a_{(n)}) = (a_1 \dots a_n)$$

существует кортеж Ω -слов

$$\begin{aligned} w[f, X, a] &= (w_{(1)}[f, X, a_{(1)}], \dots, w_{(n)}[f, X, a_{(n)}]) \\ &= (w_1[f, X, a_1], \dots, w_n[f, X, a_n]) \end{aligned}$$

определённых согласно следующему правилу.

8.1.5.1: Если $a_{(i)} \in X_{(i)}$, $(i) = (1), \dots, (n)$, то $a_{(i)}$ - $\Omega_{(i)}$ -слово

$$w_{(i)}[f, X, a_{(i)}] = a_{(i)}$$

8.1.5.2: Если $a_{(i)1}, \dots, a_{(i)p}$ - $\Omega_{(i)}$ -слова, $(i) = (1), \dots, (n)$, и $\omega \in \Omega_{(i)}(p)$, то $a_{(i)1} \dots a_{(i)p} \omega$ - $\Omega_{(i)}$ -слово.

8.1.5.3: Пусть $a_i = a_{(i)}$ - $\Omega_{(i)}$ -слово, $a_j = a_{(j)}$ - $\Omega_{(j)}$ -слово. Пусть существует представление f_{ij} . Тогда $f_{ij}(a_i)(a_j)$ - $\Omega_{(j)}$ -слово.

Обозначим $w[f, X]$ множество кортежей Ω -слов диаграммы представлений $J[f, X]$. \square

^{8.2} Утверждение теоремы аналогично утверждению теоремы 5.1, [14], стр. 94.

Мы рассматриваем кортеж A -чисел в определении 8.1.5, так как нам нужен алгоритм формирования кортежа Ω -слов. Однако при решении конкретных задач нам может понадобиться только некоторое подмножество кортежа A -чисел. Например, в аффинном пространстве мы можем рассматривать либо множество точек, либо множество векторов.

Выбор $\Omega_{(i)}$ -слова относительно множества образующих X неоднозначен. Поэтому, если $\Omega_{(i)}$ -число имеет различные $\Omega_{(i)}$ -слова, то мы, чтобы их отличать, будем пользоваться индексами: $w_{(i)}[f, X, m]$, $w_{(i)1}[f, X, m]$, $w_{(i)2}[f, X, m]$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.1.6. *Множество образующих X диаграммы представлений (f, A) порождает кортеж отношений эквивалентности*

$$\begin{aligned}\rho[f, X] &= (\rho_{(1)}[f, X], \dots, \rho_{(n)}[f, X]) \\ \rho_{(i)}[f, X] &= \{(w_{(i)}[f, X, m_{(i)}], w_{(i)1}[f, X, m_{(i)}]) : m_{(i)} \in A_{(i)}\}\end{aligned}$$

на множестве кортежей Ω -слов. \square

Согласно определению 8.1.6, два $\Omega_{(i)}$ -слова относительно множества образующих X диаграммы представлений (f, A) эквивалентны тогда и только тогда, когда они соответствуют одному и тому же $A_{(i)}$ -числу. Когда мы будем записывать равенство двух $\Omega_{(i)}$ -слов относительно множества образующих X диаграммы представлений (f, A) , мы будем иметь в виду, что это равенство верно с точностью до отношения эквивалентности $\rho_{(i)}[f, X]$.

Мы будем пользоваться записью

$$r(a) = (r_{(1)}(a_{(1)}), \dots, r_{(n)}(a_{(n)}))$$

для образа кортежа элементов $a = (a_{(1)}, \dots, a_{(n)})$ при морфизме диаграммы представлений.

ТЕОРЕМА 8.1.7. *Пусть X - множество образующих диаграммы представлений (f, A) . Пусть Y - множество образующих диаграммы представлений (g, B) . Морфизм r диаграммы представлений (f, A) порождает отображение Ω -слов*

$$\begin{aligned}w[f \rightarrow g, X, Y, r] : w[f, X] &\rightarrow w[g, Y] \\ X_{(i)} \subset A_{(i)} \quad Y_{(i)} &= r_{(i)}(X_{(i)}) \quad (i) = (1), \dots, (n)\end{aligned}$$

такое, что для любого (i) , $(i) = (1), \dots, (n)$,

8.1.7.1: Если $a_{(i)} \in X_{(i)}$, $a'_{(i)} = r_{(i)}(a_{(i)})$, то

$$w_{(i)}[f \rightarrow g, X, Y, r](a_{(i)}) = a'_{(i)}$$

8.1.7.2: Если

$$a_{(i)1}, \dots, a_{(i)p} \in w_{(i)}[f, X]$$

$$a'_{(i)1} = w_{(i)}[f \rightarrow g, X, Y, r](a_{(i)1}) \quad \dots \quad a'_{(i)p} = w_{(i)}[f \rightarrow g, X, Y, r](a_{(i)p})$$

то для операции $\omega \in \Omega_{(i)}(p)$ справедливо

$$w_{(i)}[f \rightarrow g, X, Y, r](a_{(i),1} \dots a_{(i),p} \omega) = a'_{(i),1} \dots a'_{(i),p} \omega$$

8.1.7.3: Если

$$a_i = a_{(i)} \in w_{(i)}[f, X] \quad a'_{(i)} = w_{(i)}[f \rightarrow g, X, Y, r](a_{(i)})$$

$$a_j = a_{(j)} \in w_{(j)}[f, X] \quad a'_j = a'_{(j)} = w_{(j)}[f, X, r](a_{(j)})$$

то

$$w_{(i)}[f \rightarrow g, X, Y, r](f_{ji}(a_j)(a_i)) = g_{ji}(a'_j)(a'_i)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Утверждения 8.1.7.1, 8.1.7.2 справедливы в силу определения морфизма r . Утверждение 8.1.7.3 следует из равенства (7.2.3). \square

ЗАМЕЧАНИЕ 8.1.8. Пусть r - морфизм диаграммы представлений (f, A) в диаграмму представлений (g, B) . Пусть

$$a \in J[f, X] \quad a' = r(a) \quad Y = r(X)$$

Теорема 8.1.7 утверждает, что $a' \in J[g, Y]$. Теорема 8.1.7 также утверждает, что кортеж Ω -слов, представляющий a относительно X , и кортеж Ω -слов, представляющий a' относительно Y , формируются согласно одному и тому же алгоритму. Это позволяет рассматривать кортеж Ω -слов $w[g, Y, a']$ как кортеж отображений

$$W[f, X, a] = (W_{(1)}[f, X, a], \dots, W_{(n)}[f, X, a]) = (W_1[f, X, a], \dots, W_n[f, X, a])$$

$$(8.1.2) \quad W_{(k)}[f, X, a] : (g, X') \rightarrow (g, X') \circ W_{(k)}[f, X, a] = w_{(k)}[g, X', a']$$

Если $f = g$, то вместо отображения (8.1.2) мы будем рассматривать отображение

$$W_{(k)}[f, X, a] : Y \rightarrow Y \circ W_{(k)}[f, X, a] = w_{(k)}[f, Y, a']$$

$$W_{(k)}[f, X, a](Y) = Y \circ W_{(k)}[f, X, a]$$

такое, что, если для некоторого морфизма r

$$Y = r(X) \quad a' = r(a)$$

то

$$W_{(k)}[f, X, a](Y) = Y \circ W[f, X, a] = w[f, Y, a'] = a'$$

Отображение $W_{(k)}[f, X, a]$ называется **координатами** $A_{(k)}$ -числа $a_{(k)}$ относительно кортежа множеств X . Аналогично, мы можем рассмотреть координаты множества $B \subset J_{(k)}[f, X]$ относительно множества X

$$W_{(k)}[f, X, B] = \{W_{(k)}[f, X, a] : a \in B\} = (W_{(k)}[f, X, a], a \in B)$$

Обозначим

$$W[f, X] = (W_{(1)}[f, X], \dots, W_{(n)}[f, X]) = (W_1[f, X], \dots, W_n[f, X])$$

$$W_{(k)}[f, X] = \{W_{(k)}[f, X, a] : a \in J_{(k)}[f, X]\} = (W_{(k)}[f, X, a], a \in J_{(k)}[f, X])$$

множество координат представления $J[f, X]$. \square

ТЕОРЕМА 8.1.9. На множестве координат $W_{(k)}[f, X]$ определена структура $\Omega_{(k)}$ -алгебры.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\omega \in \Omega_{(k)}(n)$. Тогда для любых $m_1, \dots, m_n \in J_{(k)}[f, X]$ положим

$$(8.1.3) \quad W_{(k)}(f, X, m_1) \dots W_{(k)}(f, X, m_n) \omega = W_{(k)}(f, X, m_1 \dots m_n \omega)$$

Согласно замечанию 8.1.8, из равенства (8.1.3) следует

$$(8.1.4) \quad \begin{aligned} X \circ (W_{(k)}[f, X, m_1] \dots W_{(k)}[f, X, m_n] \omega) &= X \circ W_{(k)}[f, X, m_1 \dots m_n \omega] \\ &= w_{(k)}[f, X, m_1 \dots m_n \omega] \end{aligned}$$

Согласно правилу 8.1.5.2, из равенства (8.1.4) следует

$$(8.1.5) \quad \begin{aligned} &X \circ (W_{(k)}[f, X, m_1] \dots W_{(k)}[f, X, m_n] \omega) \\ &= w_{(k)}[f, X, m_1] \dots w_{(k)}[f, X, m_n] \omega \\ &= (X \circ W_{(k)}[f, X, m_1]) \dots (X \circ W_{(k)}[f, X, m_n]) \omega \end{aligned}$$

Из равенства (8.1.5) следует корректность определения (8.1.3) операции ω на множестве координат $W_{(k)}[f, X]$. \square

ТЕОРЕМА 8.1.10. Если определено представление f_{jk} Ω_j -алгебры A_j в Ω_k -алгебре A_k , то определено представление F_{jk} Ω_j -алгебры $W_j[f, X]$ в Ω_k -алгебре $W_k[f, X]$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $a_j \in J_j[f, X]$. Тогда для любого $a_k \in J_k[f, X]$, положим

$$(8.1.6) \quad F_{jk}(W_j[f, X, a_j])(W_k[f, X, a_k]) = W_k[f, X, f_{jk}(a_j)(a_k)]$$

Согласно замечанию 8.1.8, из равенства (8.1.6) следует

$$(8.1.7) \quad \begin{aligned} X \circ (F_{jk}(W_j[f, X, a_j])(W_k[f, X, a_k])) &= X \circ W_k[f, X, f_{jk}(a_j)(a_k)] \\ &= w_k[f, X, f_{jk}(a_j)(a_k)] \end{aligned}$$

Согласно правилу 8.1.5.3, из равенства (8.1.7) следует

$$(8.1.8) \quad \begin{aligned} &X \circ (F_{jk}(W_j[f, X, a_j])(W_k[f, X, a_k])) \\ &= f_{jk}(w_j[f, X, a_j])(w_k[f, X, a_k]) \\ &= f_{jk}(X \circ W_j(f, X, a_j))(X \circ W_k(f, X, a_k)) \end{aligned}$$

Из равенства (8.1.8) следует корректность определения (8.1.6) представления Ω_j -алгебры $W_j[f, X]$ в Ω_k -алгебре $W_k[f, X]$. \square

СЛЕДСТВИЕ 8.1.11. Кортёж Ω -алгебр

$$W[f, X] = (W_{(1)}[f, X], \dots, W_{(n)}[f, X])$$

и множество представлений F порождает диаграмму представлений $(F, W[f, X])$. \square

ТЕОРЕМА 8.1.12. Пусть $(f, A), (g, B)$ - диаграммы представлений. Для заданных множеств $X_{(k)} \subset A_{(k)}, Y_{(k)} \subset B_{(k)}, (k) = (1), \dots, (n)$, рассмотрим кортеж отображений

$$R = (R_{(1)}, \dots, R_{(n)})$$

таких, что для любого $(k), (k) = (1), \dots, (n)$, отображение

$$R_{(k)} : X_{(k)} \rightarrow Y_{(k)}$$

согласовано со структурой диаграммы представлений, т. е.

$$(8.1.9) \quad \begin{cases} \omega \in \Omega_{(k)}(p), x_{(k)1}, \dots, x_{(k)p}, x_{(k)1} \dots x_{(k)p} \omega \in X_{(k)}, \\ R_{(k)}(x_{(k)1} \dots x_{(k)p} \omega) \in Y_{(k)} \\ \Rightarrow R_{(k)}(x_{(k)1} \dots x_{(k)p} \omega) = R_{(k)}(x_{(k)1}) \dots R_{(k)}(x_{(k)p}) \omega \end{cases}$$

$$(8.1.10) \quad \begin{cases} a_j \in X_j, a_k \in X_k, R_k(f_{jk}(a_j)(a_k)) \in Y_k \\ \Rightarrow R_k(f_{jk}(a_j)(a_k)) = g_{jk}(R_j(a_j))(R_k(a_k)) \end{cases}$$

Рассмотрим кортеж отображений Ω -слов

$$w_{(k)}[f \rightarrow g, \bar{e}, Y, R] : w_{(k)}[f, \bar{e}] \rightarrow w_{(k)}[g, Y]$$

удовлетворяющее условиям 8.1.7.1, 8.1.7.2, 8.1.7.3, и такое, что

$$e_{(k)i} \in \bar{e}_{(k)} \Rightarrow w_{(k)}[f \rightarrow g, \bar{e}, Y, R](e_{(k)i}) = R_{(k)}(e_{(k)i})$$

Для каждого (k) , $(k) = (1), \dots, (n)$, существует гомоморфизм $\Omega_{(k)}$ -алгебры

$$r_{(k)} : A_{(k)} \rightarrow B_{(k)}$$

определённый правилом

$$(8.1.11) \quad r_{(k)}(a_{(k)}) = w_{(k)}[f \rightarrow g, X, Y, R](w_{(k)}[f, X, a_{(k)}])$$

Кортеж гомоморфизмов

$$r = (r_{(1)} \dots r_{(n)}) = (r_1 \dots r_n)$$

является морфизмом диаграмм представлений $J[f, X]$ и $J[g, Y]$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Для любого (k) , $(k) = (1), \dots, (n)$, рассмотрим отображение

$$r_{(k)} : A_{(k)} \rightarrow B_{(k)}$$

ЛЕММА 8.1.13. Для любого (k) , $(k) = (1), \dots, (n)$, на множестве $X_{(k)}$ отображения $r_{(k)}$ и $R_{(k)}$ совпадают, и отображение $r_{(k)}$ согласовано со структурой $\Omega_{(k)}$ -алгебры.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Если

$$(8.1.12) \quad w_{(k)}[f, X, a_{(k)}] = a_{(k)}$$

то $a_{(k)} \in X_{(k)}$. Согласно условию 8.1.7.1, равенство

$$(8.1.13) \quad \begin{aligned} r_{(k)}(a_{(k)}) &= w_{(k)}[f \rightarrow g, X, Y, R](w_{(k)}[f, X, a_{(k)}]) = w_{(k)}[f \rightarrow g, X, Y, R](a_{(k)}) \\ &= R_{(k)}(a_{(k)}) \end{aligned}$$

является следствием равенств (8.1.11), (8.1.12). Лемма является следствием равенства (8.1.13). \odot

ЛЕММА 8.1.14. Пусть $\omega \in \Omega_{(k)}(p)$.

$$(8.1.14) \quad r_{(k)}(x_{(k)1} \dots x_{(k)p} \omega) = r_{(k)}(x_{(k)1}) \dots r_{(k)}(x_{(k)p}) \omega$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Мы будем доказывать лемму индукцией по сложности $\Omega_{(k)}$ -слова.

Если

$$x_{(k)1}, \dots, x_{(k)p}, x_{(k)1} \dots x_{(k)p} \omega \in X_{(k)}$$

то равенство (8.1.14) является следствием утверждения (8.1.9).

Пусть предположение индукции верно для

$$a_{(k)1}, \dots, a_{(k)p} \in J_{(k)}[f, X]$$

Пусть

$$(8.1.15) \quad w_{(k)1} = w_{(k)}[f, X, a_{(k)1}] \quad \dots \quad w_{(k)p} = w_{(k)}[f, X, a_{(k)p}]$$

Согласно предположению индукции, равенство

$$(8.1.16) \quad \begin{aligned} r_{(k)}(a_{(k)1}) &= w_{(k)}[f \rightarrow g, X, Y, R](w_{(k)1}) \\ &\dots = \dots \end{aligned}$$

$$r_{(k)}(a_{(k)p}) = w_{(k)}[f \rightarrow g, X, Y, R](w_{(k)p})$$

является следствием равенств (8.1.11), (8.1.15). Если

$$(8.1.17) \quad a_{(k)} = a_{(k)1} \dots a_{(k)p} \omega$$

то согласно условию 8.1.5.2,

$$w_{(k)}[f, X, a_{(k)}] = w_{(k)1} \dots w_{(k)p} \omega$$

Согласно условию 8.1.7.2, равенство

$$(8.1.18) \quad \begin{aligned} r_{(k)}(a_{(k)}) &= w_{(k)}[f \rightarrow g, X, Y, R](w_{(k)}[f, X, a_{(k)}]) \\ &= w_{(k)}[f \rightarrow g, X, Y, R](w_{(k)1} \dots w_{(k)p} \omega) \\ &= w_{(k)}[f \rightarrow g, X, Y, R](w_{(k)1}) \dots w_{(k)}[f \rightarrow g, X, Y, R](w_{(k)p}) \omega \\ &= (r_{(k)}(a_{(k)1})) \dots (r_{(k)}(a_{(k)p})) \omega \end{aligned}$$

является следствием равенств (8.1.11), (8.1.17), (8.1.16). Равенство (8.1.14) является следствием равенства (8.1.18). \odot

Согласно лемме 8.1.13, отображения $r_{(k)}$ и $R_{(k)}$ совпадают на множестве $X_{(k)}$. Согласно лемме 8.1.14, отображение $r_{(k)}$ является гомоморфизмом $\Omega_{(k)}$ -алгебры $A_{(k)}$ в $\Omega_{(k)}$ -алгебру $B_{(k)}$. Для доказательства теоремы достаточно показать, что если существует представление

$$f_{ji} : A_j \xrightarrow{*} A_i$$

то пара отображений $(r_j \ r_i)$ является морфизмом представлений из f_{ji} в g_{ji} (определение 7.2.1).

Мы будем доказывать теорему индукцией по сложности Ω_i -слова.

Если $a_i \in X_i, a_j \in X_j$, то предположение индукции является следствием утверждения (8.1.10)

Пусть предположение индукции верно для

$$a_j \in J_j[f, X] \quad w_j[f, X, a_j] = m_j$$

$$a_i \in J_i[f, X] \quad w_i[f, X, a_i] = m_i$$

Согласно условию 8.1.5.3,

$$(8.1.19) \quad w_i(f, X, f_{ji}(a_j)(a_i)) = f_{ji}(m_j)(m_i)$$

Согласно условию 8.1.7.3, равенство

$$\begin{aligned}
 (8.1.20) \quad r_i(f_{ji}(a_j)(a_i)) &= w_i[f \rightarrow g, X, Y, R](w_i[f, X, f_{ji}(a_j)(a_i)]) \\
 &= w_i[f \rightarrow g, X, Y, R](f_{ji}(m_j)(m_i)) \\
 &= g_{ji}(w_j[g, Y, r_j(a_j)])(w_i[g, Y, r_i(a_i)]) \\
 &= g_{ji}(r_j(a_j))(r_i(a_i))
 \end{aligned}$$

является следствием равенств (8.1.11), (8.1.19), Из равенств (7.2.3), (8.1.20) следует, что отображение r является морфизмом диаграммы представлений (f, A) . \square

ЗАМЕЧАНИЕ 8.1.15. Теорема 8.1.12 - это теорема о продолжении отображения. Единственное, что нам известно о кортеже множеств X - это то, что X - кортеж множеств образующих диаграммы представлений (f, A) . Однако, между элементами множества $X_{(k)}$, $(k) = (1), \dots, (n)$, могут существовать соотношения, порождённые либо операциями $\Omega_{(k)}$ -алгебры $A_{(k)}$, либо преобразованиями представления f_{jk} . Поэтому произвольное отображение кортежа множеств X , вообще говоря, не может быть продолжено до эндоморфизма диаграммы представлений (f, A) .^{8.3} Однако, если для каждого (k) , $(k) = (1), \dots, (n)$, отображение $R_{(k)}$ согласованно со структурой диаграммы представлений, то мы можем построить продолжение этого отображения, которое является морфизмом диаграммы представлений (f, A) . \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.1.16. Пусть X - кортеж множеств образующих диаграммы представлений (f, A) . Пусть Y - кортеж множеств образующих диаграммы представлений (g, B) . Пусть r - морфизм диаграммы представлений (f, A) в диаграмму представлений (g, B) . Множество координат $W[g, Y, r(X)]$ называется **координатами морфизма диаграммы представлений**. \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.1.17. Пусть X - кортеж множеств образующих диаграммы представлений (f, A) . Пусть Y - кортеж множеств образующих диаграммы представлений (g, B) . Пусть r - морфизм диаграммы представлений (f, A) в диаграмму представлений (g, B) . Пусть для $(k) = (1), \dots, (n)$, $a_{(k)} \in A_{(k)}$. Мы определим **суперпозицию координат морфизма r диаграммы представлений и $A_{(k)}$ -числа $a_{(k)}$** как координаты, определённые согласно правилу

$$(8.1.21) \quad W_{(k)}[g, Y, r_{(k)}(X_{(k)})] \circ W_{(k)}[f, X, a_{(k)}] = W_{(k)}[g, Y, r_{(k)}(a_{(k)})]$$

Пусть $Y_{(k)} \subset A_{(k)}$. Мы определим **суперпозицию координат морфизма r диаграммы представлений и множества $Y_{(k)}$** согласно правилу

$$\begin{aligned}
 (8.1.22) \quad &W_{(k)}[g, Y, r_{(k)}(X_{(k)})] \circ W_{(k)}[f, X, Y_{(k)}] \\
 &= (W_{(k)}[g, Y, r_{(k)}(X_{(k)})] \circ W_{(k)}[f, X, a_{(k)}], a_{(k)} \in Y_{(k)}
 \end{aligned}$$

\square

^{8.3} В теореме 8.2.9, требования к кортежу множеств образующих более жёсткие. Поэтому теорема 8.2.9 говорит о продолжении произвольного отображения. Более подробный анализ дан в замечании 8.2.11.

ТЕОРЕМА 8.1.18. *Морфизм r диаграммы представлений (f, A) в диаграмму представлений (g, B) порождает отображение координат диаграммы представлений*

$$(8.1.23) \quad W_{(k)}[f \rightarrow g, X, Y, r] : W_{(k)}[f, X] \rightarrow W_{(k)}[g, Y]$$

$(k) = (1), \dots, (n)$, такое, что

$$(8.1.24) \quad \begin{aligned} W_{(k)}[f, X, a] &\rightarrow W_{(k)}[f \rightarrow g, X, Y, r] \circ W_{(k)}[f, X, a_{(k)}] \\ &= W_{(k)}[g, Y, r_{(k)}(a_{(k)})] \end{aligned}$$

$$(8.1.25) \quad \begin{aligned} &W_{(k)}[f \rightarrow g, X, Y, r] \circ W_{(k)}[f, X, a_{(k)}] \\ &= W_{(k)}[g, Y, r_{(k)}(X_{(k)})] \circ W_{(k)}[f, X, a_{(k)}] \end{aligned}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно замечанию 8.1.8, мы можем рассматривать равенства (8.1.21), (8.1.23) относительно заданного кортежа множеств образующих X . При этом координатам $W_{(k)}[f, X, a_{(k)}]$ соответствует кортеж слов

$$(8.1.26) \quad X \circ W_{(k)}[f, X, a_{(k)}] = w_{(k)}[f, X, a_{(k)}]$$

а координатам $W_{(k)}[g, Y, r_{(k)}(a_{(k)})]$ соответствует кортеж слов

$$(8.1.27) \quad Y \circ W_{(k)}[g, Y, r_{(k)}(a_{(k)})] = w_{(k)}[g, Y, r_{(k)}(a_{(k)})]$$

Поэтому для того, чтобы доказать теорему, нам достаточно показать, что отображению $W_{(k)}[f \rightarrow g, X, Y, r]$ соответствует отображение $w_{(k)}[f \rightarrow g, X, Y, r]$.

Мы будем доказывать теорему индукцией по сложности $\Omega_{(k)}$ -слова.

Если $a_{(k)} \in X_{(k)}$, $a'_{(k)} = r_{(k)}(a_{(k)})$, то, согласно равенствам (8.1.26), (8.1.27), отображения $W_{(k)}[f \rightarrow g, X, Y, r]$ и $w_{(k)}[f \rightarrow g, X, Y, r]$ согласованы.

Пусть для $a_{(k)1}, \dots, a_{(k)p} \in X_{(k)}$ отображения $W_{(k)}[f \rightarrow g, X, Y, r]$ и $w_{(k)}[f \rightarrow g, X, Y, r]$ согласованы. Пусть $\omega \in \Omega_{(k)}(p)$. Согласно теореме 6.1.12

$$(8.1.28) \quad W_{(k)}[f, X, a_{(k)1} \dots a_{(k)p} \omega] = W_{(k)}[f, X, a_{(k)1}] \dots W_{(k)}[f, X, a_{(k)p}] \omega$$

Так как отображение

$$r_{(k)} : A_{(k)} \rightarrow B_{(k)}$$

является гомоморфизмом $\Omega_{(k)}$ -алгебры, то из равенства (8.1.28) следует

$$(8.1.29) \quad \begin{aligned} &W_{(k)}[g, Y, r_{(k)}(a_{(k)1} \dots a_{(k)p} \omega)] \\ &= W_{(k)}[g, Y, (r_{(k)}(a_{(k)1}) \dots (r_{(k)}(a_{(k)p})) \omega] \\ &= W_{(k)}[g, Y, r_{(k)}(a_{(k)1})] \dots W_{(k)}[g, Y, r_{(k)}(a_{(k)p})] \omega \end{aligned}$$

Из равенств (8.1.28), (8.1.29) и предположения индукции следует, что отображения $W_{(k)}[f \rightarrow g, X, Y, r]$ и $w_{(k)}[f \rightarrow g, X, Y, r]$ согласованы для $a_{(k)} = a_{(k)1} \dots a_{(k)p} \omega$.

Пусть для $a_{j1} \in A_j$ отображения $W_j[f \rightarrow g, X, Y, r]$ и $w_j[f \rightarrow g, X, Y, r]$ согласованы. Пусть для $a_{i1} \in A_i$ отображения $W_i[f \rightarrow g, X, Y, r]$ и $w_i[f \rightarrow g, X, Y, r]$ согласованы. Согласно теореме 8.1.10

$$(8.1.30) \quad W_i(f, X, f_{ji}(a_j)(a_i)) = F_{ji}(W_j(f, X, a_j))(W_i(f, X, a_i))$$

Так как отображение (r_j, r_i) является морфизмом представления f_{ji} в представление F_{ji} , то из равенства (8.1.30) следует

$$(8.1.31) \quad \begin{aligned} W_i[g, Y, r_i(f_{ji}(a_j)(a_i))] &= W_i[g, Y, g_{ji}(r_j(a_j))(r_i(a_i))] \\ &= G_{ji}(W_j[g, Y, r_j(a_j)])(W_i[g, Y, r_i(a_{n,1})]) \end{aligned}$$

Из равенств (8.1.30), (8.1.31) и предположения индукции следует, что отображения $W_i[f \rightarrow g, X, Y, r]$ и $w_i[f \rightarrow g, X, Y, r]$ согласованы для $b_i = f_{ji}(a_j)(a_i)$. \square

СЛЕДСТВИЕ 8.1.19. Пусть X - кортеж множеств образующих диаграммы представлений (f, A) . Пусть Y - кортеж множеств образующих диаграммы представлений (g, B) . Пусть r - морфизм диаграммы представлений (f, A) в диаграмму представлений (g, B) . Отображение

$$W[f \rightarrow g, X, Y, r] = (W_{(1)}[f \rightarrow g, X, Y, r], \dots, W_{(n)}[f \rightarrow g, X, Y, r])$$

является морфизмом диаграммы представлений $(F, W[f, X])$ в диаграмму представлений $(G, W[g, Y])$. \square

В дальнейшем мы будем отождествлять отображение $W[f \rightarrow g, X, Y, r]$ и множество координат $W[g, Y, r(X)]$.

ТЕОРЕМА 8.1.20. Пусть X - кортеж множеств образующих диаграммы представлений (f, A) . Пусть Y - кортеж множеств образующих диаграммы представлений (g, B) . Пусть r - морфизм диаграммы представлений (f, A) в диаграмму представлений (g, B) . Пусть $Y' \subset A$. Тогда

$$(8.1.32) \quad W[g, Y, r(X)] \circ W[f, X, X'] = W[g, Y, r(X')]$$

$$(8.1.33) \quad W[f \rightarrow g, X, Y, r] \circ W[f, X, X'] = W[g, Y, r(X')]$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Равенство (8.1.32) является следствием равенства

$$r(X') = (r(a), a \in X')$$

а также равенств (8.1.21), (8.1.22). Равенство (8.1.33) является следствием равенств (8.1.32), (8.1.24). \square

ТЕОРЕМА 8.1.21. Пусть X - кортеж множеств образующих диаграммы представлений (f, A) . Пусть Y - кортеж множеств образующих диаграммы представлений (g, B) . Пусть Z - кортеж множеств образующих диаграммы представлений (h, C) . Пусть r - морфизм диаграммы представлений (f, A) в диаграмму представлений (g, B) . Пусть s - морфизм диаграммы представлений (g, B) в диаграмму представлений (h, C) . Тогда

$$(8.1.34) \quad W[h, Z, s(Y)] \circ W[g, Y, r(X)] = W[h, Z, (s \circ r)(X)]$$

$$(8.1.35) \quad W[g \rightarrow h, Y, Z, s] \circ W[f \rightarrow g, X, Y, r] = W[f \rightarrow h, X, Z, s \circ r]$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Равенство

$$(8.1.36) \quad W[h, Z, s(Y')] \circ W[g, Y, Y'] = W[h, z, s(Y')]$$

следует из равенства (8.1.32). Равенство (8.1.34) следует из равенства (8.1.36), если положить $Y' = r(X)$. Равенство (8.1.35) следует из равенства (8.1.34). \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.1.22. Мы можем обобщить определение суперпозиции координат и предположить, что один из множителей является кортежем множеств Ω -слов. Соответственно, определение суперпозиции координат имеет вид

$$W[g, Y, r(X)] \circ w[f, X, X'] = w[g, Y, r(X)] \circ W[f, X, X'] = w[g, Y, r(X')]$$

\square

Следующие формы записи образа кортежа множеств X' при морфизме r диаграммы представлений эквивалентны

$$(8.1.37) \quad \begin{aligned} r(X') &= r(X) \circ W[f, X, X'] \\ &= (Y \circ W[g, Y, r(X)]) \circ W[f, X, X'] \end{aligned}$$

Из равенств (8.1.32), (8.1.37) следует, что

$$(8.1.38) \quad \begin{aligned} &Y \circ (W[g, Y, r(X)] \circ W[f, X, X']) \\ &= (Y \circ W[g, Y, r(X)]) \circ W[f, X, X'] \end{aligned}$$

Равенство (8.1.38) является законом ассоциативности для операции композиции и позволяет записать выражение

$$Y \circ W[g, Y, r(X) \circ W[f, X, X']$$

без использования скобок.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.1.23. Пусть

$$X = (X_{(1)} \subset A_{(1)}, \dots, X_{(n)} \subset A_{(n)}) = (X_1 \subset A_1, \dots, X_n \subset A_n)$$

множество образующих диаграммы представлений (f, A) . Пусть отображение r является эндоморфизмом диаграммы представления (f, A) . Пусть кортеж множеств $Y = r(X)$ является образом кортежа множеств X при отображении r . Эндоморфизм r диаграммы представлений (f, A) называется невырожденным на кортеже множеств образующих X , если кортеж множеств Y является кортежем множеств образующих диаграммы представлений (f, A) . В противном случае, эндоморфизм r называется вырожденным на кортеже множеств образующих X . \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.1.24. Эндоморфизм r диаграммы представлений (f, A) называется **невырожденным**, если он невырожден на любом кортеже множеств образующих. В противном случае, эндоморфизм r называется **вырожденным**. \square

ТЕОРЕМА 8.1.25. Автоморфизм r диаграммы представлений (f, A) является невырожденным эндоморфизмом.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть X - кортеж множеств образующих диаграммы представлений (f, A) . Пусть $Y = r(X)$. Согласно теореме 8.1.18 эндоморфизм r порождает отображение Ω -слов $w[f \rightarrow g, X, Y, r]$. Пусть $a' \in A$. Так как r - автоморфизм, то существует $a \in A$, $r(a) = a'$. Согласно определению 8.1.5, $w[f, X, a]$ - кортеж Ω -слов, представляющих a относительно кортежа множеств образующих X . Согласно теореме 8.1.18, $w[f, X', a']$ - кортеж Ω -слов, представляющих a' относительно кортежа множеств Y

$$w[f, Y, a'] = w[f \rightarrow g, X, Y, r](w[f, X, a])$$

Следовательно, Y - множество образующих диаграммы представлений (f, A) . Согласно определению 8.1.24, автоморфизм r - невырожден. \square

8.2. Базис диаграммы представлений

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.2.1. Пусть (f, A) - диаграмма представлений и

$$\text{Gen}[f, A] = \{X = (X_{(1)}, \dots, X_{(n)}) : X_{(k)} \subseteq A_{(k)}, J_{(k)}[f, X] = A_{(k)}\}$$

Если для кортежа множеств $X \subset A_2$ верно $X \in \text{Gen}[f, A]$, то для любого кортежа множеств $Y, X_{(k)} \subset Y_{(k)} \subset A_{(k)}, (k) = (1), \dots, (n)$ также верно $Y \in \text{Gen}[f, A]$. Если существует минимальный кортеж множеств $X \in \text{Gen}[f, A]$, то такой кортеж множеств X называется **квазибазисом диаграммы представлений** (f, A) . \square

ТЕОРЕМА 8.2.2. Если кортеж множеств X является квазибазисом диаграммы представлений (f, A) , то, для любого $(k), (k) = (1), \dots, (n)$, и любого $t \in X_{(k)}$, кортеж множеств

$$X' = (X_{(1)}, \dots, X'_{(k)} = X_{(k)} \setminus \{t\}, \dots, X_{(n)})$$

не является множеством образующих диаграммы представлений (f, A) .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть X - квазибазис диаграммы представлений (f, A) . Допустим для некоторого $t \in X_{(k)}$ существует $\Omega_{(k)}$ -слово

$$w = w_{(k)}[f, X', t]$$

Рассмотрим $A_{(k)}$ -число t' , для которого $\Omega_{(k)}$ -слово $w' = w_{(k)}[f, X, t']$ зависит от t . Согласно определению 8.1.5, любое вхождение $A_{(k)}$ -числа t в $\Omega_{(k)}$ -слово w' может быть заменено $\Omega_{(k)}$ -словом w . Следовательно, $\Omega_{(k)}$ -слово w' не зависит от t , а кортеж множеств X' является множеством образующих диаграммы представлений (f, A) . Следовательно, X не является квазибазисом диаграммы представлений (f, A) . \square

ЗАМЕЧАНИЕ 8.2.3. Доказательство теоремы 8.2.2 даёт нам эффективный метод построения квазибазиса диаграммы представлений (f, A) . Квазибазис диаграммы представлений определён индукцией по диаграмме представлений. Мы начинаем строить квазибазис в Ω -алгебрах из множества $A_{[0]}$. Когда квазибазис построен в Ω -алгебрах из множества $A_{[i]}$, мы можем перейти к построению квазибазиса в Ω -алгебрах из множества $A_{[i+1]}$. \square

Для каждого $(k), (k) = (1), \dots, (n)$, мы ввели $\Omega_{(k)}$ -слово $A_{(k)}$ -числа x относительно множества образующих X в определении 8.4 8.1.5. Из теоремы 8.2.2 следует, что если множество образующих X не является квазибазисом, то выбор $\Omega_{(k)}$ -слова относительно множества образующих X неоднозначен. Но даже если множество образующих X является квазибазисом, то представление $t \in A_{(k)}$ в виде $\Omega_{(k)}$ -слова неоднозначно.

ЗАМЕЧАНИЕ 8.2.4. Существует три источника неоднозначности в записи $\Omega_{(k)}$ -слова.

8.2.4.1: В $\Omega_{(k)}$ -алгебре $A_{(k)}, (k) = (1), \dots, (n)$, могут быть определены равенства. Например, если e - единица мультипликативной группы $A_{(k)}$, то верно равенство

$$ae = a$$

для любого $a \in A_{(k)}$.

^{8.4} Рассуждения в начале этого раздела естественно повторяют рассуждения в начале раздела 6.2 и я сохранил эти рассуждения для полноты текста.

8.2.4.2: Неоднозначность выбора $\Omega_{(k)}$ -слова может быть связана со свойствами представления. Например, допустим существует представление f_{ik} Ω_i -алгебры A_i в Ω_k -алгебре A_k . Если m_1, \dots, m_n - Ω_k -слова, $\omega \in \Omega_k(n)$ и a - Ω_i -слово, то ^{8.5}

$$(8.2.1) \quad f_{ik}(a)(m_1 \dots m_n \omega) = (f_{ik}(a)(m_1)) \dots (f_{ik}(a)(m_n)) \omega$$

В то же время, если ω является операцией Ω_i -алгебры A_i и операцией Ω_k -алгебры A_k , то мы можем потребовать, что Ω_k -слова $f(a_1 \dots a_n \omega)(x)$ и $(f(a_1)(x)) \dots (f(a_n)(x)) \omega$ описывают один и тот же элемент Ω_k -алгебры A_k . ^{8.6}

$$(8.2.2) \quad f(a_1 \dots a_n \omega)(x) = (f(a_1)(x)) \dots (f(a_n)(x)) \omega$$

8.2.4.3: Равенства вида (8.2.1), (8.2.2) сохраняются при морфизме диаграммы представлений. Поэтому мы можем игнорировать эту форму неоднозначности записи $\Omega_{(k)}$ -слова. Однако возможна принципиально другая форма неоднозначности, пример которой можно найти в теоремах 9.3.15, 9.3.16.

Таким образом, мы видим, что на множестве $\Omega_{(k)}$ -слов можно определить различные отношения эквивалентности. ^{8.7} Наша задача - найти максимальное отношение эквивалентности на множестве $\Omega_{(k)}$ -слов, которое сохраняется при морфизме представления.

Аналогичное замечание касается отображения $W[f, X, t]$, определённого в замечании 8.1.8. ^{8.8} □

^{8.5} Например, пусть $\{e_1, e_2\}$ - базис векторного пространства над полем k . Равенство (8.2.1) принимает форму закона дистрибутивности

$$a(b^1 e_1 + b^2 e_2) = (ab^1) e_1 + (ab^2) e_2$$

^{8.6} Для векторного пространства это требование принимает форму закона дистрибутивности

$$(a + b) e_1 = a e_1 + b e_1$$

^{8.7} Очевидно, что каждое из равенств (8.2.1), (8.2.2) порождает некоторое отношение эквивалентности.

^{8.8} Если базис векторного пространства - конечен, то мы можем представить базис в виде матрицы строки

$$\bar{e} = (e_1 \quad \dots \quad e_n)$$

Мы можем представить отображение $W[f, \bar{e}](v)$ в виде матрицы столбца

$$W[f, \bar{e}, v] = \begin{pmatrix} v^1 \\ \dots \\ v^n \end{pmatrix}$$

Тогда

$$W[f, \bar{e}, v](\bar{e}') = W[f, \bar{e}, v] \begin{pmatrix} e'_1 & \dots & e'_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v^1 \\ \dots \\ v^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e'_1 & \dots & e'_n \end{pmatrix}$$

имеет вид произведения матриц.

ТЕОРЕМА 8.2.5. Пусть X - квазибазис диаграммы представлений (f, A) . Рассмотрим кортеж отношений эквивалентности

$$\lambda[f, X] = (\lambda_{(1)}[f, X], \dots, \lambda_{(n)}[f, X])$$

$$\lambda_{(k)}[f, X] \subseteq w_{(k)}[f, X] \times w_{(k)}[f, X]$$

которое порождено исключительно следующими утверждениями.

8.2.5.1: Если в $\Omega_{(k)}$ -алгебре $A_{(k)}$ существует равенство

$$w_{(k)1}[f, X, m] = w_{(k)2}[f, X, m]$$

определяющее структуру $\Omega_{(k)}$ -алгебры, то

$$(w_{(k)1}[f, X, m], w_{(k)2}[f, X, m]) \in \lambda_{(k)}[f, X]$$

8.2.5.2: Если существует представление f_{ik} и в Ω_i -алгебре A_i существует равенство

$$w_{i1}[f, X, m] = w_{i2}[f, X, m]$$

определяющее структуру Ω_i -алгебры, то

$$(f_{ik}(w_{i1})(w_k[f, X, m]), f_{ik}(w_{i2})(w_k[f, X, m])) \in \lambda_k[f, X]$$

8.2.5.3: Если существует представление f_{ik} , то для любой операции $\omega \in \Omega_i(n)$,

$$(f_{ik}(a_{i1} \dots a_{in} \omega)(a_2), (f_{ik}(a_{i1}) \dots f_{ik}(a_{in}) \omega)(a_2)) \in \lambda_k[f, X]$$

8.2.5.4: Если существует представление f_{ik} , то для любой операции $\omega \in \Omega_k(n)$,

$$(f_{ik}(a_i)(a_{k1} \dots a_{kn} \omega), f_{ik}(a_i)(a_{k1}) \dots f_{ik}(a_i)(a_{kn}) \omega) \in \lambda_k[f, X]$$

8.2.5.5: Если существует представление f_{ik} , $\omega \in \Omega_i(n) \cap \Omega_k(n)$ и представление f_{ik} удовлетворяет равенству^{8.9}

$$f(a_{i1} \dots a_{in} \omega)(a_k) = (f(a_{i1})(a_k)) \dots (f(a_{in})(a_k)) \omega$$

то мы можем предположить, что верно равенство

$$(f(a_{i1} \dots a_{in} \omega)(a_k), (f(a_{i1})(a_k)) \dots (f(a_{in})(a_k)) \omega) \in \lambda_k[f, X]$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Теорема верна, так как рассмотренные равенства сохраняются при гомоморфизмах универсальных алгебр $A_{(k)}$. \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.2.6. Квазибазис \bar{e} диаграммы представлений (f, A) такой, что

$$\rho[f, \bar{e}] = \lambda[f, \bar{e}]$$

называется **базисом диаграммы представлений** (f, A) . \square

^{8.9} Рассмотрим представление коммутативного кольца D в D -алгебре A . Мы будем пользоваться записью

$$f(a)(v) = av$$

В обеих алгебрах определены операции сложения и умножения. Однако равенство

$$f(a + b)(v) = f(a)(v) + f(b)(v)$$

верно, а равенство

$$f(ab)(v) = f(a)(v)f(b)(v)$$

является ошибочным.

ЗАМЕЧАНИЕ 8.2.7. Мы будем записывать базис также в виде

$$\bar{e} = (\bar{e}_{(1)}, \dots, \bar{e}_{(n)})$$

$$\bar{e}_{(k)} = (e_{(k)l}, e_{(k)l} \in \bar{e}_{(k)}) \quad (k) = (1), \dots, (n)$$

Если базис - конечный, то мы будем также пользоваться записью

$$\bar{e}_{(k)} = (e_{(k)i}, i \in I_{(k)}) = (e_{(k)1}, \dots, e_{(k)p_{(k)}}) \quad (k) = (1), \dots, (n)$$

□

ТЕОРЕМА 8.2.8. Автоморфизм диаграммы представлений (f, A) отображает базис диаграммы представлений (f, A) в базис.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть отображение r - автоморфизм диаграммы представлений (f, A) . Пусть кортеж множеств \bar{e} - базис диаграммы представлений (f, A) . Пусть ^{8.10} $\bar{e}' = r \circ \bar{e}$. Допустим кортеж множеств \bar{e}' не является базисом. Согласно теореме 8.2.2 существуют (k) , $(k) = (1), \dots, (n)$, и $e'_{(k)i} \in \bar{e}'_{(k)}$ такие, что кортеж множеств

$$Z = (\bar{e}'_{(1)}, \dots, Z_{(k)} = \bar{e}'_{(k)} \setminus \{e'_{(k)i}\}, \dots, \bar{e}'_{(n)})$$

является множеством образующих диаграммы представлений (f, A) . Согласно теореме 7.3.3 отображение r^{-1} является автоморфизмом диаграммы представлений (f, A) . Согласно теореме 8.1.25 и определению 8.1.24, кортеж множеств

$$X = (\bar{e}_{(1)}, \dots, X_{(k)} = \bar{e}_{(k)} \setminus \{r_{(k)}^{-1}(e'_{(k)i})\}, \dots, \bar{e}_{(n)})$$

является множеством образующих диаграммы представлений (f, A) . Полученное противоречие доказывает теорему. □

ТЕОРЕМА 8.2.9. Пусть \bar{e} - базис диаграммы представлений (f, A) . Пусть (g, B) - диаграмма представлений. Пусть

$$R : \bar{e} \rightarrow Y$$

произвольное отображение кортежа множеств \bar{e} , $Y_{(k)} \subseteq B_{(k)}$, $(k) = (1), \dots, (n)$. Рассмотрим кортеж отображений

$$w_{(k)}[f \rightarrow g, \bar{e}, Y, R] : w_{(k)}[f, \bar{e}] \rightarrow w_{(k)}[g, Y]$$

удовлетворяющих условиям 8.1.7.1, 8.1.7.2, 8.1.7.3, и такое, что

$$e_{(k)i} \in \bar{e}_{(k)} \Rightarrow w_{(k)}[f \rightarrow g, \bar{e}, Y, R](e_{(k)i}) = R_{(k)}(e_{(k)i})$$

Существует единственный морфизм диаграммы представлений ^{8.11}

$$r : A \rightarrow B$$

определённый правилом

$$r(a) = w[f \rightarrow g, \bar{e}, Y, R](w[f, \bar{e}, a])$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Утверждение теоремы является следствием теорем 6.1.10, 6.1.14. □

^{8.10} Согласно определениям 5.1.3, 8.3.1, мы будем пользоваться записью $r(\bar{e}) = r \circ \bar{e}$.

^{8.11} Это утверждение похоже на теорему [2]-1, с. 104.

СЛЕДСТВИЕ 8.2.10. Пусть \bar{e}, \bar{e}' - базисы представления (f, A) . Пусть r - автоморфизм представления (f, A) такой, что $\bar{e}' = r \circ \bar{e}$. Автоморфизм r определён однозначно. \square

ЗАМЕЧАНИЕ 8.2.11. Теорема 8.2.9, так же как и теорема 8.1.12, является теоремой о продолжении отображения. Одако здесь \bar{e} - не произвольное множество образующих диаграммы представлений, а базис. Согласно замечанию 8.2.3, мы не можем определить координаты любого элемента базиса через остальные элементы этого же базиса. Поэтому отпадает необходимость в согласованности отображения базиса с представлением. \square

ТЕОРЕМА 8.2.12. Набор координат $W[f, \bar{e}, \bar{e}]$ соответствует тождественному преобразованию

$$W[f, \bar{e}, E] = W[f, \bar{e}, \bar{e}]$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Утверждение теоремы следует из равенства

$$a = \bar{e} \circ W[f, \bar{e}, a] = \bar{e} \circ W[f, \bar{e}, \bar{e}] \circ W[f, \bar{e}, a]$$

\square

ТЕОРЕМА 8.2.13. Пусть $W[f, \bar{e}, r \circ \bar{e}]$ - множество координат автоморфизма r . Определено множество координат $W[f, r \circ \bar{e}, \bar{e}]$, соответствующее автоморфизму r^{-1} . Множество координат $W[f, r \circ \bar{e}, \bar{e}]$ удовлетворяет равенству 8.12

$$(8.2.3) \quad \begin{aligned} W[f, \bar{e}, r \circ \bar{e}] \circ W[f, r \circ \bar{e}, \bar{e}] &= W[f, \bar{e}, \bar{e}] \\ W[f \rightarrow f, \bar{e}, \bar{e}, r^{-1}] &= W[f \rightarrow f, \bar{e}, \bar{e}, r]^{-1} = W[f, r \circ \bar{e}, \bar{e}] \end{aligned}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Поскольку r - автоморфизм диаграммы представлений (f, A) , то, согласно теореме 8.2.8, множество $r \circ \bar{e}$ - базис диаграммы представлений (f, A) . Следовательно, определено множество координат $W[f, r \circ \bar{e}, \bar{e}]$. Равенство (8.2.3) следует из цепочки равенств

$$\begin{aligned} W[f, \bar{e}, r \circ \bar{e}] \circ W[f, r \circ \bar{e}, \bar{e}] &= W[f, \bar{e}, r \circ \bar{e}] \circ W[f, \bar{e}, r^{-1} \circ \bar{e}] \\ &= W[f, \bar{e}, r \circ r^{-1} \circ \bar{e}] = W[f, \bar{e}, \bar{e}] \end{aligned}$$

\square

ТЕОРЕМА 8.2.14. Группа автоморфизмов $GA(f)$ диаграммы эффективных представлений (f, A) порождает эффективное левостороннее представление в диаграмме представлений (f, A) .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из следствия 8.2.10 следует, что если автоморфизм r отображает базис \bar{e} в базис \bar{e}' , то множество координат $W[f, \bar{e}, \bar{e}']$ однозначно определяет автоморфизм r . Из теоремы 8.1.18 следует, что множество координат $W[f, \bar{e}, \bar{e}']$ определяет правило отображения координат относительно базиса \bar{e} при автоморфизме диаграммы представлений (f, A) . Из равенства (8.1.37) следует, что автоморфизм r действует слева на элементы $\Omega_{(k)}$ -алгебры $A_{(k)}$, $(k) = (1), \dots, (n)$. Из равенства (8.1.34) следует, что представление группы является левосторонним представлением. Согласно теореме 8.2.12 набор координат $W[f, \bar{e}, \bar{e}]$ соответствует тождественному преобразованию. Из теоремы 8.2.13 следует, что набор координат $W[f, r \circ \bar{e}, \bar{e}]$ соответствует преобразованию, обратному преобразованию $W[f, \bar{e}, r \circ \bar{e}]$. \square

8.12 Смотри также замечание 6.2.15.

8.3. Многообразии базисов диаграммы представлений

Множество $\mathcal{B}[f]$ базисов диаграммы представлений (f, A) называется **многообразием базисов** диаграммы представлений (f, A) .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.3.1. Согласно теореме 8.2.8 и определению 8.1.22, автоморфизм r диаграммы представлений (f, A) порождает преобразование

$$(8.3.1) \quad \begin{aligned} r : \bar{h} &\rightarrow r \circ \bar{h} \\ r \circ \bar{h} &= W[f, \bar{e}, r \circ \bar{e}] \circ \bar{h} \end{aligned}$$

многообразия базисов диаграммы представлений. Это преобразование называется **активным**. Согласно теореме 7.3.3, определено левостороннее представление

$$A(f) : GA(f) \longrightarrow \mathcal{B}[f]$$

группы $GA(f)$ в многообразии базисов $\mathcal{B}[f]$. Представление $A(f)$ называется **активным представлением**. Согласно следствию 8.2.10, это представление **однотранзитивно**. \square

ЗАМЕЧАНИЕ 8.3.2. Согласно замечанию 8.2.3, могут существовать базисы диаграммы представлений (f, A) , не связанные активным преобразованием. В этом случае мы в качестве многообразия базисов будем рассматривать орбиту выбранного базиса. Следовательно, диаграмма представлений (f, A) может иметь различные многообразия базисов. Мы будем предполагать, что мы выбрали многообразие базисов.

ТЕОРЕМА 8.3.3. Существует **однотранзитивное правостороннее представление**

$$P(f) : GA(f) \longrightarrow \mathcal{B}[f]$$

группы $GA(f)$ в многообразии базисов $\mathcal{B}[f]$. Представление $P(f)$ называется **пассивным представлением**.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Поскольку $A(f)$ - **однотранзитивное левостороннее представление** группы $GA(f)$, то **однотранзитивное правостороннее представление** $P(f)$ определено однозначно согласно теореме 5.5.9. \square

ТЕОРЕМА 8.3.4. Преобразование представления $P(f)$ называется **пассивным преобразованием многообразия базисов** диаграммы представлений. Мы будем пользоваться записью

$$s(\bar{e}) = \bar{e} \circ s$$

для обозначения образа базиса \bar{e} при **пассивном преобразовании** s . **Пассивное преобразование** базиса имеет вид

$$(8.3.2) \quad \begin{aligned} s : \bar{h} &\rightarrow \bar{h} \circ s \\ \bar{h} \circ s &= \bar{h} \circ W[f, \bar{e}, \bar{e} \circ s] \end{aligned}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно равенству (8.3.1), активное преобразование действует на координаты базиса слева. Равенство (8.3.2) следует из теорем 5.5.8, 5.5.9, 5.5.11, согласно которым **пассивное преобразование** действует на координаты базиса справа. \square

ТЕОРЕМА 8.3.5. *Пассивное преобразование многообразия базисов является автоморфизмом представления $A(f)$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Теорема является следствием теоремы 5.5.11. \square

ТЕОРЕМА 8.3.6. *Пусть s - пассивное преобразование многообразия базисов диаграммы представлений (f, A) . Пусть \bar{e}_1 - базис диаграммы представлений (f, A) , $\bar{e}_2 = \bar{e}_1 \circ s$. Пусть для базиса \bar{e}_3 существует активное преобразование r такое, что $\bar{e}_3 = r \circ \bar{e}_1$. Положим $\bar{e}_4 = r \circ \bar{e}_2$. Тогда $\bar{e}_4 = \bar{e}_3 \circ s$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно равенству (8.3.1), активное преобразование координат базиса \bar{e}_3 имеет вид

$$(8.3.3) \quad \bar{e}_4 = W[f, \bar{e}_1, \bar{e}_3] \circ \bar{e}_2 = W[f, \bar{e}_1, \bar{e}_3] \circ \bar{e}_1 \circ W[f, \bar{e}_1, \bar{e}_2]$$

Пусть $\bar{e}_5 = \bar{e}_3 \circ s$. Из равенства (8.3.2) следует, что

$$(8.3.4) \quad \bar{e}_5 = \bar{e}_3 \circ W[f, \bar{e}_1, \bar{e}_2] = W[f, \bar{e}_1, \bar{e}_3] \circ \bar{e}_1 \circ W[f, \bar{e}_1, \bar{e}_2]$$

Из совпадения выражений в равенствах (8.3.3), (8.3.4) следует, что $\bar{e}_4 = \bar{e}_5$. Следовательно, коммутативна диаграмма

$$\begin{array}{ccc} \bar{e}_1 \in \mathcal{B}[f] & \xrightarrow{r} & \bar{e}_3 \in \mathcal{B}[f] \\ \downarrow s & & \downarrow s \\ \bar{e}_2 \in \mathcal{B}[f] & \xrightarrow{r} & \bar{e}_4 \in \mathcal{B}[f] \end{array}$$

\square

8.4. Геометрический объект диаграммы представлений

Активное преобразование изменяет базис диаграммы представлений и кортеж Ω -чисел согласовано и координаты кортежа Ω -чисел относительно базиса не меняются. Пассивное преобразование меняет только базис, и это ведёт к изменению координат кортежа Ω -чисел относительно базиса.

ТЕОРЕМА 8.4.1. *Допустим пассивное преобразование $s \in GA(f)$ отображает базис $\bar{e}_1 \in \mathcal{B}[f]$ в базис $\bar{e}_2 \in \mathcal{B}[f]$*

$$(8.4.1) \quad \bar{e}_2 = \bar{e}_1 \circ s = \bar{e}_1 \circ W[f, \bar{e}_1, \bar{e}_1 \circ s]$$

Допустим кортеж A -чисел a имеет кортеж Ω -слов

$$(8.4.2) \quad a = \bar{e}_1 \circ W[f, \bar{e}_1, a]$$

относительно базиса \bar{e}_1 и имеет кортеж Ω -слов

$$(8.4.3) \quad a = \bar{e}_2 \circ W[f, \bar{e}_2, a]$$

относительно базиса \bar{e}_2 . Преобразование координат

$$(8.4.4) \quad W[f, \bar{e}_2, a] = W[f, \bar{e}_1 \circ s, \bar{e}_1] \circ W[f, \bar{e}_1, a]$$

не зависит от кортежа A -чисел a или базиса \bar{e}_1 , а определено исключительно координатами кортежа A -чисел a относительно базиса \bar{e}_1 .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из (8.4.1) и (8.4.3) следует, что

$$(8.4.5) \quad \begin{aligned} \bar{e}_1 \circ W[f, \bar{e}_1, a] &= \bar{e}_2 \circ W[f, \bar{e}_2, a] = \bar{e}_1 \circ W[f, \bar{e}_1, \bar{e}_2] \circ W[f, \bar{e}_2, a] \\ &= \bar{e}_1 \circ W[f, \bar{e}_1, \bar{e}_1 \circ s] \circ W[f, \bar{e}_2, a] \end{aligned}$$

Сравнивая (8.4.2) и (8.4.5) получаем, что

$$(8.4.6) \quad W[f, \bar{e}_1, a] = W[f, \bar{e}_1, \bar{e}_1 \circ s] \circ W[f, \bar{e}_2, a]$$

Так как s - автоморфизм представления, то равенство (8.4.4) следует из (8.4.6) и теоремы 8.2.13. \square

ТЕОРЕМА 8.4.2. Преобразования координат (8.4.4) порождают эффективное левостороннее представление группы $GA(f)$, называемое **координатным представлением** в кортеже Ω -алгебр.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно следствию 8.1.19, преобразование (8.4.4) является эндоморфизмом диаграммы представлений^{8.13} $(F, W[f, \bar{e}_1])$.

Допустим мы имеем два последовательных пассивных преобразования s и t . Преобразование координат

$$(8.4.7) \quad W[f, \bar{e}_2, a] = W[f, \bar{e}_1 \circ s, \bar{e}_1] \circ W[f, \bar{e}_1, a]$$

соответствует пассивному преобразованию s . Преобразование координат

$$(8.4.8) \quad W[f, \bar{e}_2, a] = W[f, \bar{e}_1 \circ t, \bar{e}_1] \circ W[f, \bar{e}_1, a]$$

соответствует пассивному преобразованию t . Согласно теореме 8.3.3, произведение преобразований координат (8.4.7) и (8.4.8) имеет вид

$$\begin{aligned} W[f, \bar{e}_3, a] &= W[f, \bar{e}_1 \circ t, \bar{e}_1] \circ W[f, \bar{e}_1 \circ s, \bar{e}_1] \circ W[f, \bar{e}_1, a] \\ &= W[f, \bar{e}_1 \circ t \circ s, \bar{e}_1] \circ W[f, \bar{e}_1, a] \end{aligned}$$

и является координатным преобразованием, соответствующим пассивному преобразованию $t \circ s$. Это доказывает, что преобразования координат порождают левостороннее представление группы $GA(f)$.

Если координатное преобразование не изменяет координаты выбранного базиса, то ему соответствует единица группы $GA(f)$, так как пассивное представление однотранзитивно. Следовательно, координатное представление эффективно. \square

Рассмотрим диаграммы представлений (f, A) , (g, B) . Пассивное представление $P(g)$ согласовано с пассивным представлением $P(f)$, если существует гомоморфизм h группы $GA(f)$ в группу $GA(g)$. Рассмотрим диаграмму

$$\begin{array}{ccc} \text{End}(B[f]) & \xrightarrow{H} & \text{End}(B[g]) \\ P(f) \uparrow & \nearrow f' & \uparrow P(g) \\ GA(f) & \xrightarrow{h} & GA(g) \end{array}$$

Так как отображения $P(f)$, $P(g)$ являются изоморфизмами группы, то отображение H является гомоморфизмом групп. Следовательно, отображение f'

^{8.13}Это преобразование не порождает эндоморфизма диаграммы представлений (f, A) . Координаты меняются, поскольку меняется базис, относительно которого мы определяем координаты. Однако кортеж A -чисел, координаты которого мы рассматриваем, не меняется.

является представлением группы $GA(f)$ в многообразии базисов $\mathcal{B}(g)$. Согласно построению, пассивному преобразованию s многообразия базисов $\mathcal{B}(f)$ соответствует пассивное преобразование $H(s)$ многообразия базисов $\mathcal{B}(g)$

$$(8.4.9) \quad \bar{e}_{g1} = \bar{e}_g \circ H(s)$$

Тогда координатное преобразование в диаграмме представлений (B, g) принимает вид

$$(8.4.10) \quad W[g, \bar{e}_{g1}, a] = W[g, \bar{e}_g \circ H(s), \bar{e}_g] \circ W[g, \bar{e}_g, a]$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.4.3. Мы будем называть орбиту

$$\begin{aligned} \mathcal{O}(f, g, \bar{e}_g, a) &= H(GA(f)) \circ W[g, \bar{e}_g, a] \\ &= (W[g, \bar{e}_g \circ H(s), \bar{e}_g] \circ W[g, \bar{e}_g, a], \bar{e}_f \circ s, s \in GA(f)) \end{aligned}$$

геометрическим объектом в координатном представлении, определённом в диаграмме представлений (f, A) . Для любого базиса $\bar{e}_{f1} = \bar{e}_f \circ s$ соответствующая точка (8.4.10) орбиты определяет координаты геометрического объекта относительно базиса \bar{e}_{f1} . \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.4.4. Мы будем называть орбиту

$$\mathcal{O}(f, g, a) = (W[g, \bar{e}_g \circ H(s), \bar{e}_g] \circ W[g, \bar{e}_g, a], \bar{e}_f \circ H(s), \bar{e}_f \circ s, s \in GA(f))$$

геометрическим объектом, определённым в диаграмме представлений (f, A) . Мы будем также говорить, что a - это **геометрический объект типа H** . Для любого базиса $\bar{e}_{f1} = \bar{e}_f \circ s$ соответствующая точка (8.4.10) орбиты определяет кортеж A -чисел

$$a = \bar{e}_g \circ W[g, \bar{e}_g, a]$$

который мы называем **представителем геометрического объекта** в диаграмме представлений (f, A) . \square

Так как геометрический объект - это орбита представления, то согласно теореме 5.3.7 определение геометрического объекта корректно.

Определение 8.4.3 строит геометрический объект в координатном пространстве. Определение 8.4.4 предполагает, что мы выбрали базис представления g . Это позволяет использовать представитель геометрического объекта вместо его координат.

ТЕОРЕМА 8.4.5 (принцип инвариантности). Представитель геометрического объекта не зависит от выбора базиса \bar{e}_f .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Чтобы определить представителя геометрического объекта, мы должны выбрать базис \bar{e}_f диаграммы представлений (f, A) , базис \bar{e}_g диаграммы представлений (B, g) и координаты геометрического объекта $W[g, \bar{e}_g, b]$. Соответствующий представитель геометрического объекта имеет вид

$$b = \bar{e}_g \circ W[g, \bar{e}_g, b]$$

Базис \bar{e}_{f1} связан с базисом \bar{e}_f пассивным преобразованием

$$\bar{e}_{f1} = \bar{e}_f \circ s$$

Согласно построению это порождает пассивное преобразование (8.4.9) и координатное преобразование (8.4.10). Соответствующий представитель геометрического объекта имеет вид

$$\begin{aligned} b' &= \bar{e}_{g1} \circ W[g, \bar{e}_{g1}, b'] \\ &= \bar{e}_g \circ W[g, \bar{e}_g, \bar{e}_g \circ H(s)] \circ W[g, \bar{e}_g \circ H(s), \bar{e}_g] \circ W[g, \bar{e}_g, b] \\ &= \bar{e}_g \circ W[g, \bar{e}_g, b] = b \end{aligned}$$

Следовательно, представитель геометрического объекта инвариантен относительно выбора базиса. \square

Примеры диаграммы представлений: модуль

9.1. Об этой главе

Теория представлений универсальной алгебры - это важный инструмент, которым я пользуюсь на протяжении многих лет для изучения алгебры, геометрии, математического анализа. Основная задача этой и следующей глав - показать как работает теория представлений универсальной алгебры в различных разделах математики.

Примеры в этой главе имеют отношение к различным конструкциям, связанным с модулем над кольцом.

Первый пример - это абелева группа. Модуль - это эффективное представление кольца в абелевой группе. Поэтому существует параллель между абелевой группой и модулем. Я рассматриваю это сходство в разделе 9.2.

Модуль над коммутативным кольцом - это относительно простая конструкция. С другой стороны, многие определения теории представлений (базис представления, морфизм представлений, свободное представление) опираются на аналогичные определения в модуле. Поэтому раздел 9.3 посвящён детальному рассмотрению модуля над коммутативным кольцом.

Я рассматриваю алгебру над коммутативным кольцом в разделе 9.4 и левый модуль над D -алгеброй в разделе 9.5. Мы можем рассматривать модуль над некоммутативным кольцом также как мы рассматривали модуль над коммутативным кольцом. Однако мы встречаем серьёзные проблемы при изучении линейного отображения.

Рассмотрение некоммутативного кольца как алгебры над центром кольца существенно меняет картину. Анализ диаграммы представлений, описывающей модуль V над D -алгеброй A , позволяет рассмотреть различные группы отображений, сохраняющих структуру алгебры. Среди этих отображений мы выделяем линейные отображения A -модуля V (приведенный морфизм D -модуля V) и гомоморфизм A -модуля V (приведенный морфизм диаграммы представлений). Такое определение линейного отображения позволяет рассмотреть полилинейное отображение модуля над D -алгеброй A .

Если D -алгебра A является банаховой, то мы получаем инструмент для изучения математического анализа функций нескольких переменных. К сожалению, структура линейного отображения некоммутативной алгебры лежит вне рамок этой главы. Подробнее эту тему читатель может изучить в книге [12].

9.2. Абелевая группа

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.2.1. Мы определим действие кольца целых чисел Z в абелевой группе G согласно правилу

$$(9.2.1) \quad 0g = 0$$

$$(9.2.2) \quad (n + 1)g = ng + g$$

$$(9.2.3) \quad (n - 1)g = ng - g$$

□

ТЕОРЕМА 9.2.2. Действие кольца целых чисел Z в абелевой группе G , рассмотренное в определении 9.2.1, является представлением. Верны следующие равенства

$$(9.2.4) \quad 1a = a$$

$$(9.2.5) \quad (nm)a = n(ma)$$

$$(9.2.6) \quad (m + n)a = ma + na$$

$$(9.2.7) \quad (m - n)a = ma - na$$

$$(9.2.8) \quad n(a + b) = na + nb$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Равенство (9.2.4) является следствием равенства (9.2.1) и равенства (9.2.2), когда $n = 0$.

Из равенства (9.2.1) следует, что равенство (9.2.6) верно, когда $n = 0$.

- Пусть равенство (9.2.6) верно, когда $n = k \geq 0$. Тогда

$$(m + k)a = ma + ka$$

Равенство

$$\begin{aligned} (m + (k + 1))a &= ((m + k) + 1)a = (m + k)a + a = ma + ka + a \\ &= ma + (k + 1)a \end{aligned}$$

является следствием равенства (9.2.2). Следовательно, равенство (9.2.6) верно, когда $n = k + 1$. Согласно принципу математической индукции, равенство (9.2.6) верно для любого $n \geq 0$.

- Пусть равенство (9.2.6) верно, когда $n = k \leq 0$. Тогда

$$(m + k)a = ma + ka$$

Равенство

$$\begin{aligned} (m + (k - 1))a &= ((m + k) - 1)a = (m + k)a - a = ma + ka - a \\ &= ma + (k - 1)a \end{aligned}$$

является следствием равенства (9.2.3). Следовательно, равенство (9.2.6) верно, когда $n = k - 1$. Согласно принципу математической индукции, равенство (9.2.6) верно для любого $n \leq 0$.

- Следовательно, равенство (9.2.6) верно для любого $n \in Z$.

Равенство

$$(9.2.9) \quad (k + n)a - na = ka$$

является следствием равенства (9.2.6). Равенство (9.2.7) является следствием равенства (9.2.9), если мы положим $m = k + n$, $k = m - n$.

Из равенства (9.2.1) следует, что равенство (9.2.5) верно, когда $n = 0$.

- Пусть равенство (9.2.5) верно, когда $n = k \geq 0$. Тогда

$$(km)a = k(ma)$$

Равенство

$$\begin{aligned} ((k+1)m)a &= (km+m)a = (km)a + ma = k(ma) + ma \\ &= (k+1)(ma) \end{aligned}$$

является следствием равенств (9.2.2), (9.2.6). Следовательно, равенство (9.2.5) верно, когда $n = k+1$. Согласно принципу математической индукции, равенство (9.2.5) верно для любого $n \geq 0$.

- Пусть равенство (9.2.6) верно, когда $n = k \leq 0$. Тогда

$$(km)a = k(ma)$$

Равенство

$$\begin{aligned} ((k-1)m)a &= (km-m)a = (km)a - ma = k(ma) - ma \\ &= (k-1)(ma) \end{aligned}$$

является следствием равенств (9.2.3), (9.2.7). Следовательно, равенство (9.2.5) верно, когда $n = k-1$. Согласно принципу математической индукции, равенство (9.2.5) верно для любого $n \leq 0$.

- Следовательно, равенство (9.2.5) верно для любого $n \in Z$.

Из равенства (9.2.1) следует, что равенство (9.2.8) верно, когда $n = 0$.

- Пусть равенство (9.2.6) верно, когда $n = k \geq 0$. Тогда

$$k(a+b) = ka + kb$$

Равенство

$$\begin{aligned} (k+1)(a+b) &= k(a+b) + a + b = ka + kb + a + b \\ &= ka + a + kb + b \\ &= (k+1)a + (k+1)b \end{aligned}$$

является следствием равенства (9.2.2). Следовательно, равенство (9.2.8) верно, когда $n = k+1$. Согласно принципу математической индукции, равенство (9.2.8) верно для любого $n \geq 0$.

- Пусть равенство (9.2.6) верно, когда $n = k \leq 0$. Тогда

$$k(a+b) = ka + kb$$

Равенство

$$\begin{aligned} (k-1)(a+b) &= k(a+b) - (a+b) = ka + kb - a - b \\ &= ka - a + kb - b \\ &= (k-1)a + (k-1)b \end{aligned}$$

является следствием равенства (9.2.3). Следовательно, равенство (9.2.8) верно, когда $n = k-1$. Согласно принципу математической индукции, равенство (9.2.8) верно для любого $n \leq 0$.

- Следовательно, равенство (9.2.8) верно для любого $n \in Z$.

Из равенства (9.2.8) следует, что отображение

$$\varphi(n) : a \in G \rightarrow na \in G$$

является эндоморфизмом абелевой группы G . Из равенств (9.2.6), (9.2.5) следует, что отображение

$$\varphi : Z \rightarrow \text{End}(Ab, G)$$

является гомоморфизмом кольца Z . Согласно определению 3.1.1, отображение φ является представлением кольца целых чисел Z в абелевой группе G . \square

ТЕОРЕМА 9.2.3. Пусть G - абелевая группа. Множество G -чисел, порождённое множеством $S = \{s_i : i \in I\}$, имеет вид

$$(9.2.10) \quad J(S) = \left\{ g : g = \sum_{i \in I} g^i s_i, g^i \in Z \right\}$$

где множество $\{i \in I : g^i \neq 0\}$ конечно.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Мы докажем теорему по индукции, опираясь на теоремы [14]-5.1, страница 94, и 6.1.4.

Для произвольного $s_k \in S$, положим $g^i = \delta_k^i$. Тогда

$$(9.2.11) \quad s_k = \sum_{i \in I} g^i s_i$$

$s_k \in J(S)$ следует из (9.2.10), (9.2.11).

Пусть $g_1, g_2 \in X_k \subseteq J(S)$. Так как G является абелевой группой, то, согласно утверждению 6.1.4.3, $g_1 + g_2 \in J(S)$. Согласно равенству (9.2.10), существуют Z -числа $g_1^i, g_2^i, i \in I$, такие, что

$$(9.2.12) \quad g_1 = \sum_{i \in I} g_1^i v_i \quad g_2 = \sum_{i \in I} g_2^i v_i$$

где множества

$$(9.2.13) \quad H_1 = \{i \in I : g_1^i \neq 0\} \quad H_2 = \{i \in I : g_2^i \neq 0\}$$

конечны. Из равенства (9.2.12) следует, что

$$(9.2.14) \quad g_1 + g_2 = \sum_{i \in I} g_1^i v_i + \sum_{i \in I} g_2^i v_i = \sum_{i \in I} (g_1^i v_i + g_2^i v_i)$$

Равенство

$$(9.2.15) \quad g_1 + g_2 = \sum_{i \in I} (g_1^i + g_2^i) v_i$$

является следствием равенств (9.2.6), (9.2.14). Из равенства (9.2.13) следует, что множество

$$\{i \in I : g_1^i + g_2^i \neq 0\} \subseteq H_1 \cup H_2$$

конечно. Из равенства (9.2.15) следует, что $g_1 + g_2 \in J(S)$. \square

9.3. Векторное пространство

9.3.1. Модуль над коммутативным кольцом.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.3.1. Эффективное представление коммутативного кольца D в абелевой группе V

$$(9.3.1) \quad f : D \xrightarrow{*} V \quad f(d) : v \rightarrow dv$$

называется **модулем над кольцом D или D -модулем**. V -число называется **вектором**. \square

ТЕОРЕМА 9.3.2. Следующая диаграмма представлений описывает D -модуль V

$$(9.3.2) \quad \begin{array}{ccc} D & \xrightarrow{g_2} & V \\ & & \uparrow g_1 \\ & & Z \end{array}$$

В диаграмме представлений (9.3.2) верна **коммутативность представлений** кольца целых чисел Z и коммутативного кольца D в абелевой группе V

$$(9.3.3) \quad a(nv) = n(av)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Диаграмма представлений (9.3.2) является следствием определения 9.3.1 и теоремы 9.2.2. Равенство (9.3.3) является следствием утверждения, что преобразование $g_2(a)$ является эндоморфизмом Z -модуля V . \square

ТЕОРЕМА 9.3.3. Пусть V является D -модулем. Для любого вектора $v \in V$, вектор, порождённый диаграммой представлений (9.3.2), имеет следующий вид

$$(9.3.4) \quad (a + n)v = av + nv \quad a \in D \quad n \in Z$$

9.3.3.1: Множество отображений

$$(9.3.5) \quad a + n : v \in V \rightarrow (a + n)v \in V$$

порождает^{9.1} кольцо $D_{(1)}$ где сложение определено равенством

$$(9.3.6) \quad (a + n) + (b + m) = (a + b) + (n + m)$$

и произведение определено равенством

$$(9.3.7) \quad (a + n)(b + m) = (ab + ma + nb) + (nm)$$

Кольцо $D_{(1)}$ называется **унитальным расширением** кольца D .

Если кольцо D имеет единицу, то	$Z \subseteq D$	$D_{(1)} = D$
Если кольцо D является идеалом Z , то	$D \subseteq Z$	$D_{(1)} = Z$
В противном случае	$D_{(1)} = D \oplus Z$	

9.3.3.2: Кольцо D является идеалом кольца $D_{(1)}$.

^{9.1} См. определение унитарного расширения также на страницах [6]-52, [7]-64.

9.3.3.3: Множество преобразований (9.3.4) порождает представление кольца $D_{(1)}$ в абелевой группе V .

Мы будем пользоваться обозначением $D_{(1)}v$ для множества векторов, порождённых вектором v .

ТЕОРЕМА 9.3.4. Элементы D -модуля V удовлетворяют соотношениям

9.3.4.1: **закон ассоциативности**

$$(9.3.8) \quad (pq)v = p(qv)$$

9.3.4.2: **закон дистрибутивности**

$$(9.3.9) \quad p(v + w) = pv + pw$$

$$(9.3.10) \quad (p + q)v = pv + qv$$

9.3.4.3: **закон унитарности**

$$(9.3.11) \quad 1v = v$$

для любых $p, q \in D_{(1)}$, $v, w \in V$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМ 9.3.3, 9.3.4. Пусть $v \in V$.

ЛЕММА 9.3.5. Пусть $n \in Z$, $a \in D$. Отображение (9.3.5) является эндоморфизмом абелевой группы V .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Утверждения $nv \in V$, $av \in V$ являются следствием теорем 6.1.4, 9.3.2. Так как V является абелевой группой, то

$$nv + av \in V \quad n \in Z \quad a \in D$$

Следовательно, для любого Z -числа n и любого D -числа a , мы определили отображение (9.3.5). Поскольку преобразование $g_1(n)$ и преобразование $g_2(a)$ являются эндоморфизмами абелевой группы V , то отображение (9.3.5) является эндоморфизмом абелевой группы V . \odot

Пусть $D_{(1)}$ - множество отображений (9.3.5). Равенство (9.3.9) является следствием леммы 9.3.5.

Пусть $p = a + n \in D_{(1)}$, $q = b + m \in D_{(1)}$. Согласно утверждению 9.3.3.3, мы определим сумму $D_{(1)}$ -чисел p и q равенством (9.3.10). Равенство

$$(9.3.12) \quad ((a + n) + (b + m))v = (a + n)v + (b + m)v$$

является следствием равенства (9.3.10). Равенство

$$(9.3.13) \quad (n + m)v = nv + mv$$

является следствием утверждения, что представление g_1 является гомоморфизмом аддитивной группы кольца Z . Равенство

$$(9.3.14) \quad (a + b)v = av + bv$$

является следствием утверждения, что представление g_2 является гомоморфизмом аддитивной группы кольца D . Так как V является абелевой группой, то равенство

$$(9.3.15) \quad \begin{aligned} ((a + n) + (b + m))v &= av + nv + bv + mv = av + bv + nv + mv \\ &= (a + b)v + (n + m)v = ((a + b) + (n + m))v \end{aligned}$$

является следствием равенств (9.3.12), (9.3.13), (9.3.14). Из равенства (9.3.15) следует, что определение (9.3.6) суммы на множестве $D_{(1)}$ не зависит от вектора v .

Равенства (9.3.8), (9.3.11) являются следствием утверждения 9.3.3.3. Пусть $p = a + n \in D_{(1)}$, $q = b + m \in D_{(1)}$. Равенство

$$(9.3.16) \quad (mn)v = m(nv)$$

является следствием утверждения, что представление g_1 является представлением мультипликативной группы кольца Z . Равенство

$$(9.3.17) \quad (ab)v = a(bv)$$

является следствием утверждения, что представление g_2 является представлением мультипликативной группы кольца D . Равенство

$$(9.3.18) \quad (md)v = m(dv)$$

является следствием утверждения, что кольцо D является абелевой группой. Равенство

$$(9.3.19) \quad \begin{aligned} ((a+n)(b+m))v &= (a+n)((b+m)v) = (a+n)(bv+mv) \\ &= a(bv+mv) + n(bv+mv) \\ &= a(bv) + a(mv) + n(bv) + n(mv) \\ &= (ab)v + m(av) + n(bv) + (nm)v \\ &= (ab)v + (ma)v + (nb)v + (nm)v \\ &= ((ab+ma+nb) + nm)v \end{aligned}$$

является следствием равенств (9.3.3), (9.3.4), (9.3.8), (9.3.16), (9.3.17), (9.3.18). Равенство (9.3.7) является следствием равенства (9.3.19).

Утверждение 9.3.3.2 является следствием равенства (9.3.7). \square

ТЕОРЕМА 9.3.6. Пусть V - D -модуль. Множество векторов, порождённое множеством векторов $v = (v_i \in V, i \in I)$, имеет вид^{9.2}

$$(9.3.20) \quad J(v) = \left\{ w : w = \sum_{i \in I} c^i v_i, c^i \in D_{(1)}, |\{i : c^i \neq 0\}| < \infty \right\}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Мы докажем теорему по индукции, опираясь на теорему 6.1.4. Согласно теореме 6.1.4, мы должны доказать следующие утверждения:

$$9.3.6.1: v_k \in X_0 \subseteq J(v)$$

$$9.3.6.2: c^k v_k \in J(v), c^k \in D_{(1)}, k \in I$$

$$9.3.6.3: \sum_{k \in I} c^k v_k \in J(v), c^k \in D_{(1)}, |\{i : c^i \neq 0\}| < \infty$$

$$9.3.6.4: v, w \in J(v) \Rightarrow v + w \in J(v)$$

$$9.3.6.5: a \in D, v \in J(v) \Rightarrow av \in J(v)$$

• Для произвольного $v_k \in v$, положим $c^i = \delta_k^i \in D_{(1)}$. Тогда

$$(9.3.21) \quad v_k = \sum_{i \in I} c^i v_i$$

^{9.2} Для множества A , мы обозначим $|A|$ мощность множества A . Запись $|A| < \infty$ означает, что множество A конечно.

Утверждение 9.3.6.1 следует из (9.3.20), (9.3.21).

- Утверждение 9.3.6.2 является следствием теорем 6.1.4, 9.3.3 и утверждения 9.3.6.1.
- Так как V является абелевой группой, то утверждение 9.3.6.3 следует из утверждения 9.3.6.2 и теорем 6.1.4, 9.2.3.
- Пусть $w_1, w_2 \in X_k \subseteq J(v)$. Так как V является абелевой группой, то, согласно утверждению 6.1.4.3,

$$(9.3.22) \quad w_1 + w_2 \in X_{k+1}$$

Согласно равенству (9.3.20), существуют $D_{(1)}$ -числа $w_1^i, w_2^i, i \in I$, такие, что

$$(9.3.23) \quad w_1 = \sum_{i \in I} w_1^i v_i \quad w_2 = \sum_{i \in I} w_2^i v_i$$

где множества

$$(9.3.24) \quad H_1 = \{i \in I : w_1^i \neq 0\} \quad H_2 = \{i \in I : w_2^i \neq 0\}$$

конечны. Так как V является абелевой группой, то из равенства (9.3.23) следует, что

$$(9.3.25) \quad w_1 + w_2 = \sum_{i \in I} w_1^i v_i + \sum_{i \in I} w_2^i v_i = \sum_{i \in I} (w_1^i v_i + w_2^i v_i)$$

Равенство

$$(9.3.26) \quad w_1 + w_2 = \sum_{i \in I} (w_1^i + w_2^i) v_i$$

является следствием равенств (9.3.10), (9.3.25). Из равенства (9.3.24) следует, что множество

$$\{i \in I : w_1^i + w_2^i \neq 0\} \subseteq H_1 \cup H_2$$

конечно.

- Пусть $w \in X_k \subseteq J(v)$. Согласно утверждению 6.1.4.4, для любого $D_{(1)}$ -числа a ,

$$(9.3.27) \quad aw \in X_{k+1}$$

Согласно равенству (9.3.20), существуют $D_{(1)}$ -числа $w^i, i \in I$, такие, что

$$(9.3.28) \quad w = \sum_{i \in I} w^i v_i$$

где

$$(9.3.29) \quad |\{i \in I : w^i \neq 0\}| < \infty$$

Из равенства (9.3.28) следует, что

$$(9.3.30) \quad aw = a \sum_{i \in I} w^i v_i = \sum_{i \in I} a(w^i v_i) = \sum_{i \in I} (aw^i) v_i$$

Из утверждения (9.3.29) следует, что множество $\{i \in I : aw^i \neq 0\}$ конечно.

Из равенств (9.3.22), (9.3.26), (9.3.27), (9.3.30) следует, что $X_{k+1} \subseteq J(v)$. \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.3.7. Пусть $v = (v_i \in V, i \in I)$ - множество векторов. Выражение $w^i v_i$ называется **линейной комбинацией** векторов v_i . Вектор $\bar{w} = w^i v_i$ называется **линейно зависимым** от векторов v_i . \square

Представим множество $D_{(1)}$ -чисел $w^i, i \in I$, в виде матрицы

$$w = \begin{pmatrix} w^1 \\ \dots \\ w^n \end{pmatrix}$$

Представим множество векторов $v_i, i \in I$, в виде матрицы

$$v = \begin{pmatrix} v_1 & \dots & v_n \end{pmatrix}$$

Тогда мы можем записать линейную комбинацию векторов $\bar{w} = w^i v_i$ в виде

$$\bar{w} = w^* * v$$

ТЕОРЕМА 9.3.8. Пусть D - поле. Если уравнение

$$w^i v_i = 0$$

предполагает существования индекса $i = j$ такого, что $w^j \neq 0$, то вектор v_j линейно зависит от остальных векторов v .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Теорема является следствием равенства

$$v_j = \sum_{i \in I \setminus \{j\}} \frac{w^i}{w^j} v_i$$

и определения 9.3.7. \square

Очевидно, что для любого множества векторов v_i ,

$$w^i = 0 \Rightarrow w^* * v = 0$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.3.9. Множество векторов ^{9.3} $v_i, i \in I$, D -модуля V **линейно независимо**, если $w = 0$ следует из уравнения

$$w^i v_i = 0$$

В противном случае, множество векторов $v_i, i \in I$, **линейно зависимо**. \square

Следующее определение является следствием теорем 9.3.6, 6.1.4 и определения 6.1.5.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.3.10. $J(v)$ называется **подмодулем, порождённым множеством v** , а v - **множеством образующих** подмодуля $J(v)$. В частности, **множеством образующих** D -модуля V будет такое подмножество $X \subset V$, что $J(X) = V$. \square

Следующее определение является следствием теорем 9.3.6, 6.1.4 и определения 6.2.6.

^{9.3} Я следую определению в [2], страница 100.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.3.11. Если множество $X \subset V$ является множеством образующих D -модуля V , то любое множество Y , $X \subset Y \subset V$ также является множеством образующих D -модуля V . Если существует минимальное множество X , порождающее D -модуль V , то такое множество X называется **базисом** D -модуля V . \square

ТЕОРЕМА 9.3.12. Множество векторов $\bar{e} = (e_i, i \in I)$ является базисом D -модуля V , если верны следующие утверждения.

9.3.12.1: Произвольный вектор $v \in V$ является линейной комбинацией векторов множества \bar{e} .

9.3.12.2: Вектор e_i нельзя представить в виде линейной комбинации остальных векторов множества \bar{e} .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно утверждению 9.3.12.1, теореме 9.3.6 и определению 9.3.7, множество \bar{e} порождает D -модуль V (определение 9.3.10). Согласно утверждению 9.3.12.2, множество \bar{e} является минимальным множеством, порождающим D -модуль V . Согласно определению 9.3.11, множество \bar{e} является базисом D -модуля V . \square

ТЕОРЕМА 9.3.13. Пусть D - поле. Множество векторов $\bar{e} = (e_i, i \in I)$ является **базисом D -векторного пространства V** , если векторы e_i линейно независимы и любой вектор $v \in V$ линейно зависит от векторов e_i .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть множество векторов $e_i, i \in I$, линейно зависимо. Тогда в равенстве

$$w^i e_i = 0$$

существует индекс $i = j$ такой, что $w^j \neq 0$. Согласно теореме 9.3.8, вектор e_j линейно зависит от остальных векторов множества \bar{e} . Согласно определению 9.3.11, множество векторов $e_i, i \in I$, не является базисом D -векторного пространства V .

Следовательно, если множество векторов $e_i, i \in I$, является базисом, то эти векторы линейно независимы. Так как произвольный вектор $v \in V$ является линейной комбинацией векторов $e_i, i \in I$, то множество векторов $v, e_i, i \in I$, не является линейно независимым. \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.3.14. Пусть \bar{e} - базис D -модуля V , и вектор $\bar{v} \in V$ имеет разложение

$$\bar{v} = v^* e = v^i e_i$$

относительно базиса \bar{e} . $D_{(1)}$ -числа v^i называются **координатами** вектора \bar{v} относительно базиса \bar{e} . Матрица $D_{(1)}$ -чисел $v = (v^i, i \in I)$ называется **координатной матрицей вектора \bar{v} в базисе \bar{e}** . \square

ТЕОРЕМА 9.3.15. Пусть D - кольцо. Пусть \bar{e} - базис D -модуля V . Пусть

$$(9.3.31) \quad w^i e_i = 0$$

линейная зависимость векторов базиса \bar{e} . Тогда

9.3.15.1: $D_{(1)}$ -число $w^i, i \in I$, не имеет обратного элемента в кольце $D_{(1)}$.

9.3.15.2: Множество D' матриц $w = (w^i, i \in I)$ порождает D -модуль.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Допустим существует матрица $w = (w^i, i \in I)$ такая, что равенство (9.3.31) верно и существует индекс $i = j$ такой, что $w^j \neq 0$. Если мы положим, что $D_{(1)}$ -число c^j имеет обратный, то равенство

$$e_j = \sum_{i \in I \setminus \{j\}} \frac{w^i}{w^j} e_i$$

является следствием равенства (9.3.31). Следовательно вектор e_j является линейной комбинацией остальных векторов множества \bar{e} и множество \bar{e} не является базисом. Следовательно, наше предположение неверно, и $D_{(1)}$ -число c^j не имеет обратного.

Пусть матрицы $b = (b^i, i \in I) \in D'$, $c = (c^i, i \in I) \in D'$. Из равенств

$$\begin{aligned} b^i e_i &= 0 \\ c^i e_i &= 0 \end{aligned}$$

следует

$$(b^i + c^i) e_i = 0$$

Следовательно, множество D' является абелевой группой.

Пусть матрица $c = (c^i, i \in I) \in D'$ и $a \in D$. Из равенства

$$c^i e_i = 0$$

следует

$$(ac^i) e_i = 0$$

Следовательно, абелевая группа D' является D -модулем. \square

ТЕОРЕМА 9.3.16. Пусть D -модуль V имеет базис \bar{e} такой, что в равенстве

$$(9.3.32) \quad w^i e_i = 0$$

существует индекс $i = j$ такой, что $w^j \neq 0$. Тогда

9.3.16.1: Матрица $w = (w^i, i \in I)$ определяет координаты вектора $0 \in V$ относительно базиса \bar{e} .

9.3.16.2: Координаты вектора \bar{v} относительно базиса \bar{e} определены однозначно с точностью до выбора координат вектора $0 \in V$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Утверждение 9.3.16.1 является следствием равенства (9.3.32) и определения 9.3.14.

Пусть вектор \bar{v} имеет разложение

$$(9.3.33) \quad \bar{v} = v^* e = v^i e_i$$

относительно базиса \bar{e} . Равенство

$$(9.3.34) \quad \bar{v} = \bar{v} + 0 = v^i e_i + c^i e_i = (v^i + c^i) e_i$$

является следствием равенств (9.3.32), (9.3.33). Утверждение 9.3.16.2 является следствием равенств (9.3.33), (9.3.34) и определения 9.3.14. \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.3.17. D -модуль V - свободный D -модуль,^{9.4} если D -модуль V имеет базис и векторы базиса линейно независимы. \square

^{9.4} Я следую определению в [2], страница 103.

ТЕОРЕМА 9.3.18. Координаты вектора $v \in V$ относительно базиса \bar{e} свободного D -модуля V определены однозначно.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Теорема является следствием теоремы 9.3.16 и определений 9.3.9, 9.3.17. \square

ПРИМЕР 9.3.19. Из теоремы 9.2.2 и определения 9.3.1 следует, что абелева группа G является модулем над кольцом целых чисел Z . \square

9.3.2. Линейное отображение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.3.20. Морфизм представлений

$$\left(h : D_1 \rightarrow D_2 \quad f : V_1 \rightarrow V_2 \right)$$

D_1 -модуля A_1 в D_2 -модуль A_2 называется **линейным отображением** D_1 -модуля A_1 в D_2 -модуль A_2 . Обозначим $\mathcal{L}(D_1 \rightarrow D_2; A_1 \rightarrow A_2)$ множество линейных отображений D_1 -модуля A_1 в D_2 -модуль A_2 . \square

Если отображение

$$f : A_1 \rightarrow A_2$$

является линейным отображением D_1 -алгебры A_1 в D_2 -алгебру A_2 , то я пользуюсь обозначением

$$f \circ a = f(a)$$

для образа отображения f .

ТЕОРЕМА 9.3.21. Линейное отображение

$$\left(h : D_1 \rightarrow D_2 \quad f : A_1 \rightarrow A_2 \right)$$

D_1 -модуля A_1 в D_2 -модуль A_2 удовлетворяет равенствам^{9.5}

$$(9.3.35) \quad h(d_1 + d_2) = h(d_1) + h(d_2)$$

$$(9.3.36) \quad h(d_1 d_2) = h(d_1) h(d_2)$$

$$(9.3.37) \quad f \circ (a + b) = f \circ a + f \circ b$$

$$(9.3.38) \quad f \circ (da) = h(d)(f \circ a)$$

$$a, b \in A_1 \quad d, d_1, d_2 \in D_1$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из определений 3.2.2, 9.3.20 следует, что отображение h является гомоморфизмом кольца D_1 в кольцо D_2 (равенства (9.3.35), (9.3.36)) и отображение f является гомоморфизмом абелевой группы A_1 в абелеву группу A_2 (равенство (9.3.37)). Равенство (9.3.38) является следствием равенства (3.2.3). \square

^{9.5} В некоторых книгах (например, на странице [2]-94) теорема 9.3.21 рассматривается как определение.

ТЕОРЕМА 9.3.22. Пусть

$$\bar{e}_1 = (e_{1.i}, i \in I)$$

базис в D_1 -модуле A_1 . Пусть

$$\bar{e}_2 = (e_{2.j}, j \in J)$$

базис в D_2 -модуле A_2 . Тогда линейное отображение

$$\left(h : D_1 \rightarrow D_2 \quad \bar{f} : A_1 \rightarrow A_2 \right)$$

имеет представление

$$(9.3.39) \quad b = h(a) *_* f$$

относительно заданных базисов. Здесь

- a - координатная матрица A_1 -числа \bar{a} относительно базиса \bar{e}_1

$$(9.3.40) \quad \bar{a} = a *_* e_1$$

- $h(a) = (h(a_i), i \in I)$ - матрица D_2 -чисел.
- b - координатная матрица вектора

$$(9.3.41) \quad \bar{b} = \bar{f} \circ \bar{a}$$

относительно базиса \bar{e}_2

$$(9.3.42) \quad \bar{b} = b *_* e_2$$

- f - координатная матрица множества векторов $(\bar{f} \circ e_{1.i}, i \in I)$ относительно базиса \bar{e}_2 . Мы будем называть матрицу f **матрицей линейного отображения** \bar{f} относительно базисов \bar{e}_1 и \bar{e}_2 .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Так как

$$\left(h : D_1 \rightarrow D_2 \quad \bar{f} : A_1 \rightarrow A_2 \right)$$

линейное отображение, то равенство

$$(9.3.43) \quad \bar{b} = \bar{f} \circ \bar{a} = \bar{f} \circ (a *_* e_1) = h(a) *_* (\bar{f} \circ e_1)$$

является следствием равенств (9.3.38), (9.3.40), (9.3.41). A_2 -число $\bar{f} \circ e_{1.i}$ имеет разложение

$$(9.3.44) \quad \bar{f} \circ e_{1.i} = f_i *_* e_2 = f_i^j e_{2.j}$$

относительно базиса \bar{e}_2 . Комбинируя (9.3.43) и (9.3.44), мы получаем

$$(9.3.45) \quad \bar{b} = h(a) *_* f *_* e_2$$

(9.3.39) следует из сравнения (9.3.42) и (9.3.45) и теоремы 9.3.18. \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.3.23. Приведенный морфизм представлений

$$f : A_1 \rightarrow A_2$$

D -модуля A_1 в D -модуль A_2 называется **линейным отображением** D -модуля A_1 в D -модуль A_2 . Обозначим $\mathcal{L}(D; A_1 \rightarrow A_2)$ множество линейных отображений D -модуля A_1 в D -модуль A_2 . \square

ТЕОРЕМА 9.3.24. *Линейное отображение*

$$f : A_1 \rightarrow A_2$$

D-модуля A_1 в D -модуль A_2 удовлетворяет равенствам^{9.6}

$$(9.3.46) \quad f \circ (a + b) = f \circ a + f \circ b$$

$$(9.3.47) \quad f \circ (da) = d(f \circ a)$$

$$a, b \in A_1 \quad d \in D$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из определений 3.4.2, 9.3.23 следует, что отображение f является гомоморфизмом абелевой группы A_1 в абелеву группу A_2 (равенство (9.3.46)). Равенство (9.3.47) является следствием равенства (3.4.4). \square

ТЕОРЕМА 9.3.25. *Пусть*

$$\bar{e}_1 = (e_{1 \cdot i}, i \in I)$$

базис в D -модуле A_1 . Пусть

$$\bar{e}_2 = (e_{2 \cdot j}, j \in J)$$

базис в D -модуле A_2 . Тогда линейное отображение

$$\bar{f} : A_1 \rightarrow A_2$$

имеет представление

$$(9.3.48) \quad b = a^* *_f$$

относительно заданных базисов. Здесь

- a - координатная матрица A_1 -числа \bar{a} относительно базиса \bar{e}_1

$$(9.3.49) \quad \bar{a} = a^* *_e e_1$$

- b - координатная матрица вектора

$$(9.3.50) \quad \bar{b} = \bar{f} \circ \bar{a}$$

относительно базиса \bar{e}_2

$$(9.3.51) \quad \bar{b} = b^* *_e e_2$$

- f - координатная матрица множества векторов $(\bar{f} \circ e_{1 \cdot i}, i \in I)$ относительно базиса \bar{e}_2 . Мы будем называть матрицу f **матрицей линейного отображения \bar{f} относительно базисов \bar{e}_1 и \bar{e}_2** .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Так как

$$\bar{f} : A_1 \rightarrow A_2$$

линейное отображение, то равенство

$$(9.3.52) \quad \bar{b} = \bar{f} \circ \bar{a} = \bar{f} \circ (a^* *_e e_1) = a^* *_e (\bar{f} \circ e_1)$$

является следствием равенств (9.3.47), (9.3.49), (9.3.50). A_2 -число $\bar{f} \circ e_{1 \cdot i}$ имеет разложение

$$(9.3.53) \quad \bar{f} \circ e_{1 \cdot i} = f_i^* *_e e_2 = f_i^j e_{2 \cdot j}$$

^{9.6} В некоторых книгах (например, на странице [2]-94) теорема 9.3.24 рассматривается как определение.

относительно базиса \bar{e}_2 . Комбинируя (9.3.52) и (9.3.53), мы получаем

$$(9.3.54) \quad \bar{b} = a^* *_f^* e_2$$

(9.3.48) следует из сравнения (9.3.51) и (9.3.54) и теоремы 9.3.18. \square

9.3.3. Полилинейное отображение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.3.26. Пусть D - коммутативное кольцо. Приведенный полиморфизм D -модулей A_1, \dots, A_n в D -модуль S

$$f : A_1 \times \dots \times A_n \rightarrow S$$

называется **полилинейным отображением** D -модулей A_1, \dots, A_n в D -модуль S . Обозначим $\mathcal{L}(D; A_1 \times \dots \times A_n \rightarrow S)$ множество полилинейных отображений D -модулей A_1, \dots, A_n в D -модуль S . Обозначим $\mathcal{L}(D; A^n \rightarrow S)$ множество n -линейных отображений D -модуля A ($A_1 = \dots = A_n = A$) в D -модуль S . \square

ТЕОРЕМА 9.3.27. Пусть D - коммутативное кольцо. Полилинейное отображение D -модулей A_1, \dots, A_n в D -модуль S

$$f : A_1 \times \dots \times A_n \rightarrow S$$

удовлетворяет равенствам

$$f \circ (a_1, \dots, a_i + b_i, \dots, a_n) = f \circ (a_1, \dots, a_i, \dots, a_n) + f \circ (a_1, \dots, b_i, \dots, a_n)$$

$$f \circ (a_1, \dots, pa_i, \dots, a_n) = pf \circ (a_1, \dots, a_i, \dots, a_n)$$

$$f \circ (a_1, \dots, a_i + b_i, \dots, a_n) = f \circ (a_1, \dots, a_i, \dots, a_n) + f \circ (a_1, \dots, b_i, \dots, a_n)$$

$$f \circ (a_1, \dots, pa_i, \dots, a_n) = pf \circ (a_1, \dots, a_i, \dots, a_n)$$

$$1 \leq i \leq n \quad a_i, b_i \in A_i \quad p \in D$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Теорема является следствием определений 4.4.4, 9.3.23, 9.3.26 и теоремы 9.3.24. \square

ТЕОРЕМА 9.3.28. Пусть D - коммутативное кольцо. Пусть A_1, \dots, A_n, S - D -модули. Отображение

$$(9.3.55) \quad f + g : A_1 \times \dots \times A_n \rightarrow S \quad f, g \in \mathcal{L}(D; A_1 \times \dots \times A_n \rightarrow S)$$

определённое равенством

$$(9.3.56) \quad (f + g) \circ (a_1, \dots, a_n) = f \circ (a_1, \dots, a_n) + g \circ (a_1, \dots, a_n)$$

называется **суммой полилинейных отображений** f и g и является полилинейным отображением. Множество $\mathcal{L}(D; A_1 \times \dots \times A_n \rightarrow S)$ является абелевой группой относительно суммы отображений.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно теореме 9.3.27

$$(9.3.57) \quad f \circ (a_1, \dots, a_i + b_i, \dots, a_n) = f \circ (a_1, \dots, a_i, \dots, a_n) + f \circ (a_1, \dots, b_i, \dots, a_n)$$

$$(9.3.58) \quad f \circ (a_1, \dots, pa_i, \dots, a_n) = pf \circ (a_1, \dots, a_i, \dots, a_n)$$

$$(9.3.59) \quad g \circ (a_1, \dots, a_i + b_i, \dots, a_n) = g \circ (a_1, \dots, a_i, \dots, a_n) + g \circ (a_1, \dots, b_i, \dots, a_n)$$

$$(9.3.60) \quad g \circ (a_1, \dots, pa_i, \dots, a_n) = pg \circ (a_1, \dots, a_i, \dots, a_n)$$

Равенство

$$\begin{aligned}
 & (f + g) \circ (x_1, \dots, x_i + y_i, \dots, x_n) \\
 &= f \circ (x_1, \dots, x_i + y_i, \dots, x_n) + g \circ (x_1, \dots, x_i + y_i, \dots, x_n) \\
 (9.3.61) \quad &= f \circ (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) + f \circ (x_1, \dots, y_i, \dots, x_n) \\
 &+ g \circ (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) + g \circ (x_1, \dots, y_i, \dots, x_n) \\
 &= (f + g) \circ (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) + (f + g) \circ (x_1, \dots, y_i, \dots, x_n)
 \end{aligned}$$

является следствием равенств (9.3.56), (9.3.57), (9.3.59). Равенство

$$\begin{aligned}
 & (f + g) \circ (x_1, \dots, px_i, \dots, x_n) \\
 &= f \circ (x_1, \dots, px_i, \dots, x_n) + g \circ (x_1, \dots, px_i, \dots, x_n) \\
 (9.3.62) \quad &= pf \circ (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) + pg \circ (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) \\
 &= p(f \circ (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) + g \circ (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)) \\
 &= p(f + g) \circ (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)
 \end{aligned}$$

является следствием равенств (9.3.56), (9.3.58), (9.3.60). Из равенств (9.3.61), (9.3.62) и теоремы 9.3.27 следует, что отображение (9.3.55) является полилинейным отображением D -модулей.

Пусть $f, g, h \in \mathcal{L}(D; A_1 \times \dots \times A_n \rightarrow S)$. Для любого $a = (a_1, \dots, a_n)$, $a_1 \in A_1, \dots, a_n \in A_n$,

$$\begin{aligned}
 (f + g) \circ a &= f \circ a + g \circ a = g \circ a + f \circ a \\
 &= (g + f) \circ a \\
 ((f + g) + h) \circ a &= (f + g) \circ a + h \circ a = (f \circ a + g \circ a) + h \circ a \\
 &= f \circ a + (g \circ a + h \circ a) = f \circ a + (g + h) \circ a \\
 &= (f + (g + h)) \circ a
 \end{aligned}$$

Следовательно, сумма полилинейных отображений коммутативна и ассоциативна.

Из равенства (9.3.56) следует, что отображение

$$0 : v \in A_1 \times \dots \times A_n \rightarrow 0 \in S$$

является нулём операции сложения

$$(0 + f) \circ (a_1, \dots, a_n) = 0 \circ (a_1, \dots, a_n) + f \circ (a_1, \dots, a_n) = f \circ (a_1, \dots, a_n)$$

Из равенства (9.3.56) следует, что отображение

$$-f : (a_1, \dots, a_n) \in A_1 \times \dots \times A_n \rightarrow -(f \circ (a_1, \dots, a_n)) \in S$$

является отображением, обратным отображению f

$$f + (-f) = 0$$

так как

$$\begin{aligned}
 (f + (-f)) \circ (a_1, \dots, a_n) &= f \circ (a_1, \dots, a_n) + (-f) \circ (a_1, \dots, a_n) \\
 &= f \circ (a_1, \dots, a_n) - f \circ (a_1, \dots, a_n) \\
 &= 0 = 0 \circ (a_1, \dots, a_n)
 \end{aligned}$$

Из равенства

$$\begin{aligned} (f + g) \circ (a_1, \dots, a_n) &= f \circ (a_1, \dots, a_n) + g \circ (a_1, \dots, a_n) \\ &= g \circ (a_1, \dots, a_n) + f \circ (a_1, \dots, a_n) \\ &= (g + f) \circ (a_1, \dots, a_n) \end{aligned}$$

следует, что сумма отображений коммутативно. Следовательно, множество $\mathcal{L}(D; A_1 \times \dots \times A_n \rightarrow S)$ является абелевой группой. \square

СЛЕДСТВИЕ 9.3.29. Пусть A_1, A_2 - D -модули. Отображение

$$(9.3.63) \quad f + g : A_1 \rightarrow A_2 \quad f, g \in \mathcal{L}(D; A_1 \rightarrow A_2)$$

определённое равенством

$$(9.3.64) \quad (f + g) \circ x = f \circ x + g \circ x$$

называется **суммой отображений** f и g и является линейным отображением. Множество $\mathcal{L}(D; A_1; A_2)$ является абелевой группой относительно суммы отображений. \square

ТЕОРЕМА 9.3.30. Пусть D - коммутативное кольцо. Пусть A_1, \dots, A_n, S - D -модули. Отображение

$$(9.3.65) \quad d f : A_1 \times \dots \times A_n \rightarrow S \quad d \in D \quad f \in \mathcal{L}(D; A_1 \times \dots \times A_n \rightarrow S)$$

определённое равенством

$$(9.3.66) \quad (d f) \circ (a_1, \dots, a_n) = d(f \circ (a_1, \dots, a_n))$$

называется **произведением отображения f на скаляр d** и является полилинейным отображением. Представление

$$(9.3.67) \quad a : f \in \mathcal{L}(D; A_1 \times \dots \times A_n \rightarrow S) \rightarrow a f \in \mathcal{L}(D; A_1 \times \dots \times A_n \rightarrow S)$$

кольца D в абелевой группе $\mathcal{L}(D; A_1 \times \dots \times A_n \rightarrow S)$ порождает структуру D -модуля.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно теореме 9.3.27

$$(9.3.68) \quad f \circ (a_1, \dots, a_i + b_i, \dots, a_n) = f \circ (a_1, \dots, a_i, \dots, a_n) + f \circ (a_1, \dots, b_i, \dots, a_n)$$

$$(9.3.69) \quad f \circ (a_1, \dots, p a_i, \dots, a_n) = p f \circ (a_1, \dots, a_i, \dots, a_n)$$

Равенство

$$\begin{aligned} &(p f) \circ (x_1, \dots, x_i + y_i, \dots, x_n) \\ &= p f \circ (x_1, \dots, x_i + y_i, \dots, x_n) \\ (9.3.70) \quad &= p (f \circ (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) + f \circ (x_1, \dots, y_i, \dots, x_n)) \\ &= p(f \circ (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)) + p(f \circ (x_1, \dots, y_i, \dots, x_n)) \\ &= (p f) \circ (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) + (p f) \circ (x_1, \dots, y_i, \dots, x_n) \end{aligned}$$

является следствием равенств (9.3.66), (9.3.68). Равенство

$$\begin{aligned} &(p f) \circ (x_1, \dots, q x_i, \dots, x_n) \\ (9.3.71) \quad &= p(f \circ (x_1, \dots, q x_i, \dots, x_n)) = p q (f \circ (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)) \\ &= q p (f \circ (x_1, \dots, x_n)) = q(p f) \circ (x_1, \dots, x_n) \end{aligned}$$

является следствием равенств (9.3.66), (9.3.69). Из равенств (9.3.70), (9.3.71) и теоремы 9.3.27 следует, что отображение (9.3.65) является полилинейным отображением D -модулей.

Равенство

$$(9.3.72) \quad (p + q)f = pf + qf$$

является следствием равенства

$$\begin{aligned} ((p + q)f) \circ (x_1, \dots, x_n) &= (p + q)(f \circ (x_1, \dots, x_n)) \\ &= p(f \circ (x_1, \dots, x_n)) + q(f \circ (x_1, \dots, x_n)) \\ &= (pf) \circ (x_1, \dots, x_n) + (qf) \circ (x_1, \dots, x_n) \end{aligned}$$

Равенство

$$(9.3.73) \quad p(qf) = (pq)f$$

является следствием равенства

$$\begin{aligned} (p(qf)) \circ (x_1, \dots, x_n) &= p(qf) \circ (x_1, \dots, x_n) = p(qf \circ (x_1, \dots, x_n)) \\ &= (pq) f \circ (x_1, \dots, x_n) = ((pq)f) \circ (x_1, \dots, x_n) \end{aligned}$$

Из равенств (9.3.72), (9.3.73), следует, что отображение (9.3.67) является представлением кольца D в абелевой группе $\mathcal{L}(D; A_1 \times \dots \times A_n \rightarrow S)$. Так как указанное представление эффективно, то, согласно определению 9.3.1 и теореме 9.3.28, абелевая группа $\mathcal{L}(D; A_1 \rightarrow A_2)$ является D -модулем. \square

СЛЕДСТВИЕ 9.3.31. Пусть A_1, A_2 - D -модули. Отображение

$$(9.3.74) \quad df : A_1 \rightarrow A_2 \quad d \in D \quad f \in \mathcal{L}(D; A_1 \rightarrow A_2)$$

определённое равенством

$$(9.3.75) \quad (df) \circ x = d(f \circ x)$$

называется **произведением отображения f на скаляр d** и является линейным отображением. Представление

$$(9.3.76) \quad a : f \in \mathcal{L}(D; A_1 \rightarrow A_2) \rightarrow af \in \mathcal{L}(D; A_1 \rightarrow A_2)$$

кольца D в абелевой группе $\mathcal{L}(D; A_1 \rightarrow A_2)$ порождает структуру D -модуля. \square

9.4. Алгебра над коммутативным кольцом

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.4.1. Пусть D - коммутативное кольцо. D -модуль A называется **алгеброй над кольцом D** или **D -алгеброй**, если определена операция произведения^{9.7} в A

$$(9.4.1) \quad vw = C \circ (v, w)$$

где C - билинейное отображение

$$C : A \times A \rightarrow A$$

Если A является свободным D -модулем, то A называется **свободной алгеброй над кольцом D** . \square

^{9.7} Я слеую определению, приведенному в [20], страница 1, [13], страница 4. Утверждение, верное для произвольного D -модуля, верно также для D -алгебры.

ТЕОРЕМА 9.4.2. Пусть D - коммутативное кольцо и A - абелева группа.
Диаграмма представлений

$$\begin{array}{ccc} D \xrightarrow{g_{12}} A \xrightarrow{g_{23}} A & & g_{12}(d) : v \rightarrow dv \\ & \uparrow g_{12} & g_{23}(v) : w \rightarrow C \circ (v, w) \\ & D & C \in \mathcal{L}(D; A^2 \rightarrow A) \end{array}$$

порождает структуру D -алгебры A .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Структура D -модуля A порождена эффективным представлением

$$g_{12} : D \xrightarrow{*} A$$

кольца D в абелевой группе A .

ЛЕММА 9.4.3. Пусть в D -модуле A определена структура D -алгебры A , порождённая произведением

$$vw = C \circ (v, w)$$

Левый сдвиг D -модуля A , определённый равенством

$$(9.4.2) \quad l \circ v : w \in A \rightarrow vw \in A$$

порождает представление

$$\begin{array}{ccc} A \xrightarrow{g_{23}} A & & g_{23} : v \rightarrow l \circ v \\ & & g_{23} \circ v : w \rightarrow (l \circ v) \circ w \end{array}$$

D -модуля A в D -модуле A

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно определениям 9.4.1 и 9.3.26, левый сдвиг D -модуля A является линейным отображением. Согласно определению 9.3.23, отображение $l \circ v$ является эндоморфизмом D -модуля A . Равенство

$$(9.4.3) \quad (l \circ (v_1 + v_2)) \circ w = (v_1 + v_2)w = v_1w + v_2w = (l \circ v_1) \circ w + (l \circ v_2) \circ w$$

является следствием определения 9.3.26 и равенства (9.4.2). Согласно следствию 9.3.29, равенство

$$(9.4.4) \quad l \circ (v_1 + v_2) = l \circ v_1 + l \circ v_2$$

является следствием равенства (9.4.3). Равенство

$$(9.4.5) \quad (l \circ (dv)) \circ w = (dv)w = d(vw) = d((l \circ v) \circ w)$$

является следствием определения 9.3.26 и равенства (9.4.2). 9.3.29, равенство

$$(9.4.6) \quad l \circ (dv) = d(l \circ v)$$

является следствием равенства (9.4.5). Лемма является следствием равенств (9.4.4), (9.4.6). \odot

ЛЕММА 9.4.4. Представление

$$\begin{array}{ccc} A \xrightarrow{g_{23}} A & & g_{23} : v \rightarrow l \circ v \\ & & g_{23} \circ v : w \rightarrow (l \circ v) \circ w \end{array}$$

D -модуля A в D -модуле A определяет произведение в D -модуле A согласно правилу

$$ab = (g_{23} \circ a) \circ b$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Поскольку отображение $g_{23} \circ v$ является эндоморфизмом D -модуля A , то

$$(9.4.7) \quad \begin{aligned} (g_{23} \circ v)(w_1 + w_2) &= (g_{23} \circ v) \circ w_1 + (g_{23} \circ v) \circ w_2 \\ (g_{23} \circ v) \circ (dw) &= d((g_{23} \circ v) \circ w) \end{aligned}$$

Поскольку отображение g_{23} является линейным отображением

$$g_{23} : A \rightarrow \mathcal{L}(D; A \rightarrow A)$$

то, согласно следствиям 9.3.29, 9.3.31,

$$(9.4.8) \quad (g_{23} \circ (v_1 + v_2)) \circ w = (g_{23} \circ v_1 + g_{23} \circ v_2)(w) = (g_{23} \circ v_1) \circ w + (g_{23} \circ v_2) \circ w$$

$$(9.4.9) \quad (g_{23} \circ (dv)) \circ w = (d(g_{23} \circ v)) \circ w = d((g_{23} \circ v) \circ w)$$

Из равенств (9.4.7), (9.4.8), (9.4.9) и определения 9.3.26, следует, что отображение g_{23} является билинейным отображением. Следовательно, отображение g_{23} определяет произведение в D -модуле A согласно правилу

$$ab = (g_{23} \circ a) \circ b$$

◊

Теорема является следствием лем 9.4.3, 9.4.4. □

Обычно, когда мы рассматриваем D -алгебру A , мы выбираем базис \bar{e} соответствующего D -модуля A . Этот выбор удобен, так как если D -модуль A является свободным D -модулем, то разложение вектора однозначно относительно базиса D -модуля A . Это, в частности, позволяет описать операции произведения, указав структурные константы алгебры относительно заданного базиса.

В общем случае, базис R -модуля A может оказаться множеством образующих. Например, если в векторном пространстве H , в котором задана алгебра кватернионов над полем действительных чисел, рассмотреть базис

$$(9.4.10) \quad e_0 = 1 \quad e_1 = i \quad e_2 = j \quad e_3 = k$$

то в алгебре H верно равенство

$$(9.4.11) \quad \begin{aligned} e_0 &= -e_1 e_1 = -e_2 e_2 \\ e_3 &= e_1 e_2 \end{aligned}$$

Следовательно, множество (e_1, e_2) является базисом алгебры H . Следствием равенства (9.4.11) является неоднозначность представления кватерниона относительно заданного базиса. А именно, кватернион $a \in H$ можно записать в виде

$$a = (a^0 - a^4)e_1 e_1 + a^4 e_2 e_2 + a^1 e_1 + a^2 e_2 + a^3 e_1 e_2$$

где a^4 - произвольно.

9.5. Левый модуль над алгеброй

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.5.1. Эффективное левостороннее представление

$$(9.5.1) \quad f : A \xrightarrow{*} V \quad f(a) : v \in V \rightarrow av \in V \quad a \in A$$

ассоциативной D -алгебры A в D -модуле V называется **левым модулем над D -алгеброй A** . Мы также будем говорить, что D -модуль V является **левым A -модулем** или **A^* -модулем**. V -число называется **вектором**. \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.5.2. Пусть A - алгебра с делением. Эффективное левостороннее представление

$$f : A \xrightarrow{*} V \quad f(a) : v \in V \rightarrow av \in V \quad a \in A$$

абелевой группы A в D -модуле V называется **левым векторным пространством над D -алгеброй A** . Мы также будем говорить, что D -модуль V является **левым A -векторным пространством** или **A^* -векторным пространством**. V -число называется **вектором**. \square

ТЕОРЕМА 9.5.3. Следующая диаграмма представлений описывает левый A -модуль V

$$(9.5.2) \quad \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{g_{23}} & A & \xrightarrow{g_{3,4}} & V \\ & \searrow^{g_{12}} & \uparrow^{g_{12}} & & \uparrow^{g_{1,4}} \\ & & D & & \end{array}$$

$$\begin{aligned} g_{12}(d) &: a \rightarrow da \\ g_{23}(v) &: w \rightarrow C(w, v) \\ C &\in \mathcal{L}(A^2 \rightarrow A) \\ g_{3,4}(a) &: v \rightarrow va \\ g_{1,4}(d) &: v \rightarrow dv \end{aligned}$$

В диаграмме представлений (9.5.2) верна **коммутативность представлений** коммутативного кольца D и D -алгебры A в абелевой группе V

$$(9.5.3) \quad a(dv) = d(av)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Диаграмма представлений (9.5.2) является следствием определения 9.5.1 и теоремы 9.4.2. Равенство (9.5.3) является следствием утверждения, что левостороннее преобразование $g_{3,4}(a)$ является эндоморфизмом D -модуля V . \square

ТЕОРЕМА 9.5.4. Пусть g - эффективное левостороннее представление D -алгебры A в D -модуле V . Тогда D -алгебра A ассоциативна.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $a, b, c \in A, v \in V$. Равенство

$$(9.5.4) \quad (ab)v = a(bv)$$

является следствием утверждения, что левостороннее представление g является левосторонним представлением мультипликативной группы D -алгебры A . Равенство

$$(9.5.5) \quad a(b(cv)) = a((bc)v) = (a(bc))v$$

является следствием равенства (9.5.4). Так как $cv \in A$, равенство

$$(9.5.6) \quad a(b(cv)) = (ab)(cv) = ((ab)c)v$$

является следствием равенства (9.5.4). Равенство

$$(9.5.7) \quad (a(bc))v = ((ab)c)v$$

является следствием равенств (9.5.5), (9.5.7). Поскольку v - произвольный вектор A -модуля V , равенство

$$(9.5.8) \quad a(bc) = (ab)c$$

является следствием равенства (9.5.7). Следовательно, D -алгебра A ассоциативна. \square

ТЕОРЕМА 9.5.5. Пусть V является левым A -модулем. Для любого вектора $v \in V$, вектор, порождённый диаграммой представлений (9.5.2), имеет следующий вид

$$(9.5.9) \quad (a + n)v = av + nv \quad a \in A \quad n \in D$$

9.5.5.1: Множество отображений

$$(9.5.10) \quad a + n : v \in V \rightarrow (a + n)v \in V$$

порождает^{9.8} D -алгебру $A_{(1)}$ где сложение определено равенством

$$(9.5.11) \quad (a + n) + (b + m) = (a + b) + (n + m)$$

и произведение определено равенством

$$(9.5.12) \quad (a + n)(b + m) = (ab + ma + nb) + (nm)$$

D -алгебра $A_{(1)}$ называется **унитальным расширением** D -алгебры A .

Если D -алгебра A имеет единицу, то	$D \subseteq A$	$A_{(1)} = A$
Если D -алгебра A является идеалом D , то	$A \subseteq D$	$A_{(1)} = D$
В противном случае	$A_{(1)} = A \oplus D$	

9.5.5.2: D -алгебра A является левым идеалом D -алгебры $A_{(1)}$.

9.5.5.3: Множество преобразований (9.5.9) порождает левостороннее представление D -алгебры $A_{(1)}$ в абелевой группе V .

Мы будем пользоваться обозначением $A_{(1)}v$ для множества векторов, порождённых вектором v .

ТЕОРЕМА 9.5.6. Элементы левого A -модуля V удовлетворяют соотношениям

9.5.6.1: **закон ассоциативности**

$$(9.5.13) \quad (pq)v = p(qv)$$

9.5.6.2: **закон дистрибутивности**

$$(9.5.14) \quad p(v + w) = pv + pw$$

$$(9.5.15) \quad (p + q)v = pv + qv$$

9.5.6.3: **закон унитарности**

$$(9.5.16) \quad 1v = v$$

^{9.8} Смотри определение унитарного расширения также на страницах [6]-52, [7]-64.

для любых $p, q \in A_{(1)}$, $v, w \in V$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМ 9.5.5, 9.5.6. Пусть $v \in V$.

ЛЕММА 9.5.7. Пусть $d \in D$, $a \in A$. Отображение (9.5.10) является эндоморфизмом абелевой группы V .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Утверждения $dv \in V$, $av \in V$ являются следствием теорем 6.1.4, 9.5.3. Так как V является абелевой группой, то

$$dv + av \in V \quad d \in D \quad a \in A$$

Следовательно, для любого D -числа d и любого A -числа a , мы определили отображение (9.5.10). Поскольку преобразование $g_{1,4}(d)$ и левостороннее преобразование $g_{3,4}(a)$ являются эндоморфизмами абелевой группы V , то отображение (9.5.10) является эндоморфизмом абелевой группы V . \odot

Пусть $A_{(1)}$ - множество отображений (9.5.10). Равенство (9.5.14) является следствием леммы 9.5.7.

Пусть $p = a + n \in A_{(1)}$, $q = b + m \in A_{(1)}$. Согласно утверждению 9.3.3.3, мы определим сумму $A_{(1)}$ -чисел p и q равенством (9.5.15). Равенство

$$(9.5.17) \quad ((a + n) + (b + m))v = (a + n)v + (b + m)v$$

является следствием равенства (9.5.15). Равенство

$$(9.5.18) \quad (n + m)v = cn + dm$$

является следствием утверждения, что представление $g_{1,4}$ является гомоморфизмом аддитивной группы кольца D . Равенство

$$(9.5.19) \quad (a + b)v = av + bv$$

является следствием утверждения, что левостороннее представление $g_{3,4}$ является гомоморфизмом аддитивной группы D -алгебры A . Так как V является абелевой группой, то равенство

$$(9.5.20) \quad \begin{aligned} ((a + n) + (b + m))v &= av + nv + bv + mv = av + bv + nv + mv \\ &= (a + b)v + (n + m)v = ((a + b) + (n + m))v \end{aligned}$$

является следствием равенств (9.5.17), (9.5.18), (9.5.19). Из равенства (9.5.20) следует, что определение (9.5.11) суммы на множестве $A_{(1)}$ не зависит от вектора v .

Равенства (9.5.13), (9.5.16) являются следствием утверждения 9.5.5.3. Пусть $p = a + n \in A_{(1)}$, $q = b + m \in A_{(1)}$. Так как произведение в D -алгебре A может быть неассоциативным, то опираясь на теорему 9.5.6, мы рассмотрим произведение $A_{(1)}$ -чисел p и q как билинейное отображение

$$f : A_{(1)} \times A_{(1)} \rightarrow A_{(1)}$$

такое, что верны равенства

$$(9.5.21) \quad f(a, b) = ab \quad a, b \in A$$

$$(9.5.22) \quad f(1, p) = f(p, 1) = p \quad p \in A_{(1)} \quad 1 \in D_{(1)}$$

Равенство

$$\begin{aligned}
 (9.5.23) \quad (a+n)(b+m) &= f(a+n, b+m) \\
 &= f(a, b) + f(a, m) + f(n, b) + f(n, m) \\
 &= f(a, b) + mf(a, 1) + nf(1, b) + nf(1, m) \\
 &= ab + ma + nb + nm
 \end{aligned}$$

является следствием равенств (9.5.21), (9.5.22). Равенство (9.5.12) является следствием равенства (9.5.23).

Утверждение 9.5.5.2 является следствием равенства (9.5.12). \square

Билинейное отображение

$$(a, v) \in A \times V \rightarrow av \in V$$

порождённое левосторонним представлением $g_{2,3}$ называется **левосторонним произведением** вектора на скаляр.

ТЕОРЕМА 9.5.8. Пусть V - левый A -модуль. Множество векторов, порождённое множеством векторов $v = (v_i \in V, i \in I)$, имеет вид^{9.9}

$$(9.5.24) \quad J(v) = \left\{ w : w = \sum_{i \in I} c^i v_i, c^i \in A_{(1)}, |\{i : c^i \neq 0\}| < \infty \right\}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Мы докажем теорему по индукции, опираясь на теорему 6.1.4. Согласно теореме 6.1.4, мы должны доказать следующие утверждения:

$$9.5.8.1: v_k \in X_0 \subseteq J(v)$$

$$9.5.8.2: c^k v_k \in J(v), c^k \in A_{(1)}, k \in I$$

$$9.5.8.3: \sum_{k \in I} c^k v_k \in J(v), c^k \in A_{(1)}, |\{i : c^i \neq 0\}| < \infty$$

$$9.5.8.4: v, w \in J(v) \Rightarrow v + w \in J(v)$$

$$9.5.8.5: a \in A, v \in J(v) \Rightarrow av \in J(v)$$

- Для произвольного $v_k \in v$, положим $c^i = \delta_k^i \in A_{(1)}$. Тогда

$$(9.5.25) \quad v_k = \sum_{i \in I} c^i v_i$$

Утверждение 9.5.8.1 следует из (9.5.24), (9.5.25).

- Утверждение 9.5.8.2 является следствием теорем 6.1.4, 9.5.5 и утверждения 9.5.8.1.
- Так как V является абелевой группой, то утверждение 9.5.8.3 следует из утверждения 9.5.8.2 и теорем 6.1.4, 9.2.3.
- Пусть $w_1, w_2 \in X_k \subseteq J(v)$. Так как V является абелевой группой, то, согласно утверждению 6.1.4.3,

$$(9.5.26) \quad w_1 + w_2 \in X_{k+1}$$

Согласно равенству (9.5.24), существуют $A_{(1)}$ -числа $w_1^i, w_2^i, i \in I$, такие, что

$$(9.5.27) \quad w_1 = \sum_{i \in I} w_1^i v_i \quad w_2 = \sum_{i \in I} w_2^i v_i$$

^{9.9} Для множества A , мы обозначим $|A|$ мощность множества A . Запись $|A| < \infty$ означает, что множество A конечно.

где множества

$$(9.5.28) \quad H_1 = \{\mathbf{i} \in \mathbf{I} : w_1^{\mathbf{i}} \neq 0\} \quad H_2 = \{\mathbf{i} \in \mathbf{I} : w_2^{\mathbf{i}} \neq 0\}$$

конечны. Так как V является абелевой группой, то из равенства (9.5.27) следует, что

$$(9.5.29) \quad w_1 + w_2 = \sum_{\mathbf{i} \in \mathbf{I}} w_1^{\mathbf{i}} v_{\mathbf{i}} + \sum_{\mathbf{i} \in \mathbf{I}} w_2^{\mathbf{i}} v_{\mathbf{i}} = \sum_{\mathbf{i} \in \mathbf{I}} (w_1^{\mathbf{i}} v_{\mathbf{i}} + w_2^{\mathbf{i}} v_{\mathbf{i}})$$

Равенство

$$(9.5.30) \quad w_1 + w_2 = \sum_{\mathbf{i} \in \mathbf{I}} (w_1^{\mathbf{i}} + w_2^{\mathbf{i}}) v_{\mathbf{i}}$$

является следствием равенств (9.5.15), (9.5.29). Из равенства (9.5.28) следует, что множество

$$\{\mathbf{i} \in \mathbf{I} : w_1^{\mathbf{i}} + w_2^{\mathbf{i}} \neq 0\} \subseteq H_1 \cup H_2$$

конечно.

- Пусть $w \in X_k \subseteq J(v)$. Согласно утверждению 6.1.4.4, для любого $A_{(1)}$ -числа a ,

$$(9.5.31) \quad aw \in X_{k+1}$$

Согласно равенству (9.5.24), существуют $A_{(1)}$ -числа $w^{\mathbf{i}}$, $\mathbf{i} \in \mathbf{I}$, такие, что

$$(9.5.32) \quad w = \sum_{\mathbf{i} \in \mathbf{I}} w^{\mathbf{i}} v_{\mathbf{i}}$$

где

$$(9.5.33) \quad |\{\mathbf{i} \in \mathbf{I} : w^{\mathbf{i}} \neq 0\}| < \infty$$

Из равенства (9.5.32) следует, что

$$(9.5.34) \quad aw = a \sum_{\mathbf{i} \in \mathbf{I}} w^{\mathbf{i}} v_{\mathbf{i}} = \sum_{\mathbf{i} \in \mathbf{I}} a(w^{\mathbf{i}} v_{\mathbf{i}}) = \sum_{\mathbf{i} \in \mathbf{I}} (aw^{\mathbf{i}}) v_{\mathbf{i}}$$

Из утверждения (9.5.33) следует, что множество $\{\mathbf{i} \in \mathbf{I} : aw^{\mathbf{i}} \neq 0\}$ конечно.

Из равенств (9.5.26), (9.5.30), (9.5.31), (9.5.34) следует, что $X_{k+1} \subseteq J(v)$. \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.5.9. Пусть $v = (v_{\mathbf{i}} \in V, \mathbf{i} \in \mathbf{I})$ - множество векторов. Выражение $w^{\mathbf{i}} v_{\mathbf{i}}$ называется **линейной комбинацией** векторов $v_{\mathbf{i}}$. Вектор $\bar{w} = w^{\mathbf{i}} v_{\mathbf{i}}$ называется **линейно зависимым** от векторов $v_{\mathbf{i}}$. \square

Представим множество $A_{(1)}$ -чисел $w^{\mathbf{i}}$, $\mathbf{i} \in \mathbf{I}$, в виде матрицы

$$w = \begin{pmatrix} w^1 \\ \dots \\ w^n \end{pmatrix}$$

Представим множество векторов $v_{\mathbf{i}}$, $\mathbf{i} \in \mathbf{I}$, в виде матрицы

$$v = \begin{pmatrix} v_1 & \dots & v_n \end{pmatrix}$$

Тогда мы можем записать линейную комбинацию векторов $\bar{w} = w^{\mathbf{i}} v_{\mathbf{i}}$ в виде

$$\bar{w} = w^* *_v v$$

ТЕОРЕМА 9.5.10. Пусть A - ассоциативная D -алгебра с делением. Если уравнение

$$w^i v_i = 0$$

предполагает существования индекса $i = j$ такого, что $w^j \neq 0$, то вектор v_j линейно зависит от остальных векторов v .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Теорема является следствием равенства

$$v_j = \sum_{i \in I \setminus \{j\}} (w^j)^{-1} w^i v_i$$

и определения 9.5.9. □

Очевидно, что для любого множества векторов v_i ,

$$w^i = 0 \Rightarrow w^* v = 0$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.5.11. Множество векторов^{9.10} $v_i, i \in I$, левого A -модуля V **линейно независимо**, если $w = 0$ следует из уравнения

$$w^i v_i = 0$$

В противном случае, множество векторов $v_i, i \in I$, **линейно зависимо**. □

Следующее определение является следствием теорем 9.5.8, 6.1.4 и определения 6.1.5.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.5.12. $J(v)$ называется **подмодулем, порождённым множеством v** , а v - **множеством образующих** подмодуля $J(v)$. В частности, **множеством образующих** левого D -модуля V будет такое подмножество $X \subset V$, что $J(X) = V$. □

Следующее определение является следствием теорем 9.5.8, 6.1.4 и определения 6.2.6.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.5.13. Если множество $X \subset V$ является множеством образующих левого D -модуля V , то любое множество $Y, X \subset Y \subset V$ также является множеством образующих левого D -модуля V . Если существует минимальное множество X , порождающее левый D -модуль V , то такое множество X называется **базисом** левого D -модуля V . □

ТЕОРЕМА 9.5.14. Множество векторов $\bar{e} = (e_i, i \in I)$ является базисом левого A -модуля V , если верны следующие утверждения.

9.5.14.1: Произвольный вектор $v \in V$ является линейной комбинацией векторов множества \bar{e} .

9.5.14.2: Вектор e_i нельзя представить в виде линейной комбинации остальных векторов множества \bar{e} .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно утверждению 9.5.14.1, теореме 9.5.8 и определению 9.5.9, множество \bar{e} порождает левый A -модуль V (определение 9.5.12). Согласно утверждению 9.5.14.2, множество \bar{e} является минимальным множеством, порождающим левый A -модуль V . Согласно определению 9.5.13, множество \bar{e} является базисом левого A -модуля V . □

^{9.10} Я следую определению в [2], страница 100.

ТЕОРЕМА 9.5.15. Пусть A - ассоциативная D -алгебра с делением. Множество векторов $\bar{e} = (e_i, i \in I)$ является базисом левого A -векторного пространства V , если векторы e_i линейно независимы и любой вектор $v \in V$ линейно зависит от векторов e_i .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть множество векторов $e_i, i \in I$, линейно зависимо. Тогда в равенстве

$$w^i e_i = 0$$

существует индекс $i = j$ такой, что $w^j \neq 0$. Согласно теореме 9.5.10, вектор e_j линейно зависит от остальных векторов множества \bar{e} . Согласно определению 9.5.13, множество векторов $e_i, i \in I$, не является базисом левого A -векторного пространства V .

Следовательно, если множество векторов $e_i, i \in I$, является базисом, то эти векторы линейно независимы. Так как произвольный вектор $v \in V$ является линейной комбинацией векторов $e_i, i \in I$, то множество векторов $v, e_i, i \in I$, не является линейно независимым. \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.5.16. Пусть \bar{e} - базис левого A -модуля V , и вектор $\bar{v} \in V$ имеет разложение

$$\bar{v} = v^* e = v^i e_i$$

относительно базиса \bar{e} . $A_{(1)}$ -числа v^i называются **координатами** вектора \bar{v} относительно базиса \bar{e} . Матрица $A_{(1)}$ -чисел $v = (v^i, i \in I)$ называется **координатной матрицей** вектора \bar{v} в базисе \bar{e} . \square

ТЕОРЕМА 9.5.17. Пусть A - ассоциативная D -алгебра. Пусть \bar{e} - базис левого A -модуля V . Пусть

$$(9.5.35) \quad w^i e_i = 0$$

линейная зависимость векторов базиса \bar{e} . Тогда

9.5.17.1: $A_{(1)}$ -число $w^i, i \in I$, не имеет обратного элемента в D -алгебре $A_{(1)}$.

9.5.17.2: Множество A' матриц $w = (w^i, i \in I)$ порождает левый A -модуль.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Допустим существует матрица $w = (w^i, i \in I)$ такая, что равенство (9.5.35) верно и существует индекс $i = j$ такой, что $w^j \neq 0$. Если мы положим, что $A_{(1)}$ -число c^j имеет обратный, то равенство

$$e_j = \sum_{i \in I \setminus \{j\}} (w^j)^{-1} w^i e_i$$

является следствием равенства (9.5.35). Следовательно вектор e_j является линейной комбинацией остальных векторов множества \bar{e} и множество \bar{e} не является базисом. Следовательно, наше предположение неверно, и $A_{(1)}$ -число c^j не имеет обратного.

Пусть матрицы $b = (b^i, i \in I) \in A', c = (c^i, i \in I) \in A'$. Из равенств

$$b^i e_i = 0$$

$$c^i e_i = 0$$

следует

$$(b^i + c^i) e_i = 0$$

Следовательно, множество A' является абелевой группой.

Пусть матрица $c = (c^i, i \in I) \in A'$ и $a \in A$. Из равенства

$$c^i e_i = 0$$

следует

$$(ac^i)e_i = 0$$

Следовательно, абелева группа A' является левым A -модулем. \square

ТЕОРЕМА 9.5.18. Пусть левый A -модуль V имеет базис \bar{e} такой, что в равенстве

$$(9.5.36) \quad w^i e_i = 0$$

существует индекс $i = j$ такой, что $w^j \neq 0$. Тогда

9.5.18.1: Матрица $w = (w^i, i \in I)$ определяет координаты вектора $0 \in V$ относительно базиса \bar{e} .

9.5.18.2: Координаты вектора \bar{v} относительно базиса \bar{e} определены однозначно с точностью до выбора координат вектора $0 \in V$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Утверждение 9.5.18.1 является следствием равенства (9.5.36) и определения 9.5.16.

Пусть вектор \bar{v} имеет разложение

$$(9.5.37) \quad \bar{v} = v^* * e = v^i e_i$$

относительно базиса \bar{e} . Равенство

$$(9.5.38) \quad \bar{v} = \bar{v} + 0 = v^i e_i + c^i e_i = (v^i + c^i) e_i$$

является следствием равенств (9.5.36), (9.5.37). Утверждение 9.5.18.2 является следствием равенств (9.5.37), (9.5.38) и определения 9.5.16. \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.5.19. Левый A -модуль V - **свободный левый A -модуль**,^{9.11} если левый A -модуль V имеет базис и векторы базиса линейно независимы. \square

ТЕОРЕМА 9.5.20. Координаты вектора $v \in V$ относительно базиса \bar{e} свободного левого A -модуля V определены однозначно.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Теорема является следствием теоремы 9.5.18 и определений 9.5.11, 9.5.19. \square

9.6. Правый модуль над алгеброй

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.6.1. Эффективное правостороннее представление

$$(9.6.1) \quad f : A \dashrightarrow V \quad f(a) : v \in V \rightarrow va \in V \quad a \in A$$

ассоциативной D -алгебры A в D -модуле V называется **правым модулем над D -алгеброй A** . Мы также будем говорить, что D -модуль V является **правым A -модулем** или **$*A$ -модулем**. V -число называется **вектором**. \square

^{9.11} Я следую определению в [2], страница 103.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.6.2. Пусть A - алгебра с делением. Эффективное правостороннее представление

$$f : A \xrightarrow{*} V \quad f(a) : v \in V \rightarrow va \in V \quad a \in A$$

абелевой группы A в D -модуле V называется **правым векторным пространством** над D -алгеброй A . Мы также будем говорить, что D -модуль V является **правым A -векторным пространством** или **$*$ A -векторным пространством**. V -число называется **вектором**. \square

ТЕОРЕМА 9.6.3. Следующая диаграмма представлений описывает правый A -модуль V

$$(9.6.2) \quad \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{g_{23}} & A & \xrightarrow{g_{3,4}} & V \\ & \searrow^{g_{12}} & \uparrow^{g_{12}} & & \uparrow^{g_{1,4}} \\ & & D & & \end{array}$$

$$\begin{aligned} g_{12}(d) &: a \rightarrow da \\ g_{23}(v) &: w \rightarrow C(w, v) \\ & C \in \mathcal{L}(A^2 \rightarrow A) \\ g_{3,4}(a) &: v \rightarrow va \\ g_{1,4}(d) &: v \rightarrow vd \end{aligned}$$

В диаграмме представлений (9.6.2) верна **коммутативность представлений** коммутативного кольца D и D -алгебры A в абелевой группе V

$$(9.6.3) \quad (vd)a = (va)d$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Диаграмма представлений (9.6.2) является следствием определения 9.6.1 и теоремы 9.4.2. Равенство (9.6.3) является следствием утверждения, что правостороннее преобразование $g_{3,4}(a)$ является эндоморфизмом D -модуля V . \square

ТЕОРЕМА 9.6.4. Пусть g - эффективное левостороннее представление D -алгебры A в D -модуле V . Тогда D -алгебра A ассоциативна.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $a, b, c \in A, v \in V$. Равенство

$$(9.6.4) \quad v(ab) = (va)b$$

является следствием утверждения, что правостороннее представление g является правосторонним представлением мультипликативной группы D -алгебры A . Равенство

$$(9.6.5) \quad ((vc)b)a = (v(cb))a = v((cb)a)$$

является следствием равенства (9.6.4). Так как $vc \in A$, равенство

$$(9.6.6) \quad ((vc)b)a = (vc)(ba) = v(c(ba))$$

является следствием равенства (9.6.4). Равенство

$$(9.6.7) \quad v((cb)a) = v(c(ba))$$

является следствием равенств (9.6.5), (9.6.7). Поскольку v - произвольный вектор A -модуля V , равенство

$$(9.6.8) \quad (cb)a = c(ba)$$

является следствием равенства (9.6.7). Следовательно, D -алгебра A ассоциативна. \square

ТЕОРЕМА 9.6.5. Пусть V является правым A -модулем. Для любого вектора $v \in V$, вектор, порождённый диаграммой представлений (9.6.2), имеет следующий вид

$$(9.6.9) \quad v(a + n) = va + vn \quad a \in A \quad n \in D$$

9.6.5.1: Множество отображений

$$(9.6.10) \quad a + n : v \in V \rightarrow v(a + n) \in V$$

порождает ^{9.12} D -алгебру $A_{(1)}$ где сложение определено равенством

$$(9.6.11) \quad (a + n) + (b + m) = (a + b) + (n + m)$$

и произведение определено равенством

$$(9.6.12) \quad (a + n)(b + m) = (ab + ma + nb) + (nm)$$

D -алгебра $A_{(1)}$ называется **унитальным расширением** D -алгебры A .

Если D -алгебра A имеет единицу, то	$D \subseteq A$	$A_{(1)} = A$
Если D -алгебра A является идеалом D , то	$A \subseteq D$	$A_{(1)} = D$
В противном случае	$A_{(1)} = A \oplus D$	

9.6.5.2: D -алгебра A является правым идеалом D -алгебры $A_{(1)}$.

9.6.5.3: Множество преобразований (9.6.9) порождает правостороннее представление D -алгебры $A_{(1)}$ в абелевой группе V .

Мы будем пользоваться обозначением $A_{(1)}v$ для множества векторов, порождённых вектором v .

ТЕОРЕМА 9.6.6. Элементы правого A -модуля V удовлетворяют соотношениям

9.6.6.1: **закон ассоциативности**

$$(9.6.13) \quad v(pq) = (vp)q$$

9.6.6.2: **закон дистрибутивности**

$$(9.6.14) \quad (v + w)p = vp + wp$$

$$(9.6.15) \quad v(p + q) = vp + vq$$

9.6.6.3: **закон унитарности**

$$(9.6.16) \quad v1 = v$$

для любых $p, q \in A_{(1)}$, $v, w \in V$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМ 9.6.5, 9.6.6. Пусть $v \in V$.

ЛЕММА 9.6.7. Пусть $d \in D$, $a \in A$. Отображение (9.6.10) является эндоморфизмом абелевой группы V .

^{9.12} Смотри определение унитарного расширения также на страницах [6]-52, [7]-64.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Утверждения $vd \in V$, $va \in V$ являются следствием теорем 6.1.4, 9.6.3. Так как V является абелевой группой, то

$$vd + va \in V \quad d \in D \quad a \in A$$

Следовательно, для любого D -числа d и любого A -числа a , мы определили отображение (9.6.10). Поскольку преобразование $g_{1,4}(d)$ и правостороннее преобразование $g_{3,4}(a)$ являются эндоморфизмами абелевой группы V , то отображение (9.6.10) является эндоморфизмом абелевой группы V . \odot

Пусть $A_{(1)}$ - множество отображений (9.6.10). Равенство (9.6.14) является следствием леммы 9.6.7.

Пусть $p = a + n \in A_{(1)}$, $q = b + m \in A_{(1)}$. Согласно утверждению 9.3.3.3, мы определим сумму $A_{(1)}$ -чисел p и q равенством (9.6.15). Равенство

$$(9.6.17) \quad v((a + n) + (b + m)) = v(a + n) + v(b + m)$$

является следствием равенства (9.6.15). Равенство

$$(9.6.18) \quad v(n + m) = vn + vm$$

является следствием утверждения, что представление $g_{1,4}$ является гомоморфизмом аддитивной группы кольца D . Равенство

$$(9.6.19) \quad v(a + b) = va + vb$$

является следствием утверждения, что правостороннее представление $g_{3,4}$ является гомоморфизмом аддитивной группы D -алгебры A . Так как V является абелевой группой, то равенство

$$(9.6.20) \quad \begin{aligned} v((a + n) + (b + m)) &= va + vn + vb + vm = va + vb + vn + vm \\ &= v(a + b) + v(n + m) = v((a + b) + (n + m)) \end{aligned}$$

является следствием равенств (9.6.17), (9.6.18), (9.6.19). Из равенства (9.6.20) следует, что определение (9.6.11) суммы на множестве $A_{(1)}$ не зависит от вектора v .

Равенства (9.6.13), (9.6.16) являются следствием утверждения 9.6.5.3. Пусть $p = a + n \in A_{(1)}$, $q = b + m \in A_{(1)}$. Так как произведение в D -алгебре A может быть неассоциативным, то опираясь на теорему 9.6.6, мы рассмотрим произведение $A_{(1)}$ -чисел p и q как билинейное отображение

$$f : A_{(1)} \times A_{(1)} \rightarrow A_{(1)}$$

такое, что верны равенства

$$(9.6.21) \quad f(a, b) = ab \quad a, b \in A$$

$$(9.6.22) \quad f(1, p) = f(p, 1) = p \quad p \in A_{(1)} \quad 1 \in D_{(1)}$$

Равенство

$$(9.6.23) \quad \begin{aligned} (a + n)(b + m) &= f(a + n, b + m) \\ &= f(a, b) + f(a, m) + f(n, b) + f(n, m) \\ &= f(a, b) + mf(a, 1) + nf(1, b) + nf(1, m) \\ &= ab + ma + nb + nm \end{aligned}$$

является следствием равенств (9.6.21), (9.6.22). Равенство (9.6.12) является следствием равенства (9.6.23).

Утверждение 9.6.5.2 является следствием равенства (9.6.12). \square

Билинейное отображение

$$(v, a) \in V \times A \rightarrow va \in V$$

порождённое правосторонним представлением $g_{2,3}$ называется **правосторонним произведением** вектора на скаляр.

ТЕОРЕМА 9.6.8. Пусть V - правый A -модуль. Множество векторов, порождённое множеством векторов $v = (v_i \in V, i \in I)$, имеет вид^{9.13}

$$(9.6.24) \quad J(v) = \left\{ w : w = \sum_{i \in I} v_i c^i, c^i \in A_{(1)}, |\{i : c^i \neq 0\}| < \infty \right\}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Мы докажем теорему по индукции, опираясь на теорему 6.1.4, Согласно теореме 6.1.4, мы должны доказать следующие утверждения:

$$9.6.8.1: v_k \in X_0 \subseteq J(v)$$

$$9.6.8.2: v_k c^k \in J(v), c^k \in A_{(1)}, k \in I$$

$$9.6.8.3: \sum_{k \in I} v_k c^k \in J(v), c^k \in A_{(1)}, |\{i : c^i \neq 0\}| < \infty$$

$$9.6.8.4: v, w \in J(v) \Rightarrow v + w \in J(v)$$

$$9.6.8.5: a \in A, v \in J(v) \Rightarrow av \in J(v)$$

- Для произвольного $v_k \in v$, положим $c^i = \delta_k^i \in A_{(1)}$. Тогда

$$(9.6.25) \quad v_k = \sum_{i \in I} v_i c^i$$

Утверждение 9.6.8.1 следует из (9.6.24), (9.6.25).

- Утверждение 9.6.8.2 является следствием теорем 6.1.4, 9.6.5 и утверждения 9.6.8.1.
- Так как V является абелевой группой, то утверждение 9.6.8.3 следует из утверждения 9.6.8.2 и теорем 6.1.4, 9.2.3.
- Пусть $w_1, w_2 \in X_k \subseteq J(v)$. Так как V является абелевой группой, то, согласно утверждению 6.1.4.3,

$$(9.6.26) \quad w_1 + w_2 \in X_{k+1}$$

Согласно равенству (9.6.24), существуют $A_{(1)}$ -числа $w_1^i, w_2^i, i \in I$, такие, что

$$(9.6.27) \quad w_1 = \sum_{i \in I} v_i w_1^i \quad w_2 = \sum_{i \in I} v_i w_2^i$$

где множества

$$(9.6.28) \quad H_1 = \{i \in I : w_1^i \neq 0\} \quad H_2 = \{i \in I : w_2^i \neq 0\}$$

конечны. Так как V является абелевой группой, то из равенства (9.6.27) следует, что

$$(9.6.29) \quad w_1 + w_2 = \sum_{i \in I} v_i w_1^i + \sum_{i \in I} v_i w_2^i = \sum_{i \in I} (v_i w_1^i + v_i w_2^i)$$

^{9.13} Для множества A , мы обозначим $|A|$ мощность множества A . Запись $|A| < \infty$ означает, что множество A конечно.

Равенство

$$(9.6.30) \quad w_1 + w_2 = \sum_{i \in I} v_i (w_1^i + w_2^i)$$

является следствием равенств (9.6.15), (9.6.29). Из равенства (9.6.28) следует, что множество

$$\{i \in I : w_1^i + w_2^i \neq 0\} \subseteq H_1 \cup H_2$$

конечно.

- Пусть $w \in X_k \subseteq J(v)$. Согласно утверждению 6.1.4.4, для любого $A_{(1)}$ -числа a ,

$$(9.6.31) \quad wa \in X_{k+1}$$

Согласно равенству (9.6.24), существуют $A_{(1)}$ -числа w^i , $i \in I$, такие, что

$$(9.6.32) \quad w = \sum_{i \in I} v_i w^i$$

где

$$(9.6.33) \quad |\{i \in I : w^i \neq 0\}| < \infty$$

Из равенства (9.6.32) следует, что

$$(9.6.34) \quad wa = \left(\sum_{i \in I} v_i w^i \right) a = \sum_{i \in I} (v_i w^i) a = \sum_{i \in I} (v_i w^i a)$$

Из утверждения (9.6.33) следует, что множество $\{i \in I : w^i a \neq 0\}$ конечно.

Из равенств (9.6.26), (9.6.30), (9.6.31), (9.6.34) следует, что $X_{k+1} \subseteq J(v)$. \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.6.9. Пусть $v = (v_i \in V, i \in I)$ - множество векторов. Выражение $v_i w^i$ называется **линейной комбинацией** векторов v_i . Вектор $\bar{w} = v_i w^i$ называется **линейно зависимым** от векторов v_i . \square

Представим множество $A_{(1)}$ -чисел w^i , $i \in I$, в виде матрицы

$$w = \begin{pmatrix} w^1 \\ \dots \\ w^n \end{pmatrix}$$

Представим множество векторов v_i , $i \in I$, в виде матрицы

$$v = \begin{pmatrix} v_1 & \dots & v_n \end{pmatrix}$$

Тогда мы можем записать линейную комбинацию векторов $\bar{w} = v_i w^i$ в виде

$$\bar{w} = v_*^* w$$

ТЕОРЕМА 9.6.10. Пусть A - ассоциативная D -алгебра с делением. Если уравнение

$$v_i w^i = 0$$

предполагает существования индекса $i = j$ такого, что $w^j \neq 0$, то вектор v_j линейно зависит от остальных векторов v .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Теорема является следствием равенства

$$v_j = \sum_{i \in I \setminus \{j\}} v_i w^i (w^j)^{-1}$$

и определения 9.6.9. □

Очевидно, что для любого множества векторов v_i ,

$$w^i = 0 \Rightarrow v_* w = 0$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.6.11. Множество векторов^{9.14} $v_i, i \in I$, правого A -модуля V **линейно независимо**, если $w = 0$ следует из уравнения

$$v_i w^i = 0$$

В противном случае, множество векторов $v_i, i \in I$, **линейно зависимо**. □

Следующее определение является следствием теорем 9.6.8, 6.1.4 и определения 6.1.5.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.6.12. $J(v)$ называется **подмодулем, порождённым множеством v** , а v - **множеством образующих** подмодуля $J(v)$. В частности, **множеством образующих** правого D -модуля V будет такое подмножество $X \subset V$, что $J(X) = V$. □

Следующее определение является следствием теорем 9.6.8, 6.1.4 и определения 6.2.6.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.6.13. Если множество $X \subset V$ является множеством образующих правого D -модуля V , то любое множество $Y, X \subset Y \subset V$ также является множеством образующих правого D -модуля V . Если существует минимальное множество X , порождающее правый D -модуль V , то такое множество X называется **базисом** правого D -модуля V . □

ТЕОРЕМА 9.6.14. Множество векторов $\bar{e} = (e_i, i \in I)$ является базисом правого A -модуля V , если верны следующие утверждения.

9.6.14.1: Произвольный вектор $v \in V$ является линейной комбинацией векторов множества \bar{e} .

9.6.14.2: Вектор e_i нельзя представить в виде линейной комбинации остальных векторов множества \bar{e} .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно утверждению 9.6.14.1, теореме 9.6.8 и определению 9.6.9, множество \bar{e} порождает правый A -модуль V (определение 9.6.12). Согласно утверждению 9.6.14.2, множество \bar{e} является минимальным множеством, порождающим правый A -модуль V . Согласно определению 9.6.13, множество \bar{e} является базисом правого A -модуля V . □

ТЕОРЕМА 9.6.15. Пусть A - ассоциативная D -алгебра с делением. Множество векторов $\bar{e} = (e_i, i \in I)$ является **базисом правого A -векторного пространства V** , если векторы e_i линейно независимы и любой вектор $v \in V$ линейно зависит от векторов e_i .

^{9.14} Я следую определению в [2], страница 100.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть множество векторов $e_i, i \in I$, линейно зависимо. Тогда в равенстве

$$e_i w^i = 0$$

существует индекс $i = j$ такой, что $w^j \neq 0$. Согласно теореме 9.6.10, вектор e_j линейно зависит от остальных векторов множества \bar{e} . Согласно определению 9.6.13, множество векторов $e_i, i \in I$, не является базисом правого A -векторного пространства V .

Следовательно, если множество векторов $e_i, i \in I$, является базисом, то эти векторы линейно независимы. Так как произвольный вектор $v \in V$ является линейной комбинацией векторов $e_i, i \in I$, то множество векторов $v, e_i, i \in I$, не является линейно независимым. \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.6.16. Пусть \bar{e} - базис правого A -модуля V , и вектор $\bar{v} \in V$ имеет разложение

$$\bar{v} = e_* v = e_i v^i$$

относительно базиса \bar{e} . $A_{(1)}$ -числа v^i называются **координатами** вектора \bar{v} относительно базиса \bar{e} . Матрица $A_{(1)}$ -чисел $v = (v^i, i \in I)$ называется **координатной матрицей** вектора \bar{v} в базисе \bar{e} . \square

ТЕОРЕМА 9.6.17. Пусть A - ассоциативная D -алгебра. Пусть \bar{e} - базис правого A -модуля V . Пусть

$$(9.6.35) \quad e_i w^i = 0$$

линейная зависимость векторов базиса \bar{e} . Тогда

9.6.17.1: $A_{(1)}$ -число $w^i, i \in I$, не имеет обратного элемента в D -алгебре $A_{(1)}$.

9.6.17.2: Множество A' матриц $w = (w^i, i \in I)$ порождает правый A -модуль.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Допустим существует матрица $w = (w^i, i \in I)$ такая, что равенство (9.6.35) верно и существует индекс $i = j$ такой, что $w^j \neq 0$. Если мы положим, что $A_{(1)}$ -число c^j имеет обратный, то равенство

$$e_j = \sum_{i \in I \setminus \{j\}} e_i w^i (w^j)^{-1}$$

является следствием равенства (9.6.35). Следовательно вектор e_j является линейной комбинацией остальных векторов множества \bar{e} и множество \bar{e} не является базисом. Следовательно, наше предположение неверно, и $A_{(1)}$ -число c^j не имеет обратного.

Пусть матрицы $b = (b^i, i \in I) \in A'$, $c = (c^i, i \in I) \in A'$. Из равенств

$$e_i b^i = 0$$

$$e_i c^i = 0$$

следует

$$e_i (b^i + c^i) = 0$$

Следовательно, множество A' является абелевой группой.

Пусть матрица $c = (c^i, i \in I) \in A'$ и $a \in A$. Из равенства

$$e_i c^i = 0$$

следует

$$e_i(c^j a) = 0$$

Следовательно, абелева группа A' является правым A -модулем. \square

ТЕОРЕМА 9.6.18. Пусть правый A -модуль V имеет базис \bar{e} такой, что в равенстве

$$(9.6.36) \quad e_i w^i = 0$$

существует индекс $i = j$ такой, что $w^j \neq 0$. Тогда

9.6.18.1: Матрица $w = (w^i, i \in I)$ определяет координаты вектора $0 \in V$ относительно базиса \bar{e} .

9.6.18.2: Координаты вектора \bar{v} относительно базиса \bar{e} определены однозначно с точностью до выбора координат вектора $0 \in V$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Утверждение 9.6.18.1 является следствием равенства (9.6.36) и определения 9.6.16.

Пусть вектор \bar{v} имеет разложение

$$(9.6.37) \quad \bar{v} = e_*^* v = e_i v^i$$

относительно базиса \bar{e} . Равенство

$$(9.6.38) \quad \bar{v} = \bar{v} + 0 = e_i v^i + e_i c^i = e_i (v^i + c^i)$$

является следствием равенств (9.6.36), (9.6.37). Утверждение 9.6.18.2 является следствием равенств (9.6.37), (9.6.38) и определения 9.6.16. \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.6.19. Правый A -модуль V - **свободный правый A -модуль**,^{9.15} если правый A -модуль V имеет базис и векторы базиса линейно независимы. \square

ТЕОРЕМА 9.6.20. Координаты вектора $v \in V$ относительно базиса \bar{e} свободного правого A -модуля V определены однозначно.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Теорема является следствием теоремы 9.6.18 и определений 9.6.11, 9.6.19. \square

9.7. Левый модуль над неассоциативной алгеброй

Теоремы 9.6.5, 9.6.6 рассматривают структуру модуля над ассоциативной D -алгеброй A . Нетрудно заметить, что с учётом некоторых поправок, эти теоремы остаются верны если A - неассоциативная D -алгебра. Однако, так как произведение в D -алгебре A неассоциативно, а произведение преобразований в модуле над D -алгеброй A ассоциативно, то отображение g_{34} не может быть представлением неассоциативной D -алгебры A .

Мы подошли к той границе, где определена теория представлений универсальной алгебры. Для того, чтобы сохранить возможность применения рассмотренного в этой книге аппарата, мы можем согласиться, что отображение

$$g_{34} : A \times V \rightarrow V$$

является представлением, если отображение g_{34} является билинейным отображением. Появляются новые вопросы, рассмотрение которых выходит за рамки этой книги.

^{9.15} Я следую определению в [2], страница 103.

Однако мы можем рассмотреть эту задачу с другой стороны. Если отображение g_{34} не сохраняет операцию произведения, то мы полагаем, что отображение g_{34} - это представление D -алгебры A , в которой не определено произведение. Другими словами, отображение g_{34} - это представление D -модуля. Следовательно, диаграмма представлений будет иметь вид

$$(9.7.1) \quad \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{g_{34}} & V \\ & \searrow^{g_{12}} & \nearrow^{g_{14}} \\ & D & \end{array} \quad \begin{array}{l} g_{12}(d) : a \rightarrow da \\ g_{34}(a) : v \rightarrow av \\ g_{14}(d) : v \rightarrow dv \end{array}$$

Однако мы потеряли структуру D -алгебры A в диаграмме представлений (9.7.1). Следовательно, правильная диаграмма представлений будет иметь вид

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{g_{34}} & V \\ & \searrow^{g_{23}} & \nearrow^{g_{14}} \\ & A & \\ & \uparrow^{g_{12}} & \\ & D & \end{array} \quad \begin{array}{l} g_{12}(d) : a \rightarrow da \\ g_{23}(v) : w \rightarrow C(w, v) \\ C \in \mathcal{L}(A^2 \rightarrow A) \\ g_{34}(a) : v \rightarrow va \\ g_{14}(d) : v \rightarrow dv \end{array}$$

Примеры диаграммы представлений: аффинная геометрия

10.1. Об этой главе

В главе 9 мы рассмотрели примеры диаграммы представлений, связанные с модулем над кольцом. Если бы теория представлений сводилась бы к изучению модулей, вряд ли это была бы интересная теория.

В этой главе я рассмотрел примеры диаграммы представлений, связанные с аффинной геометрией. Внешне простая алгебраическая конструкция оказалась для меня богатейшим источником вдохновения. Я дважды встретил интересные идеи в этой области математики. Сперва изучая аффинную геометрию, я обнаружил, что я могу описать аффинную геометрию с помощью башни представлений. Впоследствии, изучая таким же образом алгебру над коммутативным кольцом, я стал изучать диаграмму представлений.

Однако второе открытие пришло ко мне случайно. Когда я просматривал учебник по математическому анализу, я встретил определение знакомое с детства. Сумма векторов. Определение крайне простое. При определении многообразия аффинной связности мы имеем сумму векторов в касательной плоскости. Но в этот раз я понял, что я могу определить сумму векторов пользуясь параллелограммом из геодезических. Это позволило построить аффинную геометрию на многообразии аффинной связности.

Ещё один шаг, и от многообразия аффинной связности я перешёл к метрико аффинному многообразию. Так как параллелограм из геодезических не замкнут, то сумма векторов в метрико аффинном многообразии не коммутативна. Без сомнения, это исследование, которое выходит за рамки этой книги и к которому я надеюсь вернуться в будущем. Однако я решил написать набросок этой конструкции в разделе 10.4, чтобы показать читателю границы теории, изложенной в этой книге.

Теория представлений является естественным продолжением теории универсальных алгебр. Предполагается, что бинарная операция на универсальной алгебре A определена для любой пары A -чисел. Однако очевидно, что сумма векторов в аффинной геометрии на дифференцируемом многообразии хорошо определена только в достаточно малой окрестности.

С похожей задачей я столкнулся в статье [11], где я и Александр Ложье изучали ортогональные преобразования в пространстве Минковского. Мы обнаружили, что произведение ортогональных преобразований не всегда является ортогональным преобразованием, и следовательно множество ортогональных преобразований не является группой.

10.2. Представление группы на множестве

Пусть G - абелева группа, и M - множество. Рассмотрим эффективное представление группы G на множестве M . Для заданных $a \in G$, $A \in M$ положим $A \rightarrow A + a$. Мы будем также пользоваться записью $a = \vec{AB}$, если

$$(10.2.1) \quad B = A + a$$

Тогда действие группы можно представить в виде

$$(10.2.2) \quad B = A + \vec{AB}$$

Поскольку представление эффективно, то из равенств (10.2.1), (10.2.2) и равенства

$$D = C + a$$

следует, что

$$(10.2.3) \quad \vec{AB} = \vec{CD}$$

Мы будем называть вектором G -число a и соответствующее преобразование \vec{AB} . Мы интерпретируем равенство (10.2.3) как независимость вектора a от выбора M -числа A .

Мы можем рассматривать множество M как объединение орбит представления группы G . В качестве базиса представления можно выбрать множество точек таким образом, что одна и только одна точка принадлежит каждой орбите представления. Если X - базис представления, $A \in X$, $g \in G$, то Ω_2 -слово имеет вид $A + g$. Поскольку на множестве M не определены операции, то не существует Ω_2 -слово, содержащее различные элементы базиса. Если представление группы G однотранзитивно, то базис представления состоит из одной точки. Этой точкой может быть любая точка множества M .

ТЕОРЕМА 10.2.1. Пусть представление $A \rightarrow A + a$ абелевой группы G на множестве M однотранзитивно. Тогда, для любых M -чисел A, B, C , определена сумма векторов \vec{AB} и \vec{BC} и сумма векторов удовлетворяет равенству

$$(10.2.4) \quad \vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Поскольку представление однотранзитивно, то, для любых M -чисел A, B, C , существуют векторы \vec{AB} , \vec{BC} такие, что


$$(10.2.5) \quad B = A + \vec{AB}$$

$$(10.2.6) \quad C = B + \vec{BC}$$

Равенство

$$(10.2.7) \quad C = (A + \vec{AB}) + \vec{BC} = A + (\vec{AB} + \vec{BC})$$

является следствием равенств (10.2.5), (10.2.6) и ассоциативности сложения в абелевой группе G . Поскольку представление однотранзитивно, то равенство



(10.2.4) является следствием равенства (10.2.7) и равенства

$$C = A + \vec{AC}$$

Это определение суммы называется правилом треугольника. □

ЗАМЕЧАНИЕ 10.2.2. Так как G - абелева группа, то утверждения 10.2.2.1, 10.2.2.2, следуют из теоремы 10.2.1

10.2.2.1: $\vec{AA} = 0$


10.2.2.2: $\vec{AB} = -\vec{BA}$

10.2.2.3: Сложение коммутативно.

10.2.2.4: Сложение ассоциативно. □


ТЕОРЕМА 10.2.3. Для заданных $a, b \in G$ и $A \in M$ рассмотрим следующее множество M -чисел.

- $B = A + a$
- $C = B + b$
- $D = A + b$
- $E = D + a$



ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Теорема является следствием утверждения 10.2.2.3. □

ТЕОРЕМА 10.2.4. Если $\vec{AB} = \vec{CD}$, то $\vec{AC} = \vec{BD}$.



ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Положим $\vec{AB} = \vec{CD} = a$, $\vec{AC} = b$. Согласно утверждению 10.2.2.2, $\vec{BA} = -a$. Теорема является следствием равенства

$$\begin{aligned} D &= B + \vec{BD} = B + \vec{BA} + \vec{AD} = B + \vec{BA} + \vec{AC} + \vec{CD} \\ &= B - a + b + a = B + b \end{aligned}$$

□

10.3. Аффинное пространство

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 10.3.1. Пусть D - коммутативное кольцо и V - свободный D -модуль. Множество точек $\overset{\circ}{V}$ называется **аффинным пространством** над D -модулем V , если множество точек $\overset{\circ}{V}$ удовлетворяет следующим аксиомам. ^{10.1}

10.3.1.1: Существует по крайней мере одна точка

10.3.1.2: Каждой паре точек (A, B) поставлен в соответствие один и только один вектор. Этот вектор мы будем обозначать \vec{AB} . Вектор \vec{AB} имеет начало в точке A и конец в точке B .

^{10.1}Я написал определения и теоремы в этом разделе согласно определению аффинного пространства в [4], с. 86 - 93.

10.3.1.3: Для каждой точки A и любого вектора a существует одна и только одна точка B такая, что $\overrightarrow{AB} = a$. Мы будем также пользоваться записью^{10.2}


$$(10.3.1) \quad B = A + a$$

10.3.1.4: (Аксиома параллелограмма.) Если $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, то $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$.


Множество V называется множеством свободных векторов. $\overset{\circ}{V}$ -числа называются точками аффинного пространства $\overset{\circ}{V}$. \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 10.3.2. Пусть $A \in \overset{\circ}{V}$ - произвольная точка.

Пусть v - вектор. Согласно аксиоме 10.3.1.3, существует $B \in \overset{\circ}{V}$, $B = A + v$.




Пусть w - вектор. Согласно аксиоме 10.3.1.3, существует $C \in \overset{\circ}{V}$, $C = B + w$.



Согласно аксиоме 10.3.1.2, существует вектор \overrightarrow{AC} . Вектор \overrightarrow{AC} называется суммой векторов v и w

$$(10.3.2) \quad v + w = \overrightarrow{AC}$$

Это определение суммы называется правилом треугольника.



ТЕОРЕМА 10.3.3. Вектор \overrightarrow{AA} является нулём по отношению к операции сложения и не зависит от выбора точки A . Вектор \overrightarrow{AA} называется нуль-вектором и мы полагаем $\overrightarrow{AA} = 0$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Мы можем записать правило сложения (10.3.2) в виде

$$(10.3.3) \quad \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

Если $B = C$, то из равенства (10.3.3) следует

$$(10.3.4) \quad \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BB} = \overrightarrow{AB}$$

Из равенства (10.3.4) следует, что вектор \overrightarrow{BB} является нулём по отношению к операции сложения. Если $C = A$, $B = D$, то из аксиомы 10.3.1.4 следует $\overrightarrow{AA} = \overrightarrow{DD}$. Следовательно, нуль-вектор \overrightarrow{AA} не зависит от выбора точки A . \square

^{10.2}[21], с. 9.

ТЕОРЕМА 10.3.4. Пусть $a = \overrightarrow{AB}$. Тогда

$$(10.3.5) \quad \overrightarrow{BA} = -a$$

и это равенство не зависит от выбора точки A .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из равенства (10.3.3) и теоремы 10.3.3 следует

$$(10.3.6) \quad \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = 0$$

Равенство (10.3.5) следует из равенства (10.3.6). Применяя аксиому 10.3.1.4 к равенству $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ получим $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$, или, что то же,

$$(10.3.7) \quad \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AC}$$


Из равенства (10.3.7) и аксиомы 10.3.1.4 следует, что $\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{DC}$. Следовательно, равенство (10.3.5) не зависит от выбора точки A . \square

ТЕОРЕМА 10.3.5. Сумма векторов v и w не зависит от выбора точки A .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть

$$(10.3.8) \quad v = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{A'B'}$$

$$(10.3.9) \quad w = \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{B'C'}$$



Сумма векторов v и w определена согласно определению 10.3.2.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} &= \overrightarrow{AC} \\ \overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{B'C'} &= \overrightarrow{A'C'} \end{aligned}$$

Согласно аксиоме 10.3.1.4, из равенств (10.3.8), (10.3.9) следует, что

$$(10.3.10) \quad \overrightarrow{A'A} = \overrightarrow{B'B} = \overrightarrow{C'C}$$

Применяя аксиому 10.3.1.4 к крайним членам равенства (10.3.10), получаем


$$(10.3.11) \quad \overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{AC}$$

Из равенства (10.3.11) следует утверждение теоремы. \square

ТЕОРЕМА 10.3.6. Сложение векторов ассоциативно.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $v = \overrightarrow{AB}$, $w = \overrightarrow{BC}$, $u = \overrightarrow{CD}$. Из равенства

$$\begin{aligned} v + w &= \overrightarrow{AC} \\ \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} &= \overrightarrow{AC} \end{aligned}$$



следует

$$(10.3.12) \quad \begin{aligned} (v+w) + u &= \overrightarrow{AD} \\ \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} &= \overrightarrow{AD} \end{aligned}$$

Из равенства

$$\begin{aligned} w + u &= \overrightarrow{BD} \\ \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} &= \overrightarrow{BD} \end{aligned}$$

следует

$$(10.3.13) \quad \begin{aligned} v + (w+u) &= \overrightarrow{AD} \\ \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} &= \overrightarrow{AD} \end{aligned}$$

Теорема следует из сравнения равенств (10.3.12) и (10.3.13). \square

ТЕОРЕМА 10.3.7. На множестве V определена структура абелевой группы.


ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из теорем 10.3.3, 10.3.4, 10.3.5, 10.3.6 следует, что операция сложение векторов определяет группу.

Пусть $v = \overrightarrow{AB}$, $w = \overrightarrow{BC}$.

$$(10.3.14) \quad \begin{aligned} v + w &= \overrightarrow{AC} \\ \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} &= \overrightarrow{AC} \end{aligned}$$

Согласно аксиоме 10.3.1.3 существует точка D такая, что

$$w = \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$$



Правило параллелограмма.

Согласно аксиоме 10.3.1.4, $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = v$. Согласно определению суммы векторов

$$(10.3.15) \quad \begin{aligned} \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} &= \overrightarrow{AC} \\ w + v &= \overrightarrow{AC} \end{aligned}$$

Из равенств (10.3.14) и (10.3.15) следует коммутативность сложения. \square

ТЕОРЕМА 10.3.8. *Отображение*

$$(10.3.16) \quad V \rightarrow \text{End}(\emptyset, \overset{\circ}{V})$$

определённое равенством (10.3.1), является однотранзитивным представлением абелевой группы V .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Аксиома 10.3.1.3 определяет отображение (10.3.16). Из теоремы 10.3.5 следует, что отображение (10.3.16) является представлением. Эффективность представления следует из теоремы 10.3.3 и аксиомы 10.3.1.2. Из аксиомы 10.3.1.2 следует также, что представление транзитивно. Эффективное и транзитивное представление однотранзитивно. \square

Сравнение теоремы 10.3.8 и утверждений раздела 10.2 видно, что однотранзитивное представление абелевой группы V на множестве $\overset{\circ}{V}$ эквивалентно аксиомам аффинного пространства. Однако, пользуясь теоремой 10.3.8 как определением аффинного пространства, мы теряем многие важные конструкции в аффинном пространстве. Например, вектор определяет преобразование параллельного переноса в аффинном пространстве. Но у нас нет инструмента, чтобы определить преобразование поворота аффинного пространства.

Если мы внимательно посмотрим на определение 10.3.1, то мы увидим, что абелева группа V имеет дополнительную структуру, поскольку абелева группа V является D -модулем. Таким образом, мы получаем следующую теорему.

ТЕОРЕМА 10.3.9. Пусть D - коммутативное кольцо, V - абелева группа и $\overset{\circ}{V}$ - множество. Если $A \in \overset{\circ}{V}$ и $v \in V$, то мы будем обозначать действие вектора v на точку A выражением $A + v$. **Аффинное пространство над D -модулем V** - это диаграмма представлений

$$\begin{array}{ccc} \vec{V} : D & \xrightarrow{f_{12}} & V \xrightarrow{f_{23}} \overset{\circ}{V} \\ & & f_{12}(d) : v \rightarrow d v \\ & & f_{23}(v) : A \rightarrow A + v \end{array}$$

где f_{12} - эффективное представление коммутативного кольца D в абелевой группе V и f_{23} - однотранзитивное правостороннее представление абелевой группы V в множестве $\overset{\circ}{V}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Мы полагаем, что множество $\overset{\circ}{V}$ не пусто; следовательно множество $\overset{\circ}{V}$ удовлетворяет аксиоме 10.3.1.1. Поскольку $v \in V$ порождает преобразование множества, то для любого $A \in \overset{\circ}{V}$ однозначно определён $B \in \overset{\circ}{V}$ такое, что

$$B = A + v$$

Это утверждение доказывает аксиому 10.3.1.3. Поскольку представление f_{23} однотранзитивно, то для любых $A, B \in \overset{\circ}{V}$ существует единственное $v \in V$ такое, что

$$B = A + v$$

Это утверждение позволяет ввести обозначение $\overrightarrow{AB} = a$, а также доказывает аксиому 10.3.1.2. Аксиома 10.3.1.4 следует из утверждения теоремы 10.2.4.

Представление f_{12} гарантирует, что абелева группа V является D -модулем. \square

Абелева группа V действует однотранзитивно на множестве $\overset{\circ}{V}$. Из построений в разделе 10.2 следует, что базис множества $\overset{\circ}{V}$ относительно представления абелевой группы V состоит из одной точки. Эту точку обычно обозначают буквой O и называют **началом системы координат аффинного пространства**. Следовательно, произвольную точку $A \in \overset{\circ}{V}$ можно представить с помощью вектора $\overrightarrow{OA} \in V$

Пусть \vec{e} - базис D -модуля V . Тогда вектор \overrightarrow{OA} имеет вид

$$\overrightarrow{OA} = a^i e_i$$

Множество $(a_i, i \in I)$ называется **координатами точки A аффинного пространства \mathring{A} относительно базиса (O, \bar{e})** .


10.4. Аффинное пространство на дифференцируемом многообразии

В разделе 10.3 мы рассмотрели определение аффинной геометрии. Ниже мы рассмотрим модель аффинного пространства в метрико-аффинном многообразии. Когда мы рассматриваем связность Γ_{ij}^k в римановом пространстве, мы накладываем на связность ограничение,^{10.3} что тензор кручения

$$(10.4.1) \quad T_{kl}^i = \Gamma_{lk}^i - \Gamma_{kl}^i$$

обращается в 0 (симметрия связности) и скалярное произведение векторов при параллельном переносе не меняется. Если на дифференцируемом многообразии определены метрический тензор и произвольная связность, то это многообразие называется **метрико-аффинным многообразием**.^{10.4} В частности, связность в метрико-аффинном многообразии имеет кручение.

В римановом пространстве, мы пользуемся геодезическими вместо прямых. Поэтому вектор v мы можем представить с помощью отрезка AB геодезической L_v при условии, что вектор v касается геодезической L_v в точке A и длина отрезка AB равна длине вектора v .



Для заданных векторов v и w в касательной плоскости к точке A , мы будем полагать ρ - длина вектора v и σ - длина вектора w . Пусть V - единичный вектор, коллинеарный вектору v

$$(10.4.2) \quad V^k \rho = v^k$$

Пусть W - единичный вектор, коллинеарный вектору w

$$(10.4.3) \quad W^k \sigma = w^k$$

Мы проведём геодезическую L_v через точку A , используя вектор v как касательный вектор к L_v в точке A . Пусть τ - канонический параметр на L_v и

$$\frac{dx^k}{d\tau} = V^k$$

Мы перенесём вектор w вдоль геодезической L_v из точки A в точку B , определённую значением параметра $\tau = \rho > 0$. Мы обозначим результат w' .


^{10.3} Смотри определение аффинной связности в римановом пространстве на странице [4]-443.

^{10.4} Смотри также определение [9]-6.1.1.

Мы проведём геодезическую $L_{w'}$ через точку B , используя вектор W' как касательный вектор к $L_{w'}$ в точке B . Пусть φ' - канонический параметр на $L_{w'}$ и

$$\frac{dx^k}{d\varphi'} = W'^k$$

Мы определим точку C на геодезической $L_{w'}$ значением параметра $\varphi' = \sigma$



Я полагаю, что длина векторов v и w мала. Тогда существует единственная геодезическая L_u из точки A в точку C . Я буду отождествлять отрезок AC геодезической L_u и вектор $v + w$.

Аналогичным образом я строю треугольник ADE , чтобы определить вектор $w + v$.

Мы проведём геодезическую L_w через точку A , используя вектор w как касательный вектор к L_w в точке A . Пусть φ - канонический параметр на L_w и


$$\frac{dx^k}{d\varphi} = W^k$$

Мы перенесём вектор v вдоль геодезической L_w из точки A в точку D , определённую значением параметра $\varphi = \sigma > 0$. Мы обозначим результат v' .


Мы проведём геодезическую $L_{v'}$ через точку D , используя вектор v' как касательный вектор к $L_{v'}$ в точке D . Пусть τ' - канонический параметр на $L_{v'}$ и

$$\frac{dx^k}{d\tau'} = V'^k$$

Мы определим точку E на геодезической $L_{v'}$ значением параметра $\tau' = \rho$



Формально линии AB и DE так же, как линии AD и BC , параллельны. Длины отрезков AB и DE равны так же, как длины отрезков AD и BC равны. Мы называем такую фигуру **параллелограммом**, построенным на векторах v и w с вершиной в точке A .



ЛЕММА 10.4.1. Пусть L_v - геодезическая через точку A и вектор v - касательный вектор к L_v в точке A . Приращение координаты x^k вдоль геодезической L_v имеет вид

$$(10.4.4) \quad \Delta x^k = \frac{dx^k}{d\tau} \tau - \frac{1}{2} \Gamma_{mn}^k \frac{dx^m}{d\tau} \frac{dx^n}{d\tau} \tau^2 + O(\tau^2)$$

где τ - канонический параметр и мы вычисляем производные и компоненты Γ_{mn}^k в начальной точке.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Система дифференциальных уравнений геодезической L_v имеет вид

$$(10.4.5) \quad \frac{d^2 x^i}{d\tau^2} = -\Gamma_{kl}^i \frac{dx^k}{d\tau} \frac{dx^l}{d\tau}$$

Мы можем записать решение системы дифференциальных уравнений (10.4.5) в виде ряда Тейлора

$$(10.4.6) \quad \begin{aligned} \Delta x^k &= \frac{dx^k}{d\tau} \tau + \frac{1}{2} \frac{d^2 x^k}{d\tau^2} \tau^2 + O(\tau^2) = \\ &= \frac{dx^k}{d\tau} \tau - \frac{1}{2} \Gamma_{mn}^k \frac{dx^m}{d\tau} \frac{dx^n}{d\tau} \tau^2 + O(\tau^2) \end{aligned}$$

Равенство (10.4.4) является следствием равенства (10.4.6). \square

ТЕОРЕМА 10.4.2. Предположим $CBADE$ - параллелограмм с вершиной в точке A ; тогда построенная фигура не будет замкнута [1]. Величина различия координат точек C и E равна поверхностному интегралу кручения над этим параллелограммом^{10.5}

$$\Delta_{CE} x^k = \iint T_{mn}^k dx^m \wedge dx^n$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно лемме 10.4.1, приращение координаты x^k вдоль геодезической L_v имеет следующий вид

$$\Delta_{AB} x^k = V^k \rho - \frac{1}{2} \Gamma_{mn}^k(A) V^m V^n \rho^2 + O(\rho^2)$$

и приращение координаты x^k вдоль геодезической L_w имеет следующий вид

$$(10.4.7) \quad \Delta_{BC} x^k = W^k \sigma - \frac{1}{2} \Gamma_{mn}^k(B) W^m W^n \sigma^2 + O(\sigma^2)$$

^{10.5}Доказательство этого утверждения я нашёл в [3]

Здесь

$$(10.4.8) \quad \begin{aligned} W'^k &= W^k - \Gamma_{mn}^k(A)W^m \Delta_{AB}x^n + O(dx) \\ &= W^k - \Gamma_{mn}^k(A)W^m V^n \rho + O(\rho) \end{aligned}$$

результат параллельного переноса вектора w из A в B и

$$(10.4.9) \quad \begin{aligned} \Gamma_{mn}^k(B) &= \Gamma_{mn}^k(A) + \partial_p \Gamma_{mn}^k(B) \Delta_{AB}x^p \\ &= \Gamma_{mn}^k(A) + \partial_p \Gamma_{mn}^k(B) V^p \rho \end{aligned}$$

с точностью до малой первого порядка. Подставляя (10.4.8), (10.4.9) в (10.4.7), мы получим

$$\Delta_{BC}x^k = W^k \sigma - \Gamma_{mn}^k(A)W^m V^n \sigma \rho - \frac{1}{2} \Gamma_{mn}^k(A)W^m W^n \sigma^2 + O(\rho^2)$$

Общее приращение координаты x^K вдоль пути ABC имеет вид

$$(10.4.10) \quad \begin{aligned} \Delta_{ABC}x^k &= \Delta_{AB}x^k + \Delta_{BC}x^k \\ &= V^k \rho + W^k \sigma - \Gamma_{mn}^k(A)W^m V^n \sigma \rho - \\ &\quad - \frac{1}{2} \Gamma_{mn}^k(A)W^m W^n \sigma^2 - \frac{1}{2} \Gamma_{mn}^k(A)V^m V^n \rho^2 + O(dx^2) \end{aligned}$$

Аналогично общее приращение координаты x^K вдоль пути ADE имеет вид

$$(10.4.11) \quad \begin{aligned} \Delta_{ADE}x^k &= \Delta_{AD}x^k + \Delta_{DE}x^k = \\ &= W^k \sigma + V^k \rho - \Gamma_{mn}^k(A)V^m W^n \rho \sigma - \\ &\quad - \frac{1}{2} \Gamma_{mn}^k(A)V^m V^n \rho^2 - \frac{1}{2} \Gamma_{mn}^k(A)W^m W^n \sigma^2 + O(dx^2) \end{aligned}$$

Из (10.4.10) и (10.4.11) следует, что

$$\begin{aligned} \Delta_{ADE}x^k - \Delta_{ABC}x^k &= -\Gamma_{mn}^k(A)V^m W^n \rho \sigma \\ &\quad - \frac{1}{2} \Gamma_{mn}^k(A)V^m V^n \rho^2 - \frac{1}{2} \Gamma_{mn}^k(A)W^m W^n \sigma^2 \\ &\quad + \Gamma_{mn}^k(A)W^m V^n \sigma \rho \\ &\quad + \frac{1}{2} \Gamma_{mn}^k(A)W^m W^n \sigma^2 + \frac{1}{2} \Gamma_{mn}^k(A)V^m V^n \rho^2 \end{aligned}$$

и мы получаем интегральную сумму для выражения


$$\Delta_{ADE}x^k - \Delta_{ABC}x^k = \iint_{\Sigma} (\Gamma_{nm}^k - \Gamma_{mn}^k) dx^m \wedge dx^n$$

□

ТЕОРЕМА 10.4.3. В римановом пространстве параллелограм $ABCD$ замкнут. В точке A геодезическая AC имеет касательный вектор u , который является суммой векторов v и w

$$(10.4.12) \quad u^k = v^k + w^k$$

Следовательно, сумма векторов в римановом пространстве коммутативна.



ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Мы будем полагать π - длина вектора u . Пусть U - единичный вектор, коллинеарный вектору u

$$(10.4.13) \quad U^k \pi = u^k$$

Согласно лемме 10.4.1, приращение координаты x^k вдоль геодезической L_u имеет следующий вид

$$(10.4.14) \quad \Delta_{AC} x^k = U^k \pi - \frac{1}{2} \Gamma_{mn}^k(A) U^m U^n \pi^2 + O(\pi^2)$$

Равенства

$$(10.4.15) \quad U^k \pi = V^k \rho + W^k \sigma$$

$$(10.4.16) \quad \begin{aligned} & \Gamma_{mn}^k(A) U^m U^n \pi^2 \\ &= 2\Gamma_{mn}^k(A) W^m V^n \sigma \rho + \Gamma_{mn}^k(A) W^m W^n \sigma^2 + \Gamma_{mn}^k(A) V^m V^n \rho^2 \end{aligned}$$

являются следствием равенств (10.4.10), (10.4.14). Равенство (10.4.12) является следствием равенств (10.4.2), (10.4.3), (10.4.13), (10.4.15). Равенство

$$(10.4.17) \quad \Gamma_{mn}^k(A) u^m u^n = 2\Gamma_{mn}^k(A) w^m v^n + \Gamma_{mn}^k(A) w^m w^n + \Gamma_{mn}^k(A) v^m v^n$$

является следствием равенств (10.4.2), (10.4.3), (10.4.13), (10.4.16). Равенство

$$(10.4.18) \quad \begin{aligned} \Gamma_{mn}^k(A) u^m u^n &= \Gamma_{mn}^k(A) (v^m + w^m)(v^n + w^n) \\ &= \Gamma_{mn}^k(A) (v^m v^n + v^m w^n + w^m v^n + w^m w^n) \end{aligned}$$

является следствием равенства (10.4.12). Равенство (10.4.17) является следствием равенства (10.4.18) и симметрии связности. Следовательно, геодезическая AC является суммой геодезических AB и BC . \square

Если связность не симметрична, то геодезическая L_u не содержит точек C и E . Следовательно, сумма векторов в метрико-аффинном многообразии некоммутативна.

ТЕОРЕМА 10.4.4. Существует вектор t такой, что

$$(10.4.19) \quad (v + w)^k = v^k + w^k + t^k$$

$$(10.4.20) \quad (w + v)^k = v^k + w^k - t^k$$

Координаты вектора t удовлетворяют системе уравнений

$$(10.4.21) \quad \Gamma_{mn}^k(A) t^m t^n + (\Gamma_{mn}^k(A) + \Gamma_{nm}^k(A)) (v^m + w^m) t^n + 2T_{mn}^k(A) v^m w^n = 0$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Рассмотрим сперва вектор $v + w$. Равенство

$$(10.4.22) \quad \begin{aligned} & v^k + w^k + t^k - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)(v^m + w^m + t^m)(v^n + w^n + t^n) \\ &= v^k + w^k - \Gamma_{mn}^k(A)w^m v^n - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)w^m w^n - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)v^m v^n \end{aligned}$$

является следствием равенства (10.4.10) и леммы 10.4.1. Равенство

$$(10.4.23) \quad \begin{aligned} & v^k + w^k + t^k \\ & - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)v^m v^n + \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)v^m w^n + \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)v^m t^n \\ & + \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)w^m v^n + \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)w^m w^n + \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)w^m t^n \\ & + \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)t^m v^n + \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)t^m w^n + \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)t^m t^n \\ &= v^k + w^k - \Gamma_{mn}^k(A)w^m v^n - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)w^m w^n - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)v^m v^n \end{aligned}$$

является следствием равенства (10.4.22) Равенство

$$(10.4.24) \quad \begin{aligned} & t^k - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)v^m w^n - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)v^m t^n - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)w^m t^n \\ & - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)t^m v^n - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)t^m w^n - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)t^m t^n \\ &= -\frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)w^m v^n \end{aligned}$$

является следствием равенства (10.4.23) Равенство

$$(10.4.25) \quad \begin{aligned} & \Gamma_{mn}^k(A)t^m t^n + (\Gamma_{mn}^k(A)v^m + \Gamma_{mn}^k(A)w^m \\ & + \Gamma_{nm}^k(A)v^m + \Gamma_{nm}^k(A)w^m - 2\delta_n^k)t^n \\ & + 2T_{mn}^k(A)v^m w^n = 0 \end{aligned}$$

является следствием равенства (10.4.24) Равенство (10.4.21) является следствием равенства (10.4.25)

Рассмотрим теперь вектор $w + v$. Равенство

$$(10.4.26) \quad \begin{aligned} & v^k + w^k - t^k - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)(v^m + w^m - t^m)(v^n + w^n - t^n) \\ &= v^k + w^k - \Gamma_{mn}^k(A)v^m w^n - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)v^m v^n - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)w^m w^n \end{aligned}$$

является следствием равенства (10.4.11) и леммы 10.4.1. Равенство

$$(10.4.27) \quad \begin{aligned} & v^k + w^k - t^k \\ & - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)v^m v^n - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)v^m w^n + \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)v^m t^n \\ & - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)w^m v^n - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)w^m w^n + \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)w^m t^n \\ & + \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)t^m v^n + \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)t^m w^n - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)t^m t^n \\ &= v^k + w^k - \Gamma_{mn}^k(A)v^m w^n - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)v^m v^n - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)w^m w^n \end{aligned}$$

является следствием равенства (10.4.26) Равенство

$$\begin{aligned}
 & -t^k \\
 & + \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)v^m t^n \\
 (10.4.28) \quad & - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)w^m v^n + \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)w^m t^n \\
 & + \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)t^m v^n + \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)t^m w^n - \frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)t^m t^n \\
 & = -\frac{1}{2}\Gamma_{mn}^k(A)v^m w^n
 \end{aligned}$$

является следствием равенства (10.4.27) Равенство

$$\begin{aligned}
 & \Gamma_{mn}^k(A)t^m t^n + (\Gamma_{mn}^k(A)v^m + \Gamma_{mn}^k(A)w^m \\
 (10.4.29) \quad & + \Gamma_{nm}^k(A)v^m + \Gamma_{nm}^k(A)w^m - 2\delta_n^k)t^n \\
 & + 2T_{nm}^k(A)v^m w^n = 0
 \end{aligned}$$


является следствием равенства (10.4.28) Равенство (10.4.21) является следствием равенства (10.4.29) \square

Ответить на вопрос, имеет ли система уравнений (10.4.21) решение - задача непростая. Однако есть другой способ найти координаты вектора t .

Мы проведём геодезическую L_{v+w} через точку A , используя вектор $v+w$ как касательный вектор к L_{v+w} в точке A . Мы проведём геодезическую L_{w+v} через точку A , используя вектор $w+v$ как касательный вектор к L_{w+v} в точке A . Мы проведём геодезическую L_u через точку A , используя вектор u как касательный вектор к L_u в точке A .

$$u^k = v^k + w^k$$

как касательный вектор к L_u в точке A .



Согласно теоремам 10.4.2, 10.4.4 точка F является серединой отрезка EC . Следовательно, мы можем рассматривать отрезок AF как медиану треугольника ACE . Согласно теореме 10.4.4 мы можем отождествить отрезок FC и вектор t . Следовательно, теорема 10.4.2 даёт нам способ найти координаты вектора t .

10.5. Некоммутативный модуль

В разделе 10.4, мы рассмотрели возможность изучения аффинной геометрии на многообразии аффинной связности. Эта геометрия имеет две особенности. Множество векторов не замкнуто относительно сложения и операция сложения может быть некоммутативной.

Мы ещё не готовы рассмотреть первую проблему, однако мы можем рассмотреть вопросы, связанные с некоммутативностью суммы векторов. Представление

$$f : D \xrightarrow{*} G$$

коммутативного кольца D в произвольной группе G называется некоммутативным модулем. Это представление во многом похоже на модуль, поэтому все теоремы о структуре модуля верны. Однако вопрос о структуре базиса остаётся открытым.

Вообще говоря,

$$av + bw \neq bw + av$$

Поэтому возникает вопрос, какое множество группы G мы хотим рассмотреть в качестве базиса.

Мы можем построить базис аналогично тому, как мы строим базис модуля. Тогда этот базис должен допускать выражение вида

$$av + bw + cv$$

Либо мы можем потребовать, чтобы элементы базиса в линейной комбинации имели строгий порядок. При этом предполагается, что если (v, w) - базис некоммутативного модуля V , то для любого выражения $bw + av$ существуют $c, d \in D$ такие, что

$$cv + dw = bw + av$$

Список литературы

- [1] F. W. Hehl, P. von der Heyde, G. D. Kerlick, and J. M. Nester, General relativity with spin and torsion: Foundations and prospects, *Rev. Mod. Phys.* **48**, 393 (1976)
- [2] Серж Ленг, Алгебра, М. Мир, 1968
- [3] Г. Е. Шиллов. Математический анализ, Функции нескольких вещественных переменных, части 1 - 2, М., Наука, 1972
- [4] П. К. Рашевский, Риманова геометрия и тензорный анализ, М., Наука, 1967
- [5] А. Г. Курош, Общая алгебра, (лекции 1969 - 70 учебного года), М., МГУ, 1970
- [6] Kevin McCrimmon; A Taste of Jordan Algebras; Springer, 2004
- [7] В. В. Жаринов, Алгебро-геометрические основы математической физики, Лекционные курсы научно-образовательного центра, 9, МИАН, М., 2008
- [8] Александр Клейн, Бикольцо матриц, eprint [arXiv:math.OA/0612111](https://arxiv.org/abs/math.OA/0612111) (2007)
- [9] Александр Клейн, Преобразование Лоренца и принцип общековариантности, eprint [arXiv:0803.3276](https://arxiv.org/abs/0803.3276) (2009)
- [10] Александр Клейн, Введение в геометрию над телом, eprint [arXiv:0906.0135](https://arxiv.org/abs/0906.0135) (2010)
- [11] Александр Клейн, Александер Ложье, Ортонормированный базис в пространстве Минковского, eprint [arXiv:1201.4158](https://arxiv.org/abs/1201.4158) (2012)
- [12] Александр Клейн, Линейное отображение D -алгебры, eprint [arXiv:1502.04063](https://arxiv.org/abs/1502.04063) (2015)
- [13] John C. Baez, The Octonions, eprint [arXiv:math.RA/0105155](https://arxiv.org/abs/math.RA/0105155) (2002)
- [14] П. Кон, Универсальная алгебра, М., Мир, 1968
- [15] Paul M. Cohn, Algebra, Volume 1, John Wiley & Sons, 1982
- [16] Н. Бурбаки, Алгебра: алгебраические структуры, линейная и полилинейная алгебра, перевод с французского Д. А. Райкова, М., государственное издательство физико-математической литературы, 1962
- [17] Н. Бурбаки, Группы и алгебры Ли, главы 1 - 3, перевод с французского Ю. А. Бахтурина И Г. И. Ольшанского под редакцией А. А. Кириллова И А. И. Кострикина, М. Мир, 1976

- [18] Постников М. М., Лекции по геометрии, семестр IV, Дифференциальная геометрия, М. Наука, 1983
- [19] Алексеевский Д. В., Виноградов А. М., Лычагин В. В., Основные понятия дифференциальной геометрии
Итоги ВИНТИ 28
М. ВИНТИ, 1988
- [20] Richard D. Schafer, An Introduction to Nonassociative Algebras, Dover Publications, Inc., New York, 1995
- [21] Paul Bamberg, Shlomo Sternberg, A course in mathematics for students of physics, Cambridge University Press, 1991

Предметный указатель

- A^* -модуль 162
- A^* -векторное пространство 162
- A -представление в Ω -алгебре 17, 76
- *-произведение (произведение столбца на строку) 61
- D -алгебра 159
- D -модуль 146
- n -арная операция на множестве 10
- *-произведение (произведение строки на столбец) 61
- абелева Ω -группа 44
- абелева мультипликативная Ω -группа 56
- абелева полугруппа 16
- автоморфизм 11
- автоморфизм диаграммы представлений 118
- автоморфизм представления Ω -алгебры 38
- аддитивное отображение 41
- активное представление в многообразии базисов 104, 137
- активное преобразование многообразия базисов 104, 137
- алгебра над кольцом 159
- арность 10
- ассоциативная Ω -группа 44
- ассоциативная мультипликативная Ω -группа 57
- ассоциативная операция 16
- аффинное пространство 181, 185
- базис векторного пространства 151, 168, 175
- базис диаграммы представлений 134
- базис представления 101
- башня представлений Ω -алгебр 109
- бикольцо 62
- вектор 146, 162, 162, 169, 170
- векторное A -пространство 170
- вырожденный эндоморфизм 97, 131
- геометрический объект 107, 140
- геометрический объект в координатном представлении 107, 140
- геометрический объект типа H 107, 140
- гомоморфизм 11
- гомоморфный образ 11
- группа автоморфизмов представления 38, 118
- группа стабилизации 82
- декартова степень 9
- декартово произведением Ω -алгебр 13
- диаграмма представлений универсальных алгебр 110
- естественный гомоморфизм 15
- закон ассоциативности 74, 74, 75, 76, 147, 163, 171
- закон дистрибутивности 43, 58, 59, 147, 163, 171
- закон унитарности 147, 163, 171
- изоморфизм 11
- изоморфизм представлений Ω -алгебры 27
- индукция по диаграмме представлений 111
- категория представлений 45, 50
- квазибазис диаграммы представлений 132
- квазибазис представления 98
- коммутативная диаграмма представлений универсальных алгебр 111
- коммутативная операция 16
- коммутативность представлений 146, 162, 170
- координатная матрица вектора 151, 168, 176
- координатное представление 106, 139
- координаты 151, 168, 176
- координаты A_2 -числа m относительно множества X 92, 124
- координаты геометрического объекта 107, 140

- координаты морфизма диаграммы представлений 128
- координаты приведенного морфизма представления 95
- координаты точки A аффинного пространства $\overset{\circ}{A}$ относительно базиса (O, \bar{e}) 186
- кортеж Ω -слов 122
- кортеж стабильных множеств диаграммы представлений 120
- левое A -векторное пространство 162
- левое векторное пространство 162
- левостороннее A_1 -представление 73
- левостороннее представление 73
- левостороннее произведение 74, 165
- левый A -модуль 162
- левый модуль 162
- левый сдвиг модуля 160
- левый сдвиг на группе 77
- линейная комбинация 150, 166, 174
- линейно зависимое множество 150, 167, 175
- линейно зависимый 150, 166, 174
- линейно независимое множество 150, 167, 175
- линейное отображение 153, 154
- малая группа 82
- матрица 60
- матрица линейного отображения 154, 155
- метрико-аффинное многообразие 186
- многообразие базисов 103, 137
- множество Ω_2 -слов представления 89
- множество допускает операцию 10
- множество замкнуто относительно операции 10
- множество координат представления 92, 124
- множество кортежей Ω -слов 122
- множество образующих 89, 122, 150, 150, 167, 167, 175, 175
- модуль над кольцом 146
- может быть вложена 11
- моморфизм 11
- морфизм из диаграммы представлений в диаграмму представлений 114
- морфизм представлений Ω_1 -алгебры в Ω_2 -алгебре 20
- морфизм представлений из f в g 20
- морфизм представления f 21
- мультипликативная Ω -группа 56
- начало системы координат аффинного пространства 185
- невырожденный эндоморфизм 97, 131
- нейтральный элемент операции 16
- носитель Ω -алгебры 10
- область операторов 10
- однородное пространство 84
- однотранзитивное представление Ω -алгебры A 19, 83
- операция на множестве 10
- орбита представления 80, 80
- отношение эквивалентности 7
- отображение согласовано с операцией 11
- параллелограмм 188
- парные представления 85
- пассивное представление в многообразии базисов 104, 137
- пассивное преобразование многообразия базисов 104, 137
- подалгебра Ω -алгебры 10
- подмодуль, порождённым множеством 150, 167, 175
- подпредставление 87, 89, 120, 122
- полиаддитивное отображение 42
- полилинейное отображение 156
- полиморфизм представлений 49
- полугруппа 16
- правое A -векторное пространство 170
- правое векторное пространство 170
- правостороннее A_1 -представление 75
- правостороннее представление 75
- правостороннее произведение 75, 173
- правый модуль 169
- правый сдвиг на группе 77
- представитель геометрического объекта 107, 140
- представление Ω_1 -алгебры A в Ω_2 -алгебре M 17, 76
- преобразование, согласованное с эквивалентностью 26
- приведенный морфизм представлений 32
- приведенный полиморфизм представлений 53
- приводимое бикольцо 63
- принцип двойственности для бикольца 62
- принцип двойственности для бикольца матриц 63
- принцип инвариантности 107, 140
- принцип инвариантности в D_*^* -векторном пространстве 107, 140
- произведение в категории 12
- произведение морфизмов диаграммы представлений 117
- произведение морфизмов представлений универсальной алгебры 25
- пространство орбит левостороннего представления 81
- прямое произведением Ω -алгебр 13
- рефлексивное соответствие 7

- свободная алгебра над кольцом 159
- свободное представление 18, 18, 82
- свободный модуль 152, 169, 177
- симметричное соответствие 7
- стабильное множество представления 87
- сумма отображений 156, 158

- тензорная степень 64
- тензорное произведение 63
- транзитивное представление Ω -алгебры
A 19
- транзитивное соответствие 7

- универсальная алгебра 10
- унитальное расширение 146, 163, 171
- условие приводимости произведений 63

- эндоморфизм 11
- эндоморфизм диаграммы представлений
118
- эндоморфизм представления Ω -алгебры
37
- эпиморфизм 11
- эффективное представление 17, 82

- ядро гомоморфизма 15
- ядро отображения 7

- Ω -алгебра 10
- Ω -группа 44
- Ω - группоид 78
- Ω -кольцо 59
- Ω_2 -слово элемента представления
относительно множества
образующих 89

Специальные символы и обозначения

- $A(f)$ активное представление в многообразии базисов 104, 137
 $\mathcal{A}_1(\mathcal{A}_2)$ категория представлений 45
 $\mathcal{A}_1(\mathcal{A}_2)$ категория представлений 50
 $a_* * b$ $*$ -произведение 61
 $A \cong B$ изоморфны 11
 $w^i v_i$ линейная комбинация 150, 166
 $w_* * v$ линейная комбинация 150, 166
 $v_i w^i$ линейная комбинация 174
 $v_* * w$ линейная комбинация 174
 A_{1a_2} малая группа 82
 A_Ω Ω -алгебра 10
 $a_* * b$ $*$ -произведение 61
 $\mathcal{A}(A_2 \rightarrow B_2)$ множество аддитивных отображений 41
 $A_{(1)}v$ множество векторов, порождённых вектором v 163, 171
 A_2/A_1 пространство орбит представления 81
 A_{1a_2} группа стабилизации 82
 $\mathcal{B}[f]$ многообразие базисов 103, 137
 B^A декартова степень 9
 \mathcal{B}_f структура подпредставлений 88
 $\mathcal{B}[f, A]$ структура подпредставлений 121
 $B_1 \times \dots \times B_n$ произведение в категории 12
 $B^{\otimes n}$ тензорная степень представления 64
 df произведение отображения на скаляр 158, 159
 $D_{(1)}v$ множество векторов, порождённых вектором v 147
 $\bar{e} = (e_i, i \in I)$ базис модуля 151, 167, 175
 $\bar{e} \circ s$ образ базиса \bar{e} при пассивном преобразовании S 104, 137
 $\text{End}(\Omega; A)$ множество эндоморфизмов 11
 $A_1 * a_2$ орбита представления 80
 $a_2 * A_1$ орбита представления 80
 $f + g$ сумма отображений 156, 158
 $GA(f)$ группа автоморфизмов представления f 38, 118
 $\text{Hom}(\Omega; A \rightarrow B)$ множество гомоморфизмов 11
 $J[f]$ оператор замыкания представления f 88, 121
 $J[f, X]$ подпредставление, порождённое множеством образующих X 88, 122
 $\ker f$ ядро гомоморфизма 15
 $\ker f$ ядро отображения 7
 $L(b)$ левый сдвиг 77
 $w^i v_i$ линейная комбинация 150, 166
 $w_* * v$ линейная комбинация 150, 166
 $v_i w^i$ линейная комбинация 174
 $v_* * w$ линейная комбинация 174
 $\mathcal{L}(D_1 \rightarrow D_2; A_1 \rightarrow A_2)$ множество линейных отображений 153
 $\mathcal{L}(D; A_1 \rightarrow A_2)$ множество линейных отображений 154
 $\mathcal{L}(D; A_1 \times \dots \times A_n \rightarrow S)$ множество полилинейных отображений 156
 $\mathcal{L}(D; A^n \rightarrow S)$ множество n -линейных отображений 156
 $\mathcal{O}(f, g, \bar{e}_g, m)$ геометрический объект в координатном представлении 107
 $\mathcal{O}(f, g, \bar{e}_g, a)$ геометрический объект в координатном представлении 140
 $B_1 \otimes \dots \otimes B_n$ тензорное произведение 63
 $P(f)$ пассивное представление группы $GA(f)$ в многообразии базисов $\mathcal{B}[f]$ 104, 137
 $R(b)$ правый сдвиг 77
 \vec{V} аффинное пространство 185
 $W[f, X]$ множество координат представления $J(f, X)$ 92
 $W_{(k)}[f, X]$ множество координат представления $J(f, X)$ 124

- $W[f, X, m]$ координаты элемента m
 представления f относительно
 множества X 92
- $W_{(k)}[f, X, a]$ координаты элемента m
 представления f относительно
 множества X 124
- $w[f, X]$ множество кортежей Ω -слов 122
- $W[f, X, B]$ множество координат
 множества $B \subset J(f, X)$ 92
- $W_{(k)}[f, X, B]$ множество координат
 множества $B \subset J(f, X)$ 124
- $w[f, X, B]$ множество Ω_2 -слов,
 представляющих множество
 $B \subset J(f, X)$ 89
- $W[g, Y, R(X)] \circ W[f, X, m]$ суперпозиция
 координат 95
- $W_{(k)}[g, Y, r_{(k)}(X_{(k)})] \circ W_{(k)}[f, X, a_{(k)}]$
 суперпозиция координат 128
- $w[f, X, a]$ кортеж Ω -слов 122
- $w[f, X, m]$ Ω_2 -слово, представляющее
 элемент $m \in J(f, X)$ 89
- $w[f, X]$ множество Ω_2 -слов
 представления $J(f, X)$ 89
- Ω область операторов 10
- $\Omega(n)$ множество n -арных операторов 10
- $\prod_{i \in I} B_i$ произведение в категории 12
- $\prod_{i=1}^n B_i$ произведение в категории 12